



קונטלקס[®] פתילות

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקנירים) התשמ"ז · 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

היגיה ושימוש במכונות: אם הינך חש סחרחוורת או עילפון בזמן השימוש בתרופה, הימנע מנהיגה או הפעלת מכונות עד שתעבור תחושת הסחרחוורת או העילפון.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרופך אם אין לך בעותה.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקבול בדרך כלל הוא פטילה אחת או שתיים ליום. המינון המקבול בדרך כלל הוא: למוגרים וילדים מעל גיל – 10 פטילה אחת ליום (10 מ"ג ליום). לילדים בגיל 10–4 חצי פטילה ליום (5 מ"ג ליום). אין לעבור על המנה המומלצת. אם לא חל שיפור במצבך תוך 5 ימים יש לפנות לרופא.
שים לב: לא לבלוע! התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש: ראשית, שטוף היטב את ידיך. הסר את העטיפה של הפטילה והרטב במעט מים. שכב על הצלח דוחף את הפטילה עמוק ככל שתוכל אל תוך הרקטום (פי הטבעת) בעזרת האצבע. אם הפטילה רכה מכדי לאפשר את החדרתנה, ניתן לנגן במקرار במשך 6–30 דקות או לנגן תחת זרם מים קרים לפני הוצאתה מהעטיפה. שטוף את ידיך לאחר החדרת הפטילה.
התכשיר מעורר פעילות המעיים בדרך כלל תוך 60–95 דקות.

אם נטلت בטעות מינון גבוה יותר: אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בעליל מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי בבית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול? יש להקפיד על שתיתת נוזלים במושך היום, שתעדוז בריכוך הצואה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדק כי התוויות והמנה בכל פעם שהinan נוטל את התרופה. הרכב אם משקפיים אם הינך זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות נספנות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

החומר הפעיל וכמותו בפטילה: ביסקודיל 10 מ"ג Bisacodyl 10 mg. חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 6 " מידע נוסף".
קרוא בעיון את העalon עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עברוך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
התרופה אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת לגיל 6 שנים.
תכשיר זה מיועד רק לעצירות הנמשכת מספר ימים. חוסר פעילות המעיים ליום יומיים אינו מצדיק שימוש בו. כמו כן אין להשתמש בו למטרות אחרות כמו "ניקוי הגוף" וכדומה.

1. למה מיועדת התרופה?

תרופה זו מיועדת להקלת עצורות.
קבוצה תרפיטית : חומרים משלימים.

2. לפני שימוש בתרופה: אין להשתמש בתרופה אם:

אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה. ראה רשימת מרכיבים נוספים בסעיף 6 " מידע נוסף". אם אתה סובל מהתייבשות, מחסמתת מעיים, דלקת בתופסתן (אפנדיציט), כאבי בטן חמורים עם בחילות והקאות, דלקת בעורם, פיסורה, דלקת או כיבים באחור פי הטבעת.

ازhorות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

• שימוש ממושך בתכשירים משלימים כגון זה יכול לגרום לתלונות ולשלישולים. אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת מבעלי להיוועץ ברופא.

• לפני השימוש בתכשיר ספר לרופא: אם הינך סובל מליקוי בתפקודי הלב, אם אתה לוקח, או אם לך חלה לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, במיוחד אם אתה לוקח תרופות משלשות אחרות, תרופות משתנות כגון פורוסאמיד או סטרואידים כגון פרדנייזולן.

הריון והנקה: דברי עם הרוקח או הרופא לפני השימוש בתרופה אם את בהריון, מתכנתת הריון או מניקה.



קונטלקס[®] פתילות

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקנירים) התשמ"ז - 1986
התרופה משווקת על ידי מרשם רופא בלבד.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור
מחוץ להישג ידים של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה.
אם נסלתת מנת יתר או אם בטיעות בעליל מין התרופה, פנה מיד
לחדר מיון של בית-חולים והבא אריזת התרופה איתה. אל תגרום
להקאה ללא הוואה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (date, exp.)
הופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של
אותו חדש. אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C.
יש לאחסן באזיזה המקורית.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:
.Hard Fat, Methylparaben

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה? פtileות בצורת טרפה
בצבע לבן עד צהבהב בהיר, 25 פtileות המכילות 10 mg חומר
פעיל כל אחת.

• בעל הרישום: פישר מעבדות פרמצטניות (1975) בע"מ,
ת.ד. 39071, ת"א 61390.

• שם היצרן וכותבותו: בן-שמעון פלורייש בע"מ, פארק תעשייה מSEG, ד.ג. מSEG 20174.

• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 17.10.2017.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

118.13.23519

• לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נסח בלשון זכר.
על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בקונטלקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק
מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן ולא
תסבול אף אחת מהן. יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לדופא:
במקרים נדירים של תגובה אלרגית חריפה העוללה לגרום לנפיחות
בפנים או בגרון, קשי נשימה או סחרחות.

• במקרים נדירים של עיפיות או חולשה וצאי דופן, קצב לב מגבר ובלבול
שהם סימנים של אובדן אלקטROLיטים, תופעות לוואי נספות:
תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך
100): כאב בטן או עוויתות, שלשלולים ובחילות.

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שמופיעות ב-1-1 משתמשים מתוך
1,000): דם בצוואה, הקאה, חוסר נוחות בבטן, חוסר נוחות בתווך
ומסבב לפיה הטבעת או סחרחות.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-1-1 משתמשים מתוך
10,000): קוליטיס - דלקת במעי הגס המופיע בכאבי בטן ושלשלולים.
התuibשות. תגובה אלרגית העוללה לגרום לפריחה. התעלפות.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה: תרופה זו עלולה לגרום לשינוי
בצבע השתן או הצואה. בשינויים אלה אין מקום לדאגה.

• אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מטופעת הלואן מחמירה,
או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא הזכרה לעלון, עליך להתייעץ
עם הרופא. ניתן לבדוק על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות

לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי"
שנמצא בדף הבית של אטר משרד הבריאות (www.health.gov.il)
המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעת לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>