

كونتاكس® فتائل

من الممكن أن يؤودي هذا الدواء إلى تغيير في لون البول أو البراز. بالنسبة لهذه التغيرات، لا مكان للقلق.

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، أو تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا شعرت بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

كمية الوجبات المقبولة في حال عدم وجود تعليمات من الطبيب:

يجب الاستخدام دائمًا بموجب تعليمات الطبيب. يتم تحديد الجرعات وطريقة العلاج من قبل الطبيب فقط. الجرعة المقبولة بصورة عامة هي: للبالغين والأطفال فوق سن 10 سنوات - فتيلة واحدة في اليوم (10 ملغم في اليوم). للأطفال بسن 4-10 سنوات نصف فتيلة في اليوم (5 ملغم في اليوم).

يجب عدم تجاوز الجرعة الموصى بها. هذا الدواء ليس معداً بصورة عامة للأولاد والأطفال تحت سن 6 سنوات.

إذا لم يطرأ تحسن على وضعك خلال 5 أيام، يجب التوجه للطبيب.
انتبه -

ليس للبلع! هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.

إذا كانت لديك أسلمة إضافية بالنسبة لاستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

طريقة الاستعمال: انزع/ي الغلاف عن الفتيلة. استلق/ي على جانبك وأدخل/ي الفتيلة عميقاً داخل فتحة الشرج بواسطة الأصبع.

ملاحظة: إذا كانت الفتيلة لينة أكثر من اللازم، بالإمكان ترديدها في الثلاجة لمدة حوالي 30 دقيقة أو ترديدها تحت تيار ماء بارد قبل نزع الغلاف.

كيف تتمكن/ين من المساعدة في إنفاج العلاج؟

يجب المواظبة على شرب السوائل خلال اليوم، الأمر الذي يساعد في تليين البراز. ينشط المستحضر أداء الأمعاء بصورة عامة خلال 60-95 دقيقة.

امنع التسمم: هذا الدواء، مثل أي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأيضاً عن الأطفال، وهكذا تمنع بين التسمم. إذا بلع الولد عن طريق الخطأ شيئاً من هذا الدواء، فيجب التوجه به فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مع اصطحاب عبوة الدواء.

لا تسبب التقطؤ دون تعليمات واضحة من الطبيب.

يجب عدم تناول الدواء في الظلام. افحص/ي النشرة في كل مرة تتناول/ين الدواء فيها. ضع/ي النظارات إذا كنت بحاجة إليها.

التغزير:

من النوع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. يتطرق تاريخ انتهاء الصلاحية لآخر يوم من الشهر المذكور.

من النوع حفظ الدواء في درجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية.

يجب حفظه في عبوته الأصلية.

حتى حسب شروط الرزم/ التغزير الموصى بها، فإن الأدوية يتم حفظها لفترة محدودة فقط. يجب الانتهاء بتاريخ انتهاء صلاحية المستحضر. في أية حالة من الشك عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.

يجب عدم حفظ أدوية مختلفة في العلبة نفسها.

معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي هذا الدواء أيضاً على:

Hard Fat, Methylparaben

كيف يبدو هذا الدواء وما هي محتويات العبوة؟ فتائل على شكل طوربيدو لونها أبيض حتى أصفر فاتح، 25 فتيلة تحتوي كل منها على 10 mg من المادة الفعالة.

صاحب التسجيل: فيشر مختبرات (1975) م.ض، ص.ب. 39071، تل أبيب 61390

اسم المنتج وعنوانه: بن شمعون فلوريش. م.ض. المنطقة الصناعية مسغاف، بريد منتقل مسخاف 20174

تم فحص هذه النشرة والمصادقة عليها من قبل وزارة الصحة بتاريخ: 17.10.2017. رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 118, 13, 23519 من أجل سهولة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. رغم أن هذه النشرة موجهة لكلا الجنسين.

نشرة للمستهلك حسب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) لعام - 1986

هذا الدواء يستلزم وصفة طبية

اقرأ النشرة حتى نهايتها بتمعن قبل أن تستعمل الدواء
وزارة الصحة حددت شكل هذه النشرة. فحصت محتواها ووافقت عليه تركيبة المادة الفعالة وتركيزها في الفتيلة، Bisacodyl 10 mg. المعلومات غير الفعالة والمسمية للحساسية في المستحضر: انظر البند رقم 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة حتى نهايتها بتمعن قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا كانت لديك أيّة أسلمة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي. تم وصف هذا الدواء لك. لا تقم بإعطائه للأخرين. من الممكن أن يسبب لهم الضرار، حتى لو بدا لك أن حاليهم الصحي مشابه لحالتك.

الفاعلية الطبيعية:

يسبب الإسهال. الدواء معَ تخفيف الإمساك.

المجموعة العلاجية: المواد المسمية للإسهال.

متى يجب عدم استعمال المستحضر؟

إذا كنت حساساً للمادة الفعالة أو لأي مركب من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء. انظر قائمة المواد الإضافية في البند رقم 6 "معلومات إضافية".
إذا كنت تعاني من انسداد الأمعاء، التهاب في الزائدة الدودية، آلام بطن شديدة مع غثيان وقيء، التهاب في الأمعاء، بواصير، التهاب أو تقرحات في منطقة الفتحة الشرجية.

يجب عدم استعمال الدواء دون استشارة طبيب قبل بداية العلاج. إذا كنت حاماً أو مريضاً. إذا كنت تعاني/ن من اضطراب في أداء القلب. من نزيف دموي في فتحة الشرج أو آلم شديد في البطن أو من أعراض التهاب الزائدة الدودية (مثل آلم البطن، غثيان وتقيؤات غير مشخصة).

تحذيرات • من الممكن أن يؤودي استخدام المستحضرات المسمية للإسهال مثل هذا المستحضر إلى التعلق بها وإلى الإسهال.

• من نوع استعمال هذا الدواء لفترات متقاربة أو لفترة طويلة دون استشارة الطبيب. إذا كانت لديك حساسية من غذاء معين أو دواء معين، عليك إخبار الطبيب المعالج بذلك قبل استخدام الدواء.

• هذا الدواء معَ فقط لعلاج الإمساك الذي يستمر لمدة أيام. عدم نشاط الأمعاء ليوم أو يومين لا يبرر استعماله. يجب عدم استعماله لأهداف أخرى مثل "تنظيف الجسم" وما شابه ذلك.

• إذا شعرت بالدوار أو الإغماء خلال استخدام الدواء، فعليك الامتناع عن قيادة المركبات أو تشغيل الماكينات إلى أن يتلاشى الشعور بالدوار أو الإغماء.

تفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتناول/ين دواء إضافياً أو كنت قد انتهيت للتوقف عن علاج بدواء آخر، بما في ذلك أدوية يمكن الحصول عليها بدون وصفة الطبيب أو الإضافات الغذائية، عليك إبلاغ الطبيب المعالج كي تتفادى المخاطر أو عدم الفاعلية الناتج عن التفاعل بين الأدوية. وخاصة بالنسبة للأدوية الأخرى المسمية للإسهال.

أعراض جانبية: مثل أي دواء آخر، فإن استخدام كونتاكس قد يتسبب بأعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تتفاقم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، فربما لن تتأثر من أي منها.

إضافة إلى فاعلية الدواء المطلوبة أثناء استعماله، من الممكن أن تكون له أعراض جانبية مثل: إثارة موضعية، تشنجمات في البطن.

أعراض تستلزم تعامل خاصة:

في حالات نادرة، مثل التعب أو الضعف الاستثنائي. دقات قلب زائدة وبطيئة، والتي تعتبر دلائل على فقدان الكتروولينات - أوقف العلاج وتوجه للطبيب. في أية حالة تشعر/ين بها بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة أو إذا حدث تغيير في شعورك العام، فعليك استشارة الطبيب فوراً.