

**עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

# 1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה אוקטאצילין וטרינרי

## אבקה להמסה במי השתיה

**2. חומר פעיל וכמותו**  
1 גרם אבקה מכיל 800 מ"ג אמוקסיצילין טריהידראט (שקול ל- 697 מ"ג אמוקסיצילין).  
1 gram of powder contains 800 mg amoxicillin trihydrate, corresponding to  
697mg of amoxicillin  
לפירוט החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13 "מידע נוסף".

**3. למה מיועדת התרופה**  
התרופה אוקטאצילין מיועדת לטיפול במחלות זיהומיות במערכות הנשימה ודרכי העיכול, דלקות פרקים,  
דלקת קרום המוח ודלקות עור הנגרמות ע"י חיידקים רגישים לאמוקסיצילין בתרנגולי פטם וחזירים.  
**קבוצה תרפויטית:** אנטיביוטיקה ממשפחת הפניצילינים.

**4. התוויות נגד**  
אין להשתמש במקרים בהם קיימת רגישות יתר לפניצילין או לתכשירים אחרים מקבוצת הבטא-לקטמים.  
אין להשתמש בארנבות ומכרסמים אחרים כגון חזירי ים, אוגרים או גרבילים.

**5. תופעות לוואי**  
ייתכנו תופעות של רגישות יתר עם חומרה משתנה מפריחה עורית ועד שוק אנאפלקטי. במקרים אלו יש  
להפסיק את הטיפול.  
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב  
טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס  
המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור :  
[https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectM  
edic@moh.gov.il](https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il)

**6. חיות מטרה**  
תרנגולי פטם וחזירים.

**7. צורת המתן ומינון**  
אבקה להמסה במי השתייה

**חזירים:**  
20 מ"ג אוקטאצילין אבקה לכל 1 ק"ג משקל גוף (16 מ"ג/ק"ג אמוקסיצילין טריהידראט) ליום, למשך 3  
עד 5 ימים. בזיהומים חמורים מומלץ לתת טיפול למשך 5 ימים על פי המלצת הוטרינר.  
מתן בבולוס: מומלץ לתת את התכשיר פעם ביום במי השתיה למשך פרק זמן מוגבל (ראה פירוט בסעיף  
הבא).

מנה רציפה: חישוב כמות התכשיר למתן על פי צריכת מים יומית:

חזירים מתחת ל- 4 חודשים: 20 גרם אוקטאצילין אבקה ל- 100 ליטר מים, ליום. (על פי חישוב צריכה יומית של 1 ליטר מים ל- 10 ק"ג משקל גוף).  
 חזירים מעל 4 חודשים: 30 גרם אוקטאצילין אבקה ל- 100 ליטר מים, ליום. (על פי חישוב צריכה יומית של 0.66 ליטר מים ל- 10 ק"ג משקל גוף).

ניתן להשתמש בנוסחה הבאה לחישוב כמות התכשיר **ליום**:

$$20 \text{ מ"ג תכשיר לק"ג משקל גוף ליום} \times \frac{\text{משקל ממוצע של החיות בק"ג}}{\text{תצרוכת מים ממוצעת לחיה בליטרים (על פי היום הקודם)}} = \frac{\text{מ"ג תכשיר לליטר}}{\text{מי שתיה}}$$

### תרנגולות:

10-20 מ"ג אוקטאצילין אבקה לכל 1 ק"ג משקל גוף (8-16 מ"ג/ק"ג אמוקסיצילין טריהידראט) ליום, למשך 3 עד 5 ימים. בזיהומים חמורים מומלץ לתת את המינון הגבוה.

מתן בבולוס: מומלץ לתת את התכשיר פעם ביום במי השתיה למשך פרק זמן מוגבל (ראה פירוט בסעיף הבא).

ניתן להשתמש בנוסחה הבאה לחישוב כמות התכשיר **ליום**:

$$\text{גרם תכשיר ליום} = \frac{\text{משקל ממוצע של העופות בק"ג} \times \text{מספר העופות}}{50 \text{ (עבור 20 מ"ג לק"ג) או } 100 \text{ (עבור 10 מ"ג לק"ג)}}$$

מנה רציפה: חישוב כמות התכשיר למתן על פי צריכת מים יומית:  
 תרנגולות בגיל 0-4 שבועות: 6-12 גרם אוקטאצילין אבקה ל- 100 ליטר מים, ליום.  
 תרנגולות מעל גיל 4 שבועות: 10-20 גרם אוקטאצילין אבקה ל- 100 ליטר מים, ליום.

## 8. אופן השימוש בתכשיר

ניתן לתת את האוקטאצילין בשתייה רציפה או באופן מרוכז.

### מנה מרוכזת (מתן בבולוס):

מתן פעם ביום במי השתייה למשך פרק זמן מוגבל. יש לסגור את אספקת המים הרגילה למשך כשעתיים (או פחות במזג אוויר חם) לפני המתן. יש לפזר את המנה היומית של האבקה על פני 5-10 ליטר מים ולערבב עד המסה. יש להוסיף את התמיסה לנפח מי השתייה הנצרך במשך 2-3 שעות תוך כדי ערבוב. לאחר גמר שתיית התמיסה הטיפולית יש לחדש את אספקת המים הרגילים.

### מנה רציפה:

במידה וקיימת עדיפות למתן רציף, יש להכין כמות של תמיסה טיפולית שנצרכת למשך 12 שעות על פי הנוסחה שבסעיף "צורת המתן והמינון". יש לחדש את התמיסה הטיפולית כל 12 שעות.

על מנת לוודא מינון מדויק יש לקבוע משקל גוף מדויק ככל האפשר. יש להתחשב בדפוסי השתיה של החיות שתלויים במצבן הקליני. יש להתאים את הריכוז של התרופה במי השתיה על מנת להבטיח שהחיה תקבל את כל המינון המומלץ של החומר הפעיל. יש לשים לב כי המסיסות המקסימלית של התכשיר היא 6 גרם תכשיר לכל ליטר מים. מומלץ להשתמש במאזניים מכוויילים. יש לוודא כי אין גישה של החיות למים ללא תרופה, בזמן הטיפול. יש להיפטר משאריות של תמיסה טיפולית לאחר 12 שעות.

## 9. זמן המתנה

תרנגולות פטם: 24 שעות

חזירים: 48 שעות.

לא לשימוש בתרנגולות מטילות או במשך 4 שבועות לפני התחלת תקופת ההטלה.

## 10. אזהרות

- אין להשתמש בתמיסת התכשיר אם עברו יותר מ-12 שעות ממועד הכנתה.
- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחיות המטרה**  
שימוש לא נכון בתרופה יכול להגביר את השכיחות של חיידקים עמידים לאמוקסיצילין ולהפחית את יעילות התרופה.  
השימוש בתכשיר צריך להתבסס על בדיקת רגישות לחיידקים.  
אצל חזירים, במקרה של שתייה לא מספקת יש לטפל במתן פרנטרלי. אין לתת את התכשיר לבעלי חיים עם כשל חמור בתפקוד הכליות, כולל עצירת שתן או מיעוט שתן.
- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר**  
התכשיר מכיל חומר פעיל ממשפחת הפניצילינים. פניצילינים וצפלוספורינים עלולים לגרום לרגישות יתר לאחר מגע, שאיפה, בליעה או הזרקה. רגישות לפניצילינים עלולה לגרום לרגישות צולבת לצפלוספורינים ולהיפך. תגובות אלרגיות לחומרים אלו עלולות להיות חמורות. הימנע מלעבוד עם תכשיר זה אם הינך בעל רגישות יתר (אלרגי) לפניצילינים או צפלוספורינים.  
יש להשתמש בתכשיר בזירות רבה על מנת להימנע מחשיפה. אין לעשן, לאכול או לשתות בזמן התעסקות עם התכשיר.  
במהלך ההכנה והמתן של מי השתייה המכילים את התרופה יש להימנע ממגע עם העור או משאיפת תכשיר זה.  
השתמש תמיד במסכת פנים למנוע שאיפת התכשיר, בגדי מגן וכפפות למניעת מגע ישיר עם העור.  
יש לרחוץ ידיים מיד לאחר השימוש.  
במקרה של מגע עם העור או העיניים יש לשטוף עם כמות גדולה של מים.  
אם נגרמות תופעות כגון גירוי או פריחה בעור יש לפנות לרופא ולהראות לו את האריזה.  
במקרה של תופעות חמורות יותר כגון התנפחות הפנים, השפתיים או העיניים או קשיים בנשימה, יש לפנות בדחיפות לקבלת סיוע רפואי.
- **שימוש בהריון והנקה או בהטלה**  
חזירות: מחקרים בעכברים וארנבות לא הראו השפעה טרטוגנית או השפעות טוקסיות על העובר או על החיה שבהריון. יחד עם זאת, בטיחות המוצר בחזירות הרות ומניקות לא הוכחה, לכן השימוש במהלך ההריון וההנקה צריך להיות על פי הערכת סיכון/תועלת של הווטרנר.  
תרנגולות: אין להשתמש בתרנגולות המטילות ביצים לצריכת אדם החל מ-4 שבועות לפני התחלת תקופת ההטלה. השימוש בעופות רבייה יהיה על פי הערכת סיכון/תועלת של הווטרנר.
- **תגובות עם תרופות אחרות**  
אין להשתמש בתכשיר בשילוב עם אנטיביוטיקות בקטריוסטטיות (כגון טטרציקלינים).  
סינרגיות מתרחשת בשילוב עם תרופות בטא-לקטמיות ואמינוגליקוזידים.
- **חוסר התאמה (incompatibility)**  
אין לערבב את התרופה עם תרופות וטרניריות אחרות.

## 11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- **תנאי אחסון:** מתחת לטמפרטורה של 25°C. יש להקפיד על סגירה טובה של האריזה לאחר השימוש.

ניתן להשתמש במשך 3 חודשים לאחר הפתיחה הראשונה.

## 12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר ווטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

## 13. מידע נוסף

- **נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:**  
Sodium carbonate monohydrate, Sodium citrate, Colloidal anhydrous silica
- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**  
משקל האריזה: 100, 250, 500, 1000 גרם. ייתכן כי לא כל האריזות משוקות.
- **בעל הרישום:**  
אביק תוצרים וטרינרים בע"מ, ת"ד 489, בית שמש.
- **שם היצרן:**  
Eurovet Animal Health, AE Bladel, The Netherlands

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: ינואר 2018  
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 083-97-92416