تم تحديث محتوى هذه النشرة بموجب تعليمات وزارة الصحة بتاريخ تشرين الثاني ٢٠١٧

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - ١٩٨٦

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

عاراڤا ١٠ ملغ،
عاراڤا ٢٠ ملغ،
أقراص مطلية

SANOFI

المادة الفعالة:

يحتوي كل قرص مطلي من عاراڤا ١٠ ملغ على:
ليفلونوميد Leflunomide 10 mg

يحتوي كل قرص مطلي من عاراڤا ٢٠ ملغ على:
ليفلونوميد Leflunomide 20 mg

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة ٦.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

إحفظ هذه النشرة، من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الدواء غير مخصص لأطفال ومراهقين دون عمر ١٨ سنة.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

ينتمي عاراڤا إلى فصيلة أدوية المسماة مضادات الرثية. وهو يحتوي على المركب الفعال ليفلونوميد.

يستعمل عاراڤا لمعالجة إلتهاب المفاصل الروماتيزمي النشط لدى الكبار لإبطاء تقدم المرض ولتحسين الأداء الوظيفي الجسدي أو لمعالجة إلتهاب المفاصل الصدفي (psoriatic) النشط.

الفصيلة العلاجية: من المثبطات الإنتقائية لجهاز المناعة.

أعراض إلتهاب المفاصل الروماتيزمي تشمل إلتهاب المفاصل، إنتفاخ، صعوبة في الحركة وألم. أعراض أخرى التي تؤثر على كامل الجسم تشمل فقدان الشهية للطعام، سخونة، تناقص الحيوية وفقر الدم (قلة خلايا الدم الحمراء).

أعراض إلتهاب المفاصل الصدفي النشط تشمل إلتهاب المفاصل، إنتفاخ، صعوبة في الحركة، ألم وبقع حمراء وقشرة على الجلد (آفات جلدية).

٢) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- حدث لديك ذات مرة رد فعل **تحسسي** لـ ليفلونوميد (بالأخص رد فعل جلدي شديد، مترافق في أحيان متقاربة بسخونة، آلام مفصلية، بقع جلدية حمراء، أو حويصلات، مثلاً متلازمة Stevens-Johnson) أو لإحدى المركبات الأخرى لهذا الدواء (أنظر الفقرة ٦)، أو إذا كنت حساساً لتيريفلونوميد (يستعمل لعلاج التصلب المتعدد)،
- لديك أية **مشاكل في الكبد**،
- لديك **مشاكل في الكلى** متوسطة حتى شديدة الدرجة،
- لديك كمية منخفضة جداً من **البروتينات في الدم** (hypoproteinaemia)،
- كنت تعاني من أية مشكلة تؤثر على **جهازك المناعي** (الإيدز مثلاً)،
- لديك مشكلة **في نخاع العظم**، أو تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء أو البيضاء في الدم أو عدد منخفض للصفيحات الدموية،
- كنت تعاني **من تلوث خطير**،
- كنت في **فترة الحمل**، تعتقدين بأنك يمكن أن تكوني حاملاً، أو في فترة الرضاعة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

تحدث مع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل تناول عاراڤا:

- إذا عانيت ذات مرة **من مرض إلتهابي رئوي** المسمى **مرض رئوي خلالي (Interstitial lung disease)**.
- إذا مرضت ذات مرة **بالسل** أو إذا كنت على تماس قريب من شخص مريض أو مرض في الماضي بالسل. من شأن طبيبك أن يجري فحوصات ليتأكد فيما إذا لديك مرض السل (أنظر الفقرة «الفحوص والمتابعة»).
- إذا كنت **ذكراً** وكنت ترغب في إنجاب الأطفال.

بما أنه لا يمكن نفي إمكانية إنتقال عاراڤا إلى السائل المنوي، يجب إستعمال وسائل موثوق بها لمنع الحمل خلال العلاج بـ عاراڤا.

- يجب على الرجل الذي يخطط إنجاب طفل التوجه إلى الطبيب الذي من شأنه أن يوصيه بالتوقف عن تناول عاراڤا وتناول أدوية معينة من أجل تفريغ عاراڤا بسرعة وبشكل كاف من جسمه. بعد ذلك، يتوجب عليه إجراء فحص دم للتأكد من أنه قد تم تفريغ عاراڤا بشكل كاف من جسمه وحينها الإنتظار ٣ أشهر أخرى على الأقل قبل المحاولة لإنجاب طفل.
- إذا كنت مقدماً على إجتياز فحص دم معين (نسبة الكالسيوم). فإن النتيجة قد تدل بشكل خاطئ على إنخفاض نسب الكالسيوم.

عاراڤا يمكن أن يسبب أحياناً مشاكل معينة في الدم، في الكبد، في الرئتين أو في أعصاب الذراعين أو الرجلين. وهو قد يسبب أيضاً عدد من ردود الفعل التحسسية الخطيرة (تشمل drug - DRESS reaction with eosinophilia and systemic symptoms)، أو يزيد من خطورة حدوث تلوث حاد. لمعلومات إضافية أنظر الفقرة ٤ أعراض جانبية.

DRESS هو عبارة عن رد فعل يتميز في البداية بأعراض تشبه الإنفلونزا وطفح في الوجه، في السياق طفح منتشر بشكل أكبر مع سخونة مرتفعة، إرتفاع نسب إنزيمات الكبد في الدم، زيادة خلايا الدم البيضاء من نوع الحِمضات (eosinophil) وإنتفاخ الغدد اللمفاوية.

يقوم طبيبك بإجراء **فحوص الدم** بفواصل زمنية ثابتة، قبل وخلال العلاج بـ عاراڤا وذلك لمراقبة خلايا الدم والكبد لديك. يقوم طبيبك أيضاً بفحص ضغط دمك بشكل منتظم وذلك لأن عاراڤا يمكن أن يسبب إرتفاع ضغط الدم.

راجع طبيبك إذا حصل لديك إسهال مزمن غير مشخص. من الجائز أن يجري الطبيب فحوصات إضافية.

الأطفال والمراهقون

لا يوصى بإستعمال عاراڤا لدى الأطفال والمراهقين دون عمر ١٨ سنة.

الأدوية الأخرى وعاراڤا

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى لعلاج إلتهاب المفاصل الروماتيزمي مثل أدوية ضد الملاريا (مثلاً، كلوروكوين وهيدروكسي كلوروكوين)، الذهب بالحقن العضلي أو عن بالإعطاء عن طريق الفم، D-بنيسيلامين، آزاتيوبرين وأدوية أخرى مثبطة لجهاز المناعة (مثلاً، ميتوتريكسات)، وذلك لأن هذه المشاركات غير موصى بها.
- وارفارين وأدوية أخرى للإعطاء عن طريق الفم المستعملة لتمييع الدم، والتي يتطلب تناولها مراقبة ومتابعة وذلك لتقليل خطورة حدوث الأعراض الجانبية الخاصة بها.
- تيريفلونوميد (للتصلب المتعدد).
- ريپاچلينيد، پيوچليتازون، ناتيچلينيد أو روزيچليتازون (للسكري).
- داونوروبيسين، دوكسوروبيسين، پاكليتاكسيل أو توپوتيكان (للسرطان).
- دولوكسيتين (للإكتئاب، لسلس البول أو لمرض كلوي لدى مرضى السكري).
- ألوسيترون (لعلاج الإسهال الشديد).
- تيوفيللين (للربو).
- تيزانيدين (مرخي للعضلات).
- أقراص منع الحمل (التي تحتوي إيتينيل إستراديول وليڤونورچيستريل).
- سيفاكلور، بنزيل پينيسيلين (پينيسيلين G)، سيپروفلوكساسين (للتلوثات).
- إندوميتاسين، كيتوپروفين (للألم أو الإلتهاب).
- فوروسيميد لمرض القلب (مادة مدرة للبول).
- زيدوڤودين (لتلوث HIV).
- روزوڤاستاتين، سيمڤاستاتين، أتورڤاستاتين، پراڤاستاتين (لإرتفاع الكولسترول).
- سولفاسالازين (لمرض معوي إلتهابي أو إلتهاب المفاصل الروماتيزمي).
- كوليستيرامين (لتخفيض الكولسترول) أو الفحم الفعال، لأن هذه الأدوية قد تخفض من كمية عاراڤا الممتصة في الجسم.

إذا كنت تتناول حالياً دواء مضاد إلتهاب لاستيروئيدي (NSAID) و/أو كورتيكوستيروئيدات، بالإمكان مواصلة تناولها بعد بدء العلاج بـ عاراڤا.

اللقاحات

إذا توجب عليك تلقي لقاح، إستشر الطبيب. بعض اللقاحات لا يمكن إعطاؤها أثناء العلاج بـ عاراڤا وبعد فترة معينة بعد التوقف عن العلاج بـ عاراڤا.

إستعمال الدواء والطعام

بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يوصى بشرب الكحول خلال فترة العلاج بالدواء. إن شرب الكحول خلال فترة العلاج بالدواء قد يزيد من خطورة حدوث إصابة في الكبد.

الحمل والإرضاع

لا تستعملي الدواء عندما تكونين **في فترة الحمل** أو تعتقدين بأنك **حاملاً**. إذا كنت في فترة الحمل أو أصبحت حاملاً أثناء العلاج بالدواء، فستزداد الخطورة لولادة رضيع مع تشوهات خلقية خطيرة. ممنوع على النساء في فترة الخصوبة تناول عاراڤا بدون إستعمال وسائل موثوق بها لمنع الحمل.

إستشيري الطبيب إذا كنت تخططين للحمل بعد توقف عن العلاج بـ عاراڤا، وذلك لأنه عليك التأكد من خروج كامل آثار الدواء من جسمك قبل أن تحاولي الحمل. يمكن لهذه الفترة أن تصل حتى السنتين. بالإمكان تقصير هذه الفترة لعدة أسابيع بواسطة تناول أدوية معينة تسرع من تفريغ عاراڤا من جسمك.

على أية حال يجب إجراء فحص دم للتأكد من تفريغ عاراڤا من جسمك بشكل كاف وحينها الإنتظار شهر واحد إضافي على الأقل قبل الحمل.

راجعي طبيبك، لمزيد من المعلومات عن الفحوص المخبرية.

إذا كنت تشكين بأنك أصبحت حاملاً أثناء العلاج بـ عاراڤا أو خلال السنتين التي تلت التوقف عن العلاج بـ عاراڤا، فعليك التوجه **حالاً** إلى الطبيب وذلك من أجل فحص الحمل. إذا أثبت الفحص بأنك حامل، فمن الجائز أن يقترح الطبيب علاجاً بأدوية معينة وذلك لتفريغ عاراڤا بسرعة وبشكل كاف من جسمك لتقليل الخطورة الممكنة للرضيع.

لا يجوز تناول عاراڤا أثناء فترة **الرضاعة** وذلك لأن الدواء ينتقل إلى حليب الأم.

السياقة وإستعمال الماكنات

لا يجوز السياقة أو تشغيل ماكنات خطرة خلال فترة إستعمال الدواء، لأن هذا الدواء قد يسبب لك الشعور بدوار، الأمر الذي قد يضعف من قدرتك على التركيز والإستجابة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

الأقراص تحوي **لكتوز**. إذا وجد لديك عدم تحمل لسكريات معينة، راجع الطبيب قبل بدء العلاج.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي هو عادة مقدار دوائي واحد من عيار ١٠٠ ملغ مرة في اليوم لمدة ٣ أيام وبعد ذلك، يحتاج غالبية المتعالجين لمقدار دوائي ذو:

- لإلتهاب المفاصل الروماتيزمي: ١٠ أو ٢٠ ملغ، مرة في اليوم، يتعلق بشدة المرض.
- لإلتهاب المفاصل الصدفي: ٢٠ ملغ، مرة في اليوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

يجب **بلع** القرص **بشكله الكامل** مع الكثير من **الماء**.

لا تتوفر معلومات بخصوص سحق/شطر/مضغ القرص.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. من الجائز أن تمر ٤ أسابيع أو أكثر حتى تبدأ الشعور بتحسن حالتك.

بعض المرضى يشعرون بتحسن إضافي بعد ٤-٦ أشهر من العلاج.

عادة، العلاج بـ عاراڤا يستغرق وقتاً مطوّلاً.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

الفحوص والمتابعة

يوجهك الطبيب لإجراء فحوص الدم ووظائف الكبد قبل بدء إستعمال الدواء وخلاله.

قبل بدء العلاج، يجب إجراء تقييم لتواجد سل نشط أو غير نشط.

يجب على المتعالجين الذين عانوا من السل في الماضي أن يكونوا تحت المراقبة الحثيثة جراء إمكانية عودة السل لوضعية نشطة.

خلال فترة العلاج يوجهك الطبيب أيضاً لإجراء فحوص ضغط الدم وذلك لأن الدواء قد يرفع من ضغط الدم.

إذا كنت تتناول وارفارين أو أدوية أخرى للإعطاء عن طريق الفم (التي تُستعمل لتمييع الدم) بالتزامن مع العلاج بـ عاراڤا، فيجب إجراء مراقبة حثيثة لـ INR لديك.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر، توجه إلى الطبيب وأحضر علبة الدواء معك.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد يجب تناول مقداراً دوائياً حال تذكرك، إلا إذا اقترب موعد المقدار الدوائي القادم.

لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال عاراڤا قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين.

لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

توجه **حالاً** إلى الطبيب وتوقف عن تناول عاراڤا إذا:

- كنت تشعر **بضعف عام**، تشعر بدوار أو **بصعوبات في التنفس**، لأن هذه قد تكون علامات لرد فعل تحسسي خطير،
- تطور لديك **طفح جلدي** أو **تقرحات في الفم**، لأن هذه يمكن أن تدل على ردود فعل خطيرة، وأحياناً تشكل خطراً على الحياة (مثلاً:

Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme, DRESS).

أنظر الفقرة ٢

توجه **حالاً** إلى الطبيب إذا كنت تعاني من:

- **جلد شاحب، إرهاق**، أو **أنزفة دموية** من تحت الجلد، لأن هذه يمكن أن تدل على إضطرابات في الدم التي تنتج عن نقص في توازن أنواع مختلفة لخلايا الدم،
- **إرهاق، ألم في البطن** أو **يرقان** (إصفرار العينين أو الجلد)، لأن هذه يمكن أن تدل على حالات خطيرة مثل قصور كبدي، الذي قد يكون مميتاً،
- أعراض **لتلوث** مثل **سخونة، ألم في الحنجرة** أو **سعال**، لأن هذا الدواء قد يزيد من خطورة حدوث تلوث خطير الذي قد يشكل خطراً على الحياة،
- **سعال** أو **مشاكل في التنفس**، لأن هذه يمكن أن تدل على مشاكل في الرئتين (مرض رئوي خلالي أو إرتفاع ضغط الدم الرئوي)،
- وخز غير عادي، ضعف أو ألم في راحتي اليدين أو القدمين، لأن هذه يمكن أن تدل على مشاكل في الجهاز العصبي (إعتلال عصبي محيطي).

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى ١ من بين ١٠ أشخاص)

- انخفاض بسيط في عدد خلايا الدم البيضاء (leucopenia)،
- ردود فعل تحسسية بسيطة،
- قلة الشهية للطعام، انخفاض في الوزن (عادة ليس ذو أهمية)،
- إرهاق (asthenia)،
- صداع، دوار،
- شعور مختلف عن المعتاد في الجلد مثل وخز (paraesthesia)،
- إرتفاع بسيط في ضغط الدم،
- إلتهاب الأمعاء الغليظة (colitis)،
- إسهال،
- غثيان، تقيؤات،
- إلتهاب أو تقرحات في الفم،
- ألم في البطن،
- إرتفاع في بعض نتائج فحص وظائف الكبد،
- تساقط شعر متزايد،
- إكزيما، جفاف الجلد، طفح، حكة،
- إلتهاب الأوتار (ألم في الأوتار ناتج عن إلتهاب الغشاء المحيط بالأوتار، عادة في راحتي اليدين أو القدمين)،
- إرتفاع في إنزيمات معينة في الدم (creatine phosphokinase)،
- مشكلة في أعصاب اليدين أو الرجلين (peripheral neuropathy).

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى ١ من بين ١٠٠ شخص)

- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر دم) وانخفاض عدد الصفيحات الدموية (thrombocytopenia)،
- إنخفاض في نسبة البوتاسيوم في الدم،
- قلق،
- إضطرابات في المذاق،
- urticaria (شرى ـ nettle rash)،
- تمزق الوتر،
- إرتفاع في نسب الشحوم في الدم (كولسترول وتريچليسيريدات)،
- إنخفاض نسب الفوسفات في الدم.

أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تؤثر على حتى ١ من بين ١٠٠٠ شخص)

- إرتفاع عدد خلايا الدم الحمضات (كثرة الحمضات)؛ انخفاض بسيط في عدد خلايا الدم البيضاء (leucopenia)؛ انخفاض عدد كافة خلايا الدم (pancytopenia)،
- إرتفاع خطير في ضغط الدم،
- مرض إلتهابي في الرئتين (interstitial lung disease)
- إرتفاع في نتائج فحوص وظائف الكبد التي قد تتطور لحالات خطيرة مثل إلتهاب الكبد ـ hepatitis ويرقان،
- تلوثات خطيرة تسمى خمج دموي (sepsis) التي قد تكون مميتة،
- إرتفاع في إنزيمات معينة في الدم (لاكتات ديهيدروجيناز).

أعراض جانبية نادرة جداً (من شأنها أن تؤثر على حتى ١ من بين ١٠٠٠٠ شخص)

- إنخفاض واضح في خلايا دم بيضاء (agranulocytosis)،
- ردود فعل تحسسية خطيرة وذات خطورة كامنة،
- إلتهاب الأوعية الدموية الصغيرة (vasculitis، بما في ذلك cutaneous necrotizing vasculitis)،
- إلتهاب في البنكرياس (pancreatitis)،
- تضرر خطير في الكبد مثل قصور الكبد أو نخر الذي قد يكون مميتاً،
- ردود فعل خطيرة، أحياناً تشكل خطراً على الحياة (Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme).

قد تحدث أعراض جانبية أخرى بشيوع غير معروف مثل قصور كلوي، تناقص في نسبة حمض البول في الدم، إرتفاع ضغط الدم الرئوي، تضرر في خصوبة الرجل (التي تعتبر قابلة للعكس عند التوقف عن العلاج بالدواء)، ذئبة جلدية (تتميز بطفح/إحمرار في مناطق الجلد المعرضة للضوء)، داء الصدفية (جديد أو متفاقم)، أو رد فعل تحسسي خطير للدواء يسمى DRESS (أنظر الفقرة ٢، تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء).

في أية حالة تشعر فيها بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو إذا طرأ تغير على شعورك العام عليك إستشارة الطبيب حالاً.

تبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

التخزين:

يجب التخزين دون ٢٥ درجة مئوية، يجب حفظ القنينة مغلقة بإحكام.

بعد فتح القنينة بالإمكان إستعمال المستحضر لمدة ٣ أشهر.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة.

يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- لا يجوز رمي الدواء في مياه المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الصيدلي عن كيفية التخلص من الدواء. يساعد هذا الأمر في الحفاظ على البيئة.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Tablet core: Lactose monohydrate, maize starch, crospovidone, polyvidone K25, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate.
Film coating: Methylhydroxypropylcellulose 5mPs, titanium dioxide (E171), talc, macrogol 8000.
Arava 20 mg also contains: yellow ferric oxide (E172).

كل قرص من عيار ١٠ ملغ يحتوي على ٧٨ ملغ لكتوز مونوهيدرات.

كل قرص من عيار ٢٠ ملغ يحتوي على ٧٢ ملغ لكتوز مونوهيدرات.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

عاراڤا ١٠ ملغ أقراص مطلية هي بيضاء ومستديرة. مطبوع على جانب واحد منها: ZBN. الأقراص معبأة ضمن قنينة ذات ٣٠ قرصاً أو ذات ١٠٠ قرص.

عاراڤا ٢٠ ملغ أقراص مطلية هي مائلة إلى الأصفر وعلى شكل مثلث. مطبوع على جانب واحد منها: ZBO. الأقراص معبأة ضمن قنينة ذات ٣٠ قرصاً أو ذات ١٠٠ قرص.

ليست كافة أحجام العلب مسوّقة.

المنتج: سانوفي وينتروب للصناعات، فرنسا.

صاحب الإمتياز: سانوفي - أڤنتيس إسرائيل م.ض.، شارع بني چاؤون ١٠، ص.ب. ٨٠٩٠، نتانيا ٤٢٥٠٤٩٩، إسرائيل.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في كانون الثاني ٢٠١٦

لا تشمل هذه النشرة كافة المعلومات عن المستحضر. إذا توفر لديك أي سؤال أو إذا لم تكن واثقاً من أمر ما الرجاء مراجعة الطبيب.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

عاراڤا ١٠ ملغ: ١٢١-٧٨-٣٠١٣٢

عاراڤا ٢٠ ملغ: ١٢١-٧٩-٣٠١٣٣

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة أغلب هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.