

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص من قبلها في أيار 2013

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب.

تيرز ناتورال فري

قطرة للعينين

التركيب:

Dextran 70 دكستران 70 0,1%

Hydroxypropyl Methylcellulose هيدروكسي بروبيل ميثيل سلوز 3,0%

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

تأثيرات الدواء الطيبة:

الدواء مخصص للتخفيف المؤقت من شعور الإنزعاج الناتج عن تهيج العين أو التعرض للرياح والشمس.

الفصيلة العلاجية: مواد مرلقة.

(2) قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• إذا كنت على علم بوجود حساسية لديك لأحد مركبات الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- في حالة ألم في العينين
- تغيرات في الرؤية، إحمرار متواصل في العينين أو تهيج
- في حالة تفاقم التهيج والجفاف واستمرارهما أكثر من ٧٢ ساعة - يجب التوقف عن استعمال المستحضر واستشارة الطبيب.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

كما هو معروف، هناك توافق فيزيائي وكيميائي بين تيرز ناتورال فري وبين أغلب القطرات العينية. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

- قطرات عينية أخرى - من أجل الحذر يجب الإمتناع عن الإستعمال المتزامن مع تيرز ناتورال فري وذلك لمنع عدم إمتصاص المركبات الفعالة في نسيج العين.

(3) كيفية استعمال الدواء؟

يجب الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

إرشادات الإستعمال:

اغسل يديك جيداً. ميلّ رأسك إلى الورا، أو إستلق على فراش وابعد الجفن السفلي بإصبعك عن العين قليلاً. ثم نقط من الدواء في داخل الفجوة الحاصلة واغلق عينيك بعدئذ لفترة دقيقة - دقيقتين. لا ترف عينيك.

منع تلوث المحلول - يجب الحرص على عدم ملامسة فوهة القنينة أي مسطح كان، بما في ذلك الإصبع أو العين.

المقدار الدوائي الإعتيادي يكون عادة:

قطرة - قطرتين في العين حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إنتبه:

لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط. إذا أفرطت في إستعمال المقادير الدوائية أو إذا بلع طفل بالخطأ من هذا الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بخصوص إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن إستعمال تيرز ناتورال فري قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيّاً منها.

الأعراض الجانبية التي تقتضي إهتماماً خاصاً:

ألم في العينين، تغيير في الرؤية، إحمرار وتهيج متواصلين في العين أو إذا تفاقم الوضع أو إذا إستمر لفترة تزيد عن ٧٢ ساعة (نادراً): توقف عن العلاج وراجع الطبيب.

إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر الكرتون/الملصقة. يشير تاريخ الصلاحية الى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.
- مدة الصلاحية بعد الفتح: للاستخدام الفردي. يجب التخلص من القنينة مع ما تبقى من المحلول فوراً بعد الاستخدام.

(6) معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة (للمواد) الفعالة أيضاً:

Sodium chloride, potassium chloride, sodium borate, sodium hydroxide, hy-drochloric acid, purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
٣٢ قنينة بلاستيكية تحوي 9،٠ ملل سائل رائق وعديم اللون.
صاحب الإمتياز:
ليدوت ميديكال للإستيراد والتسويق م.ض.، شارع هاشيطا 8، ص.ب 3552، PARK الصناعة قيساريا،
38900

المنتج:
Laboratories Alcon, S.A, France

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٣٠٦٥٥ ٨٨ ١٢٧

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك،
فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.