

מדריך למטופל

אימפינזי 120 מ"ג/ג 2.4 מ"ל
אימפינזי 500 מ"ג/ג 10 מ"ל
(דורבאלומאב)

معلومات هامة للمتعالج

إيمפינزي 120 ملغ/2.4 ملل
إيمפינزي 500 ملغ/10 ملل
(دورفالوماب)



אימפינזי 120 מ"ג / 2.4 מ"ל
אימפינזי 500 מ"ג / 10 מ"ל
(דורבאלומאב)

"מדריך זה למטופל נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות ביוני 2018"

מדריך לניטור סימני תופעות לוואי

למד מדוע זה חשוב וכיצד ניתן לעשות זאת

אימפינזי (דורבאלומאב) הינה תרופת מרשם, הפועלת דרך מערכת החיסון שלך ומיועדת לטיפול בסרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים ובסרטן שלפוחית ודרכי השתן בחלק מהחולים, אימפינזי עלול לגרום למערכת החיסון לתקוף אברים ורקמות בריאים ולשבש את תפקודם. תופעות אלו עלולות לעיתים להיות חמורות או מסכנות חיים ואף להוביל למוות. תופעות לוואי אלו עלולות להופיע, פעמים רבות, גם לאחר התחלת הטיפול.

ניטור ודיווח סימני תופעות לוואי

במהלך הטיפול באימפינזי עליך לחפש אחר סימני תופעות לוואי. עליך לזכור כיצד הרגשת לפני תחילת הטיפול בתרופה, משום שיתכן והנך כבר חש תופעות לוואי עקב מחלת הסרטן שלך או עקב טיפולים קודמים.

זהה את תופעות הלוואי מוקדם

במידה ותופעת לוואי מזהה מוקדם, ניתן יהיה לטפל בה לפני החמרתה וייתכן וניתן יהיה למנוע את הפסקת הטיפול

חשוב ליידע את הרופא המטפל בכל שינוי החל בגופך. ספר לרופא כיצד אתה חש, ודווח לו אודות סימנים חדשים לתופעות לוואי או כל שינוי אחר. זכור, תופעת לוואי קטנה עלולה להוביל למשהו חמור יותר ללא טיפול. אם יש לך שאלות בנוגע לטיפול, שאל את הרופא המטפל. המידע במדריך זה אינו מחליף את התייעצותך עם הצוות הרפואי שלך. אנא אל תנסה לטפל בתופעות הלוואי בעצמך ללא התייעצות עם הרופא המטפל שלך.

מידע לשם יצירת קשר עם הרופא המטפל:


שם: _____

מספר הפלאפון שלו: _____

כתובת דואר אלקטרוני: _____

תופעות לוואי הדורשות התייחסות מידית

אנא חפש אחר תופעות הלוואי הבאות הדורשות התייחסות מידית, לשם זיהוי וטיפול מוקדם. במידה והנך מפתח אחת מהבעיות/ התסמינים מטה או במידה ואחד מהתסמינים מתמיר, אנא התקשר או פנה מיד לרופא. אנא אל תנסה לטפל בתופעות הלוואי הללו בעצמך לפני התייעצות עם הרופא המטפל שלך.

ריאות (פנאומוניס)		בלטות הורמונליות (בייחוד בלטות התריס, האדרנל ויותרת המוח)		עייפים	
	<ul style="list-style-type: none"> שיעול או החמרה בשיעול קיים קוצר נשימה כאב בחזה 		<ul style="list-style-type: none"> כאבי ראש שאינם חולפים או יוצאי דופן עייפות קיצונית עלייה או ירידה במשקל סחרחורת או עולפון הרגשת צמא או רעב מוגברת נשידה הרגשת קור עצירות מתן שתן באופן תכוף מהרגיל בחילה או הקאה כאב באזור הבטן שינויי מצב הרוח או התנהגות, כמו ירידה בחשק המיני, עצבנות או שכתות. 		<ul style="list-style-type: none"> ראיה מטושטשת או כפולה כאבים בעיניים או אדמומיות בועות אחרות בראייה
	<p>כבד (היפטיטיס)</p> <ul style="list-style-type: none"> הצטבה של העור או בחלק הלבן בעין בחילה חמורה או הקאות כאב באזור הבטן גמגום שתן כהה (צבע של תה) דימום או חבלה יותר בקלות מבדרר כלל 		<p>לב</p> <ul style="list-style-type: none"> קוצר נשימה בעת מאמץ עייפות דיסקיות לב מואצות כאבים בחזה 		<p>עור</p> <ul style="list-style-type: none"> פריחה גוד שלפוחיות עוריות
	<p>מערכת העיכול (קוליטיס)</p> <p>שלשול</p> <ul style="list-style-type: none"> פעילות מעיים תכופה יותר מבדרר כלל צואה שחורה, יזפתית, דביקה או מנחתת דם או ריר כאב חמור או רגישות יותר בבטן 		<p>שרירים</p> <ul style="list-style-type: none"> קוצר נשימה בעת מאמץ עייפות דיסקיות לב מואצות כאבים בחזה 		<p>איברים אחרים</p> <ul style="list-style-type: none"> נזקקות כבדות נזקקת נזקקת שינויים במצב הרוח או בהתנהגות
	<p>כליות כולל וברייטיס וכשל כליתי</p> <ul style="list-style-type: none"> ירידה בכמות השתן דם בשתן נפיחות בקיסטליים 				<p>איברים אחרים</p> <ul style="list-style-type: none"> נזקקות כבדות נזקקת נזקקת שינויים במצב הרוח או בהתנהגות

בדיקות מעבדה:

קיים קושי לנתר סימנים של חוסר איזון הורמונלי, וייתכן שוני בין נשים וגברים. על כן, ייתכן ותידרש על ידי הצוות הרפואי לבצע בדיקות דם לשם כך.

מידע בטיחותי נוסף:

- קבלת סיוע רפואי מידי יכולה למנוע את החמרת הבעיות הללו.
- במהלך הטיפול באימפיזני הצוות הרפואי יבדוק אותך עבור בעיות אלו.
- ייתכן ותקבל טיפול בקורטיקוסטרואידים או תחליפים הורמונליים.
- ייתכן והטיפול באימפיזני יופסק או יידחה במידה ויתפתחו תופעות לוואי חמורות. במידה והנך נמצא במיון או מטופל על ידי רופא שאינו הרופא הקבוע שלך, עליך לשתף את הצוות הרפואי שהנך לוקח טיפול מסוג אימונתרפיה.

3 טיפים לניטור ודיווח סימני תופעות לוואי:

1. מרגע תחילת הטיפול, מלא את הכרטיס מיידע למטופל ושא אותו עמך בכל עת.
2. אנא המשך לשאת את הכרטיס מיידע למטופל גם לאחר סיום הטיפול, כיון שתופעות לוואי עלולות להופיע גם מספר חודשים לאחר סיום הטיפול.
3. אם יש ברשותך טלפון נייד עם מצלמה, צלם את הכרטיס מיידע למטופל, למקרה שיישכח בבית.

לשם דיווח תופעות לוואי חשודות, אנא פנה לחברת אסטרזהניקה:

באתר - <https://aereporting.astrazeneca.com/> או
בכתובת הדואר האלקטרונית - Safety.Israel@astrazeneca.com

ניתן גם להתקשר למספר הטלפון - 09-7406528

ניתן גם לדווח תופעות לוואי ישירות למשרד הבריאות הישראלי על ידי שימוש בטופס מקוון או דרך הקישור:

[WWW.HEALTH.GOV.IL https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il](https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il)

إيمفينزي ١٢٠ ملغ/٢,٤ ملل

إيمفينزي ٥٠٠ ملغ/١٠ ملل

(دورفالوماب)

"فُحص دليل المتعالم هذا ورُخص من قبل وزارة الصحة في حزيران ٢٠١٨"

دليل لمراقبة علامات الأعراض الجانبية تعلم لماذا هذا الأمر مهم وكيف يمكن فعل ذلك

إيمفينزي (دورفالوماب) عبارة عن دواء يصرف بوصفة طبيب، حيث يعمل عن طريق جهازك المناعي ومخصص لعلاج سرطان الرئتين من نوع الخلايا غير الصغيرة وسرطان المثانة والمسالك البولية

قد يجعل إيمفينزي لدى بعض المرضى، جهاز المناعة يهاجم أعضاء وأنسجة سليمة ويشوش وظائفها. أحياناً قد تكون هذه الأعراض خطيرة أو تشكل خطراً على الحياة لا بل قد تسبب الوفاة. قد تظهر هذه الأعراض الجانبية، عدة مرات، أيضاً بعد بدء العلاج.

المراقبة والتبليغ عن علامات أعراض جانبية

خلال فترة العلاج بـ إيمفينزي عليك البحث عن علامات الأعراض الجانبية. عليك أن تتذكر كيف كان شعورك قبل بدء العلاج بالدواء، لأنه من الجائز أنك تشعر حالياً بأعراض جانبية نتيجة مرض السرطان لديك أو نتيجة علاجات سابقة.

شخص الأعراض الجانبية مبكراً

إذا شخص عرض جانبي مبكراً، فبالإمكان علاجه قبل تفاقمه ومن الجائز أن يكون بالإمكان منع إيقاف العلاج

من المهم إبلاغ الطبيب المعالج عن أي تغيير يطرأ على جسمك. أبلغ الطبيب كيف تشعر، وبلغه عن علامات جديدة لأعراض جانبية أو عن أي تغيير آخر. تذكر بأن عرض جانبي بسيط قد يؤدي إلى أمر أكثر خطورة إذا لم يُعالج.

إسأل الطبيب المعالج، إذا توفرت لديك أسئلة عن العلاج. إن المعلومات التي في هذا الدليل لا تشكل بديلاً عن إستشارتك للطبيب الخاص بك.

الرجاء لا تحاول معالجة الأعراض الجانبية بنفسك بدون إستشارة الطبيب المعالج الخاص بك.

معلومات من أجل التواصل مع الطبيب المعالج:

الإسم: _____

رقم الهاتف النقال الخاص به: _____

عنوان البريد الإلكتروني: _____

أعراض جانبية تتطلب اهتماماً فورياً

الرجاء إيحاء عن الأعراض الجانبية التالية التي تتطلب اهتماماً فورياً، من أجل التشخيص والعلاج المبكر. إذا تطورت لديك إحدى المشاكل / الأعراض أدناه أو إذا تفاقم أحد الأعراض الرجاء إتصل أو راجع الطبيب فوراً. الرجاء لا تحاول معالجة هذه الأعراض الجانبية بنفسك قبل استشارة الطبيب المعالج الخاص بك.

العينين		عدد هورمونية خاصة الغدة الدرقية، الكظرية والخامية		الربتين (إتهاب الربتين)	
	<ul style="list-style-type: none"> تشوش أو ازدواج الرؤية الآم أو إحصار في العينين مشاكل أخرى في الرؤية 		<ul style="list-style-type: none"> صداع لا يزول أو شاذ إرهاق شديد إزدیاد أو انخفاض في الوزن دوار أو إغماء شعور متزايد بالعطش أو الجوع تساقط الشعر الشعور ببرودة إمسك تبول بوتيرة أكبر من المعتاد غثيان أو تقيؤ آلم في منطقة البطن تغيرات في الحالة النفسية أو السلوك، مثل: تذبذب الرغبة الجنسية، عصبية أو نسيان. 		<ul style="list-style-type: none"> سعال أو تفاقم السعال الحالي ضيق في التنفس آلم في الصدر
إتهابات خطيرة		العضلات		الكبد (إتهاب الكبد)	
	<ul style="list-style-type: none"> سخونة سعال الإحاح على التبول آلم عند التبول أعراض تشبه الإنفلونزا 		<ul style="list-style-type: none"> ضيق في التنفس عند بذل مجهود إرهاق تسارع ضربات القلب الآم في الصدر 		<ul style="list-style-type: none"> إسهال نشاط معوي بوتيرة أكبر من المعتاد براز أسود، قطني، لزج أو دموي أو مخاطي آلم شديد أو حساسية مفرطة في البطن
الجلد		القلب		الجهاز الهضمي (إتهاب القولون)	
	<ul style="list-style-type: none"> طفح حكة حويصلات جلدية 		<ul style="list-style-type: none"> تصلب في الجزء الخلفي من الرقبة سخونة تغيرات في الحالة النفسية أو في السلوك 		<ul style="list-style-type: none"> انخفاض في كمية البول دم في البول إنتفاخ في الكاحلين

الفحوص المخبرية:

توجد صعوبة في مراقبة علامات عدم التوازن الهورموني، ومن الجائز وجود إختلاف بين النساء والرجال. لذا، من الجائز أن يطلب منك الطاقم الطبي إجراء فحوص دم من أجل ذلك.

معلومات إضافية حول الأمان:

- تلقي مساعدة طبية فورية يمكن أن يمنع تفاقم هذه المشاكل.
 - بفحصك الطاقم الطبي بخصوص مثل هذه المشاكل خلال فترة العلاج بـ إيمفينزي.
 - من الجائز أن تتلقى علاجاً بكورتيكوستيروئيدات أو بدائل هورمونية.
 - من الجائز التوقف عن أو تأجيل العلاج بـ إيمفينزي وذلك إذا تطورت أعراض جانبية خطيرة.
- إذا كنت في غرفة الطوارئ أو تتلقى علاجاً من قبل طبيب ليس طبيبك الدائم، فُعليك إحاطة علم الطاقم الطبي بأنك تستعمل علاج من نوع العلاجات المناعية.

٣ نصائح للمراقبة والتبليغ عن علامات لأعراض جانبية:

١. من لحظة بدء العلاج، إملأ بطاقة المعلومات للمتعالج وأحملها معك طوال الوقت.
٢. الرجاء واصل حمل بطاقة المعلومات للمتعالج أيضاً بعد إنتهاء العلاج، لأن الأعراض الجانبية قد تظهر أيضاً بعد عدة أشهر من إنتهاء العلاج.
٣. إذا كان بحوزتك هاتف نقال مزود بكاميرا، فقم بتصوير بطاقة المعلومات للمتعالج، تحسباً لحالة نسيانها في البيت.

للتبليغ عن أعراض جانبية مشكوك فيها، الرجاء توجه لشركة أسترازينيكا:

على الموقع - <https://aereporting.astrazeneca.com>

أو بواسطة البريد الإلكتروني - Safety.Israel@astrazeneca.com

بإمكان أيضاً الإتصال على هاتف رقم - ٠٩-٧٤٠٦٥٢٨

بإمكان أيضاً التبليغ عن أعراض جانبية مباشرة لوزارة الصحة الإسرائيلية عن طريق إستعمال النموذج المباشر أو عن طريق الرابط:

<http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

<http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

Лабораторные тесты: Признаки гормонального дисбаланса трудно отслеживать и они могут различаться у мужчин и женщин.

Поэтому для данной цели может потребоваться проведение медицинским персоналом анализов крови.

Дополнительная информация по безопасности:

- Получение немедленной медицинской помощи может избежать ухудшения этих проблем.
- В период лечения препаратом ИМФИНЗИ медицинский персонал проверит Вас на наличие данных проблем.
- Возможно, Вы будете получать кортикостероиды или заместительную гормональную терапию.
- При возникновении тяжелых побочных явлений лечение препаратом ИМФИНЗИ может быть прекращено или отложено.

Если Вы находитесь в приемном отделении или Вас лечит не Ваш постоянный врач, Вы должны сообщить медицинскому персоналу, что Вы получаете иммунотерапию.

3 Совета по мониторингу и отчету о признаках побочных явлений:

1. С момента начала лечения заполните информационную карточку пациента и все время держите ее при себе.
2. Пожалуйста, продолжайте держать при себе информационную карточку пациента и после завершения лечения, так как побочные явления могут возникать и через несколько месяцев после окончания лечения.
3. Если у Вас есть мобильный телефон с камерой, сфотографируйте на него информационную карточку пациента, на случай, если Вы забудете ее дома.

Для отчета о подозрительных побочных явлениях, пожалуйста, обратитесь в компанию АстраЗенека:

На сайт: <https://aereporting.astrazeneca.com>

или на адрес электронной почты: Safety.Israel@astrazeneca.com

Можно также позвонить по телефону: 09-7406528

О побочных явлениях можно также сообщить прямо в Министерство Здравоохранения Израиля, используя онлайн форму, или зайдя по линку: WWW.HEALTH.GOV.IL <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ СРОЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Пожалуйста, выявляйте следующие побочные явления, требующие немедленного вмешательства, для их ранней идентификации и лечения. Если у Вас развивается одна/один из нижеперечисленных проблем/симптомов, или один из этих симптомов усиливается, немедленно свяжитесь с врачом или обратитесь к нему. Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно лечить данные побочные явления без предварительной консультации Вашего лечащего врача

 <ul style="list-style-type: none"> ● Кашель или ухудшение уже имеющейся кашля ● Одышка ● Боль в груди 	<p>ЛЕГКИЕ (ПНЕВМОНИЯ)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Непроходящая головная боль или необычный характер головной боли ● Крайняя усталость ● Увеличение или снижение веса ● Головокружение или обморок ● Усиленное чувство жажды или голода ● Потеря волос ● Ощущение холода ● Запор ● Учащенное мочеиспускание ● Тошнота или рвота ● Боль в области живота ● Изменения настроения или поведения, такие как снижение полового влечения, раздражительность или забывчивость 	<p>ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (ОСОБЕННО ШИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗДА, НАДПОЧЕЧНИК И ГИПОФИЗ)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Двоение или расплывчатое зрение ● Боль или покраснение глаз ● Другие проблемы со зрением 	<p>ГЛАЗА</p>
<p>ПЕЧЕНЬ (ГЕПАТИТ)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Пожелтение кожи или белков глаз ● Сильная тошнота или рвота ● Боль в области живота ● Сонливость ● Темная моча (цвета чая) ● Кровотечение или кровоподтеки, возникающие легче, чем обычно 	<p>ТЯЖЕЛЫЕ ВОСПАЛЕНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Повышение температуры тела ● Кашель ● Учащенное мочеиспускание ● Беззачастое мочеиспускание ● Гриппоподобные симптомы 	<p>ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (КОЛИТ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Понос ● Учащенная, по сравнению с обычной, дефекация ● Черный, дегтеобразный, липкий кал или кал с примесью крови или слизи ● Сильная боль или повышенная чувствительность живота 	<p>СЕРДЦЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Одышка во время нагрузки ● Усталость ● Учащенное сердцебиение ● Боль в груди 	<p>КОЖА</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Сыпь ● Зуд ● Кожные волдыри
 <p>ПОЧКИ, ВКЛЮЧАЯ НЕФРИТ И ПОЧЕЧНУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Уменьшение количества выделяемой мочи ● Кровь в моче ● Отечность лодыжек 	<p>МЫШЦЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Боль или ригидность мышц ● Мышечная слабость 	<p>ДРУГИЕ ОРГАНЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ригидность затылка ● Повышение температуры тела ● Изменения настроения или поведения 	 <ul style="list-style-type: none"> ● Одышка во время нагрузки ● Усталость ● Учащенное сердцебиение ● Боль в груди 	 <ul style="list-style-type: none"> ● Сыпь ● Зуд ● Кожные волдыри 	<p>ПОЧКИ, ВКЛЮЧАЯ НЕФРИТ И ПОЧЕЧНУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Уменьшение количества выделяемой мочи ● Кровь в моче ● Отечность лодыжек

ИМФИНЗИ 120 мг/2.4 мл ИМФИНЗИ 500 мг/10 мл (дурвалумаб)

"Данное Руководство для Пациента проверено и утверждено Министерством
Здравоохранения в Июне 2018"

РУКОВОДСТВО ПО МОНИТОРИНГУ ПРИЗНАКОВ ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ВЫУЧИТЕ, ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО И КАК ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

ИМФИНЗИ (дурвалумаб) – отпускается по рецепту врача, действует на Вашу иммунную систему и предназначен для лечения немелкоклеточного рака легких, злокачественных опухолей мочевого пузыря и мочевыводящих путей

У некоторых пациентов ИМФИНЗИ может вызвать атаку иммунной системой нормальных органов и тканей и привести к нарушению их функции. Эти проблемы иногда могут быть тяжелыми или представлять угрозу для жизни и даже привести к летальному исходу. Такие побочные явления часто могут возникнуть даже после начала лечения.

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТ О ПРИЗНАКАХ ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ

В процессе лечения препаратом ИМФИНЗИ, Вам необходимо выявлять признаки побочных явлений с учетом Вашего самочувствия до начала лечения препаратом, поскольку Вы уже можете ощущать побочные явления, вызванные самой опухолью, или возникшие вследствие предыдущего лечения.

ВЫЯВЛЯЙТЕ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА РАННЕЙ СТАДИИ ИХ РАЗВИТИЯ

Раннее обнаружение побочного явления дает возможность лечить его до его ухудшения, что может позволить избежать прекращения лечения

Очень важно информировать Вашего лечащего врача обо всех изменениях в Вашем организме. Расскажите врачу о Вашем самочувствии, о новых признаках побочных явлений или любых других изменениях. Помните, что без лечения, даже незначительное побочное явление может привести к чему-то более серьезному.

Если у Вас есть вопросы относительно лечения, задайте их лечащему врачу. Информация, содержащаяся в данном руководстве, не заменяет консультацию Вашего медицинского персонала.

Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно лечить побочные явления без консультации Вашего лечащего врача.

Контактная информация лечащего врача:

Имя: _____

Номер мобильного телефона: _____

Адрес электронной почты: _____

Additional Safety Information

- Getting medical treatment right away may help keep these problems from becoming more serious.
- Your healthcare provider will check you for these problems during your treatment with IMFINZI.
- Your healthcare provider may treat you with corticosteroid or hormone replacement medicines.
- Your healthcare provider may delay or completely stop treatment with IMFINZI if you have severe side effects.

If you visit the emergency room or a doctor who is not on your regular care team, it's important to share that you are getting an immunotherapy.

3 tips to make sure you get the appropriate care:

1. Once you have started treatment, fill out the patient Alert Card and keep it with you at all times
2. Even after you stop treatment keep the patient Alert Card with you because side effects may occur for up to several months after your last treatment
3. If you have a phone with a camera take a picture of the Patient Alert card just in case you leave it at home

To report SUSPECTED ADVERSE REACTIONS, contact AstraZeneca

<https://aereporting.astrazeneca.com/> or Safety.Israel@astrazeneca.com

You can also call us on phone number: 09-7406528

You may also report side effects to the Israeli ministry of health by using online form: WWW.HEALTH.GOV.IL or by entering the link:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

URGENT SIDE EFFECTS

Look out for the following urgent signs of side effects so they may be caught and managed early. Call or see your doctor right away if you develop any of the following problems/symptoms or if these symptoms get worse.

Do not attempt to treat any of the side effects without talking to your doctor first

LUNG PROBLEMS (PNEUMONITIS)	HORMONE GLAND PROBLEMS (ESPECIALLY THE THYROID, ADRENALS AND PITUITARY)	EYE PROBLEMS
 <ul style="list-style-type: none"> • New or worsening cough • Shortness of breath • Chest pain 	 <ul style="list-style-type: none"> • Headaches that will not go away or unusual headaches • Extreme tiredness • Weight gain or weight loss • Dizziness or fainting • Feeling more hungry or thirsty than usual • Hair loss • Feeling cold • Constipation • Urinating more often than usual • Nausea or vomiting • Stomach area (abdomen) pain • Changes in mood or behaviour, such as decreased sex drive, irritability or forgetfulness 	 <ul style="list-style-type: none"> • Blurry or double vision • Other vision problems • Eye pain or redness
LIVER PROBLEMS (HEPATITIS)	SEVERE INFECTIONS	
 <ul style="list-style-type: none"> • Yellowing of your skin or the whites of your eyes • Severe nausea or vomiting • Pain in your stomach area (abdomen) • Drowsiness • Dark urine (tea coloured) • Bleeding or bruising more easily than usual 	 <ul style="list-style-type: none"> • Fever • Cough • Frequent urination • Pain when urinating • Flu like symptoms 	
INTESTINAL PROBLEMS (COLITIS)	HEART PROBLEMS	PROBLEMS IN OTHER ORGANS
 <ul style="list-style-type: none"> • Diarrhoea • More bowel movements than usual • Stools that are black, tarry, sticky, or have blood or mucus • Severe pain or tenderness in stomach area (abdomen) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Shortness of breath with activity • Tiredness • Heart palpitations 	 <ul style="list-style-type: none"> • Neck stiffness • Fever • Changes in mood or behaviour
KIDNEY PROBLEMS INCLUDING NEPHRITIS AND KIDNEY FAILURE	MUSCLE PROBLEMS (MYOSITIS/POLYMYOSITIS)	SKIN PROBLEMS
 <ul style="list-style-type: none"> • Producing less urine than normal • Blood in urine • Swelling in your ankles 	 <ul style="list-style-type: none"> • Muscle pain or stiffness • Muscle weakness 	 <ul style="list-style-type: none"> • Rash • Itching • Skin • Blistering

IMFINZITM **(durvalumab)**

"This Patient guide, format and content has been checked and approved by the Ministry of Health"

A GUIDE TO MONITORING FOR SIGNS OF SIDE EFFECTS

LEARN WHY IT'S IMPORTANT AND HOW TO DO IT

IMFINZI™ (durvalumab) is a prescription medicine used to treat type of cancer in the lung and bladder, including the urinary tract system, by working with your immune system.

In some patients, IMFINZI can cause the immune system to attack normal organs and tissues and can affect the way they work. These problems can sometimes become serious or life-threatening and can lead to death. This Adverse event can also accrue a lot of time after the beginning of treatment.

MONITORING AND REPORTING SIGNS OF SIDE EFFECTS

While you are on IMFINZI, you will need to look out for any signs of side effects keeping in mind how you felt before treatment started as you may have already be feeling side effects from your cancer or previous treatments.

CATCH YOUR SIDE EFFECTS EARLY

If a side effect is identified early, it may be managed before becoming more serious and possibly causing treatment to be stopped.

It's important to let your doctor know of any changes in your body. Talk to him/her about how you're currently feeling, new signs of side effects, or any other change. Remember, a small side effect can lead to something more serious if not treated.

If you have any questions about your treatment, ask your doctor. The information in this brochure does not take the place of talking to your care team about your IMFINZI™ cancer or treatment.

Do not attempt to treat side effects yourself before talking to your doctor.

Physician contact information: _____

Name: _____

Phone number: _____

Email: _____

Patient guide

IMFINZI™
(durvalumab)

Руководство для Пациента

ИМФИНЗИ 120 мг/2.4 мл
ИМФИНЗИ 500 мг/10 мл
(дурвалумаб)