بطاقة للمتعالج - أودومزو ٢٠٠ ملغ

يُمنع استعمال أودومزو إذا:

☒ كنت حاملاً أو تشكين أنك حامل
☒ كنت مرضعة أو تخططين أن ترضعي
☒ كنت لا تمتنع/ين عن ممارسة العلاقات الجنسيّة **أو**، أنت امرأة، ولا تستخدمين وسيلتي منع حمل موصى بهما.

إذا كنت أنتَ أو أنتِ تتعالج/ين حاليًا بأودومزو أو إذا تعالجت في الأشهر الـ ٢٠ الأخيرة (٢٠ شهرًا للمتعالجات و- ٦ أشهر للمتعالجين)، ويوجد شك أنك أو شريكتك (في حالة متعالج) قد حملت، يجب التوقف عن الاستعمال فورًا والاتصال بالطبيب المُعالج.

يجب على كل المتعالجين بأودومزو النشطين جنسيًا خلال أو بعد العلاج الحرص على اتباع التوصيات التالية لمنع الحمل:

- إذا كنت امرأة، يجب عليك الامتناع تمامًا عن ممارسة العلاقات الجنسيّة **أو** استعمال وسيلتي منع حمل موصى بهما خلال ٢٠ شهرًا من تناول الجرعة الأخيرة.
- إذا كنت رجل، يجب عليك استعمال الواقي الذكريّ خلال ممارسة علاقة جنسية، حتى إذا اجتزت أيضًا عملية استئصال لأنبوب المنيّ، خلال ٦ أشهر من تناول الجرعة الأخيرة.

يجب على النساء المتعالجات إجراء فحص حمل خلال ٧ أيام قبل بدء العلاج بأودومزو ومرّة في الشهر خلال العلاج.

يجب استعمال وسيلتي منع حمل. يجب استعمال وسيلة منع حمل واحدة **من كل عمود.**		
وسيلة منع حمل انسدادية		**وسيلة منع حمل ذات فعالية عالية**
• واقي ذكري للرجل (مع مُبيد للمنيّ، قدر الإمكان) أو • العازل الأنثويّ مع مبيد للمنيّ	**بالدمج مع**	• جهاز داخل الرحم (IUD) أو • ربط الأنابيب **أو** • استئصال أنبوب المنيّ

- أودومزو ٢٠٠ ملغ ممكن أن يُسبّب تشوهات خلقية خطيرة
- هذا الدواء ممكن أن يؤدي إلى موت الجنين أو المولود
- يجب عليك أنت أو شريكتك الامتناع عن الحمل خلال العلاج بالدواء
- إذا كنت امرأة، استشيري الطبيب المُعالج إذا كنت مرضعة أو إذا حملت خلال العلاج بأودومزو أو خلال ٢٠ شهرًا بعد تناول الجرعة الأخيرة
- إذا كنت رجلا، استشر الطبيب المُعالج إذا كان هنالك شك بأن شريكتك قد حملت خلال العلاج أو خلال ٦ أشهر بعد تناول الجرعة الأخيرة
- يجب على النساء والرجال اتباع تعليمات منع الحمل الموصوفة في هذه الكراسة

بعد العلاج:

- عند إنتهاء العلاج بأودومزو، يجب إعادة الكبسولات التي لم تستخدمها للصيدليّ
- يُمنع التبرع بالدم خلال العلاج ولمدة ٢٠ شهرًا بعد تناول الجرعة الأخيرة

الأعراض الجانبيّة لأودومزو

- تحتوي النشرة للمستهلك على قائمة كاملة بكل الأعراض الجانبيّة المعروفة بهذا الدواء. من المهم معرفة الأعراض الجانبيّة التي من الممكن أن تشعر/ين بها خلال العلاج. في حال ظهور أي عرض جانبيّ، يجب تبليغ الطبيب المُعالج.
- من الممكن تبليغ وزارة الصحّة عن أعراض جانبيّة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبيّة نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحّة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى إستمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبيّة، أو عبر دخول الرابط.

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

أو لشركة تارو إنترناشونال من خلال البريد الإلكتروني drug.safety@taro.co.il

احتفظ بهذه البطاقة في مكان بارز للعين ليُذكرك بوسائل الحذر التي عليك اتخاذها خلال العلاج بأودومزو.

صيغة كراسّة معلومات السلامة هذه ومحتواها تمّ فحصها والتصديق عليها من قِبل وزارة الصحّة في تشرين الثاني ٢٠١٧ .