

اندومنرين فرصل للمهبل

المادة الفعالة:

كل قرص للمهبل يحتوي على: ١٠٠ ملgr بروجسترون

(progesterone 100 mg)

المواد غير الفعالة وملادات الحساسية: انتظر البند

[علومات إضافية]:

في درء انتفاخ الرحم، التي تشير إلى امكانية لختارات مووية في الدماغ أو العين.

نظام اعراض الافتكتان.

٤. تغيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

كوني نفحة جذا وانتفقي طبيك فورا إذا كنت تغشين الموصى بها بشكل عام.

الجرعة المعتدلة هي ١٠٠ ملغ التي يجب إدخالها مبكرة بعد أيام.

لداخل مهبل ثلاث مرات في اليوم، ابتداء من اليوم الأول لنشط البوصيات يمكن الاستمرار في استعمال الدواء حتى

١٢ أسبوع من يوم الشفط.

لا يجوز تناول الجرعة الموصى بها.

لا يجوز دخول النساء في النبات.

الأعراض الجانية الأخرى شديدة هي آلام رأس.

اضطرابات في المهبل وانتفاخات في الرحم.

يجب إيقاف الاستعمال وتوجه فورا إلى طببك

إذا ظهرت الأعراض التالية أثناء الداء أو حتى عده أيام بعد الجرعة الأخيرة.

الآم في الصدر، ضيق نفس مفاجئ أو مشاعر مزعجة عن متناول أيدي

الرجليتين، في القلب أو في الرئتين.

أعراض شديدة ومتقطعة، موجات دوخة، إغماء أو تغيرات في الرؤية أو في الحديث، ضفت، قلة شعور

الرجلين، في القلب أو في الرئتين.

أعراض متقطعة، موجات دوخة، إغماء أو تغيرات في الرؤية أو في الحديث، ضفت، قلة شعور في الرئتين، في القلب أو في الرئتين.

أعراض متقطعة، موجات دوخة، إغماء أو تغيرات في الرؤية أو في الحديث، ضفت، قلة شعور في الرئتين، في القلب أو في الرئتين.

كذلك أدى الداء إلى انتفاخات مفاجئة على المفصل، برقع وركبتين متباينتين، أدى إلى احتشاء الطرف الرفيع من

ذكرى، والفقام، حالسة أو عندما تكون متباينة عندما

يُعطى المكبس لتحرير الفرس.

إذا تناولين، أو إذا تناولت موزفيرا أو إذا كان

الإمكان أن تتناولوا أدوية أخرى أي كانت، بما في ذلك انتزاع المفصل وأغسليه جيداً بهم ساخن جاري، امسحه بمقشر ناعم واحفظه للاستعمال القائم.

الآن، فلنلقي بالنظر في مصرف المياه أو في التفاصيل.

الآن، فلنلقي بالنظر في مصرف المياه أو في التفاصيل.

إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا بلي ولد من الداء

عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.

إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا تناولت جرعة مفرطة في طريقي المهبل، هذه المستحضرات قد تؤدي لتنفس في

فعاليات المهدئ، هامونات بروجستوجينية (rifampin).

إذا استعملت اندومنرين أكثر مما كان عليه استعماله

استثيري طبيك أو الصيدلي.

إذا استعملت جرعة مفرطة، أو إذا بلي ولد من الداء

عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.

إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا تناولت جرعة مفرطة عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.

إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا تناولت جرعة مفرطة عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.

إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا تناولت جرعة مفرطة عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.

إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا تناولت جرعة مفرطة عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.

إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا تناولت جرعة مفرطة عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.

إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا تناولت جرعة مفرطة عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.

إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا تناولت جرعة مفرطة عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.


إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا تناولت جرعة مفرطة عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.

إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا تناولت جرعة مفرطة عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.

إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا تناولت جرعة مفرطة عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.

إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا تناولت جرعة مفرطة عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.

إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا تناولت جرعة مفرطة عن العوارض الخطيرة، توجيه مايشرة لغزة الطوارئ في المستشفى وأحضرى عورة الداء معك.



يُعطي اندومنرين كفرص للمهبل الذي يحتوي على هرمون الجنس الأنثوي الطبي (progesterone). يعمل بروجستورن على إبطاء المخاطي المنظم للرحم وإنساد عذق على العمل والبقاء في العمل عندما تلقين علاج لانقشicha.

الصلة العلاجية: هرمونات بروجستوجينية (progesterogenic hormones).

٢. قبل استعمال الدواء إذا:

استعمال اندومنرين مُخصص فقط لا غير النساء خالل علاج الحصوية. يبدأ العلاج في اليوم الذي يُتَّبع فيه علاجات الحصوية. يبدأ العلاج في اليوم الذي يُتَّبع فيه علاجات الحصوية. يُعطى لك طببك متي تبدئين بالعلاج.

٣. لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كُنت تحسناً للبروجستورن أو لمركب آخر من بين مركبات

الدواء [المركبات مُفصَّلة في المركب].

لديك نزف شاذ من المهبل، الذي لم يحصل من قبل طبيك.

مررت بـ زبدهن وسبيله، الذي لم يحصل من قبل طبيك.

أيضاً على طببك وسبيله، الذي لم يحصل من قبل طبيك.

كُنت تعاني من انتفاخ الرحم أو بطيء حمل الرحم.

كُنت تعاني من انتفاخ الرحم أو بطيء حمل الرحم.

معروفة أو يوجد انتفاض سلطان الثدي أو سرطان الأعضاء التناسلية.

كُنت تعاني أو عيُت في المرض من خذلان في الرحم.

كُنت تعاني من انتفاخ الرحم أو بطيء حمل الرحم.

أحرضي دائمًا على الاستعمال وفقاً لتعليمات طببك.

الدكتورة في أمراض متعددة.