

تشرية علمية لتسليط موجي انكثمة الصيدلة

(استحضرات) ١٩٨٦

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

سكولو فير كريم

المادة الفعالة وتتركبما:
سكولو فير ٥ W/W %

المركبات غير الفعالة:
مذكورة في الفقرة ٦

إقر النشرة بتمعن حتى نهايةها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا تفرقت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

يصرف هذا الدواء بدون حاجة لوصفة طبيب.

عليك استعمال الدواء بالشكل الصحيح. استشر الصيدلي إذا احتجت لمعلومات إضافية.

عليك مراجعة الطبيب فيما إذا تفاقت علامات المرض (أمراض) أو عدم تحسنها بعد ١٠ أيام.

١) لأي عرض متخصص سكولو فير

يستعمل سكولو فير لعلاج جروح البثور (حريش الشفتين).

المادة الفعالة هي أسكولو فير، مادة بخضادة للفوروسات يجب الدهن مع ظهور العلامات الأولى لجرح البثور (مثل حذر حكة) ،بالإمكان استعماله أيضا لتسريع الشفاء في حال قد ظهر جرح البثور.

٢) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال سكولو فير:

- إذا كان لديك ذات مرة فعل تحسسي لاسكولو فير. لالاسكولو فير، بروبيلين جليكول أو لأي واحد من المركبات الأخرى المذكورة في الفقرة ٢٤.

- في مائل فمك (مثلا للثقحات في الفم) أو انفك.
- لأي تلوث في الجلد الذي لا يعتبر جرح بثور.
- في العينين أو في منطقة الإغضاء التناسلية.

توخي الحذر الخاص عند استعمال سكولو فير

- اغسل دائما يديك قبل وبعد دهن سكولو فير.
- لا تقلم عيقلك طالما لم تحصل يدك بعد الدهن.
- إذا مائل بالخطأ كريم لعينيك، اشطف عينيك جيدا بالماء الدافئ، استشر طبيبك إذا كنت قلقا.
- تجنب ملامسة جرح البثور من أجل منع انتقال التلوث أو تفاقمه.
- إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك جهاز مناعي ضعيف، فانتسل بطيبك قبل أن تقوم بمعالجة أي نوع لتلوث.
- إذا كان لديك أي تلوث فيما إذا لديك جرح بثور، اتصل بطبيبك.
- إذا فقدت جرحا البثور فقط، اتصل بطبيبك.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرا دوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أحد لطبيبك أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل، تتاولين الحمل أو في فترة الرضاعة، فعليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال سكولو فير.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

قد يسبب بروبيلين جليكول تهيجا في الجلد.

قد يؤثر التحول المستوستيروستيدي أي وجوده فعل موضعية في الجلد (مثلا التهاب الجلد من التماس مع المادة).

٣) كيفية استعمال الدواء؟

ملائح لكافة الأعمار.

- عليك الاستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن ولقأ.
- المقارن الدوائي الاعتيادي**: يجب الدهن مع ظهور العلامات الأولى لجرح البثور (مثل حذر حكة).
- إمراض بثورية على المنطقة المصابة: ٥ مرات في اليوم.
- استمر في العلاج لمدة ٥ أيام، إذا لم يتحسن جرح البثور بعد هذه الفترة، فيمكنك استعمال الكريم حتى ١٠ أيام بالإجمال.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

قد يؤثر التحول المستوستيروستيدي أي وجوده فعل موضعية في الجلد (مثلا التهاب الجلد من التماس مع المادة):

كيفية استعمال الدواء؟

- معالج جرح البثور لديك لمدة ٥ أيام كاملة، من أجل تأمين شفاء سريع.
- إذا نسبت مقدار دوائي، إذن لحظة تذكر بذلك واستمر كما في السابق.
- إذا لم يتلشى جرح البثور لديك تماما بعد ١٠ أيام، أو إذا قاوم باي وقت، فإتصل بطبيبك.
- أبدأ التحلني من سكولو فير خاسفك للأخرين، حتى ولو كانت الأعراض قديمة تشبه أمراضك.
- إن كمية الكريم في هذه العليقة تكفي لتغطي واحد لجرح البثور، من أجل تقشبات مستقبلية. أبدأ بالعلاج مع ظهور العلامات الأولى لتطور جرح البثور (مثل حذر أو حكة) ، بالإمكان البدء بالعلاج أيضا في مرحلة ظهور الحويصلات.

- لا يجوز تجاوز الفقدان الدوائي الموصى به.
- لا تطبق الكريم استعمالا خارجي فقط، إذا لم يتم بالخطأ من الكريم، فمن غير المحتمل أن يسبب ذلك آثارا سلبية، لكن إذا كنت قلقا، استشر طبيبك، إذا لم يبلغ طفلك بالخطأ من الدواء، توجه حالا لطبيبك أو لفرقة الطوارئ في المستشفى والحضر عليه الدواء معك.
- لا تتناول الأدوية في العتمة، يجب لتخصيص طابع الدواء والتأكد من المقارن الدوائي التي تقيضة تتناول فيها دواء، فتح التغيرات الخلية إذا لزم الأمر ذلك.

٤) أعراض جانبية محتملة

كما كان مراد، فإن استعمال سكولو فير قد يسبب أمراضا جانبية لدى بعض المستعملين، لا تندرج من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز الاعاني أيا منها.

توقف عن استعمال الدواء وراجع طبيبك حالا إذا لاحظت بـ:

- ردود فعل تبدو مثل ردود فعل تحسسية، مثلا إنتفاخ الشفتين، الوجه والجلتين.

أعراض جانبية إضافية:

- وجعا أو حرقا للبطانة بعد الدهن، هذه الأعراض تزول بسرعة.
- إحمرار، حكة أو تقشر أو جفاف لطيف للجلد، بطف جلدي، شرى أو كدمات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك الاستشارة الطبيب.
بالإمكان التلبيح عن أعراض جانبية لآثار الأضرار الصحية بواسطة الخطط على الرابط التاليين عن أعراض جانبية على علاج بواله الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (**www.health.gov.il**) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتليح عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصليح الرابط.

https://forms.gov.il/globaldata/getsourcepage.aspx?sourcepage=medicines&versifile=medicines@mo.gov.il

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء بكل دواء في مكان مغلق بعيدا عن مجال رؤية الأطفال (أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم، لتجنب التلوث عند تطبيقات سريعة من الطبيب).
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (**exp.date**) الذي يظهر على ظهر العليقة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- حزن دون ٢٥ درجة مئوية لكن لا تخلفه في البراد.

٦) معلومات إضافية

بالإضافة لتلمذة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً:

Propylene glycol, white soft paraffin, cetostearyl alcohol, liquid paraffin, aricalc 165 (glycerol monostearate, masorog stearate 100), poloxamer 407, dimeticone 20, sodium laurilsulfate, and purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العليقة:

سكولو فير متوفر بمضخة أو بماسورة ذات ٢ غرام.

من الجائز ألا تسوق كافة العوات.

معلومات إضافية عن جروح البثور

جرح البثور هو تلوث يسببه فيروس العظيولة البسيطة (HSV)، الموجود في حائل سيات في الخلايا العصبية التي تعضب الشفتين والجلد من حولهما.

متى تحدث العدوى للمرة الأولى؟

تحدث العدوى الأولى عادة في فترة الطفولة المبكرة، على ما يبدو بعد تلقي قبلة من شخص مصاب بالثورت، ينتقل الفيروس من طريق الجلد، يتحرك باتجاه عصب ويتقي في ملتقى لمن غير محنود.

أعراض وعقبة الثارة للفيروس؟

أول عرضة لها هي فقاعات البثور، الإنفاز، البثور الصغيرة، الإرعاق، هياج عاطفي، ضغف، إصاربة مدنية، ضوء الشمس القوي، وعندما تشعر بانك «منهك»، في لحظة تفعيل الفيروس، فهو يتحرك دائما عن طريق العصب إلى جلد الشفتين ومن حولهما وهناك يؤدي إلى تطور جرح البثور.

تفاكر - جروح البثور معدية

يتمكن الفيروس أن يولد طفلا آخر في النسيم، من أجل تليس طفورة إنتقال التلوث، الاستحج للأخرين ملامسة جرح البثور لديك أو استعمال مشتتلك، وما شابه. عليك الإستماع عن الفترات والعنس القوي إذا كنت أنت أو شريكك/شريكتك تعانين من جروح بثر نشطة. إغسل يديك دائما قبل وبعد ملامسة جرح البثور.

تجنب ملامسة عيقلك، ثورت العينين بفيروس العظيولة البسيطة (HSV)

يمكن أن يؤدي إلى فترات في هذه العليق (القرنية).

إذا وجد لديك جرح بثور، إبتعد عن الفترات خاصة مع الأطفال.

لا تفتح الحويصلات ولا تزيد قشرة الجروح المدمتلة. قامت قد تلوث أصابعك بالفيروس، لا بل أنت قد تلوث جرح البثور لديك بعرائثهم الأخرى.

لا تتناولوا الأخرين بواله الطعام والشراب خاصتكم.

صاحب الاعطال: جبر إس، كفي، كونسوم، هيلث كير إسرائيل م.ض.

ح.ب. ٢٠٢٥ - بيتح - تكفا.

العنتج: جلاكسو أوبيريشس إنكلترا م.ض. برنارد كاسل، إنكلترا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحسب ورخص في تاريخ: آب ٢٠١٤.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ١٥٢٠٤-٢٤١٠٢

من أجل سهولة التعرف القراء، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكرك، على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.