

**ציקלוביר** (לצדכן לרוב לעיתים **ציקלוביר** - **תשע"ו - 1986** **התשלום**) **התרופה משוקת ללא מרשם רפואי**

קרם

**חומר פעיל ריחוני: אציקלוביר w/w 6%**
**רכיבים בלתי פעילים: ממוזגים בטעיף 6**
**קרום בניגון את העיניים עד סופו כוברים השתמש בתרופה**
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
התרופה זו נחשבת לרוב צורך במרשם רפואי.
עלֵךְ להשתמש בתרופה בזהירות בורה בנכות, הומיוז, ברוקח אם אתה מקוה לטעוד נסוף, עלֵךְ לטווח אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מתחמרים או אינם משתפרים לאחר 10 ימים.

- למה מיועד ציקלוביר**

**ציקלוביר משמש לטיפול בפצעי קור (הרפס השפתיים).**
החומר הפעיל הוא אציקלוביר.
חומר אנטי-ויראלי.
**יש לטווח עם הופעת הסימנים הראשונים של פצע קור**
**קור** (כגון עשיוני וגיוד), ניתן להשתמש בו גם כדי לזרו את הרפסי במידה וכבר הופיע פצע קור.

- לפני שימוש בתרופה**

**אי להשתמש בציקלוביר:**

- אם הייתה לך אי פעם תגובה אלרית** לאציקלוביר, ואלאציקלוביר, סרפילין גלוקול או לכל אחד מהרכיבים האחרים (המצוינים בטעיף 6).
- בתוך הפה** (למשל **לכיבים בפה**) או **האף שלך**.
- לכל ידיום עור שאינו פצע קור**.
- בעיניים או באזור אברי המין**.

**נקוט בזהירות מיוחדת עם ציקלוביר**

- רחץ תמיד את ידיו** לפני ואחרי מריחת ציקלוביר.
- אל תיגע בעיניך** כל עוד לא רחצת את ידיו לאחר המריחה.
- אם בטעות נכנס קרם לתוך עיניך**, שטוף אותן היטב במים חמימים. הימנעו עם הרפא שלך אם אתה מודאג.
- הימנע ממוזג בפצע קור** על מנת לטווע העברה של החיידים או התורפת.
- אם נאמר לך על ידי הרופא שלך שיש לך **מערכת חסונית מוחלשת**, צור קשר עם הרופא שלך לפני שאתה מטפל בכל סוג של ידיום.
- אם יש לך סכסך כלשהו האם יש לך פצע קור**, צור קשר עם הרופא שלך.
- אם פצע הקור שלך מחמיר מאוד**, צור קשר עם הרופא שלך.

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כגול תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

**היריון והנקה**

**יש להימנע ברופא או ברוקח לפני השימוש** בציקלוביר אם אתה בהריון, **מנסה להיכנס להריון או מיניקה.**

**מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה:**

**פורפילין מילוקול עלול לגרום לירידה בעור.**
**צנטוסטאריל אלוכול עלול לגרום לתגובות עור מקומיות (למשל דלקת עור ממוזג עם החומר).**

- כיצד להשתמש בתרופה?**

- מתאים לכל הגילאים.
- עלֵךְ לזכות עם הרופא או הרוקח אם איך כותב.
- המינון המקובל:** יש לטווח עם הופעת הסימנים הראשונים של פצע קור (כגון עקצוץ וגיוד).
- מידת הנדיבות על האזור ממוזג 5 פעמים ביום.
- המשך בטיפול במשך 5 ימים. אם פצע הקור שלך לא נרפא לאחר זמן זה, אתה יכול להשתמש בקרם עד ל- 10 ימים נוסך הכל.
- סבל בפצע הקור שלך במשך 5 ימים מלאים, על מנת להבטיח רפיו סופי.

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כגול תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

- אם שגחת מה, מרח ברעג שנוכרת והמשך כמו קודם.
- אם פצע הקור שלך לא רפא לחלוטו אחרי 10 ימים, או אם הוא מחמיר בגלל עת, צור קשר עם הרופא שלך.
- אף פעם אל תיגע את הציקלוביר שלך לאחרים. גם אם התסמינים שלהם זהים שלך.
- למה לוקח באריחה?
  - המסטיקה להמפרצות אתול של פצע קור, עגור התפרצות, עמידות, התחל בגימול עם הופעת הסימנים הראשונים של התפתחות פצע קור (כגון עקצוץ או גיוד), ניתן להתחיל בטיפול גם בשלב של הופעת השלפוחית.
- אל לטווע על התנה המולדת.**
- אל תבלע** את הקרם. לשימוש חיצוני בלבד. אם בטעות בלעת מהקרם, לא סכרי שזה ירחם להשפעות שליליות, אבל יתייעו עם הרפא שלך אם אתה מודאג. אם בטעות בלע לך מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים וכאן אריות הרופא אינך.
- אין לטויל תרופות בחושן?
בדוק התויות והמנה **בכל פעם** שהקך טמל תרופה. הרכב משקפיים אם אתך וקוק להם.

- תופעות לוואי אפשריות**

כמו בכל תרופה, השימוש ב**ציקלוביר** עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק מהמשתמשים, אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

- הפסק את השימוש בתרופה ופנה לרופא מיד** אם אתה מניח ב-
- תגובות שרואות כמו תגובות אלריות, לדוגמא התנפחות של השפתיים, הפנים והעפעפים.

**תופעות לוואי נוספות:**

- דקרוה או גריבה קלה, לאחר המריחה, תופעות אלו יעלמו במהירות.
- אדמומיות, גיוד או קליף או יבוש קל של העור, פריחות עוריות, סרפדת או חבורות.
- אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עלֵךְ להתייעו עם הרופא.
- ניתן לזווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" בקוב טיפל תרופתי/עמנאג.
דף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המכונה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, אי עדי כניסה לקישור: https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdverseEventMedicines.
- אי להאסן את התרופה:**
  - מטע הירעלה, תרופה זו בכל תרופה אחרת יש לישוור במקום סגור מחוץ לשה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תסכנו הירעלה אל תגורם להקאה, ללא הוראה מפורשת מרופא.
  - אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התסונה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התסונה מתייחס לזמן האחרון של אותו חודש.
- האסן מוחלת ל- 25°C אך אל תשמור במקריר.

- מידע נוסף**

**נסיון על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:**
Propylene glycol, white soft paraffin, cetostearyl alcohol, liquid paraffin, arlacel 165 glycerol monostearate, macrogrol stearate 100), poloxamer 407, dimeticone 20, sodium laurilsulfate, and purified water.
כצעד נרואת התרופה ומן תוכן האריזה:

**ציקלוביר** קיים במשאבה או בטופספת של 2 גרם. יתכן ולא כל האריות ישוקו.

**מידע נוסף על פיצוץ קור**

פצע קור הוא ידיום שגורם על ידי הנגיף הרפס סימפלקס (HSV), שנמצא באופן רדום בחצי עשב המעטבבים את השפתיים והעור מסביבו.

**מתי מתרחשת ההדבקה לראשונה?**

ההדבקה הראשונה מתרחשת בדרך כלל בתקופת הילדות המוקדמת, כבדרך לראו בקבלת שיעור מרפס שיעוקי בימים הנגיף עובר דרך העור, עו לעבר עשב ועשאר בצומת עציבת לזמן בלתי מוגבל.

**מה יכול לעורר את הנגיף?**

זכרים נשנים, כללי התקרויות, שפעת, מחזור, יפיות, סערה ושיגית, לחץ, פגיעה פיזית או עטוש ניתן וכאשר אתה מרגיש "שחוקי" ברעג והנגיף משפעל, הוא נע בחזרה דרך העשב אל העור של השפתיים ומסביבו, שם הוא גורם להתפתחות של פצע קור.

**וכו – פצעי קור פצע קור**

הנגיף ממולד לרוקח או יום אחרים כנגף כדי לצמצם את הסיכון של הפצת הידיום, אל תאפשר לאחרים לגעת בפצע הקור שלך או להשתמש מנגיבת סמפלקס (HSV) בעין יכול להוביל לכיבים בחזית העין (קרנית).

- הימנע מנשיקות - במיוחד עם ילדים - כאשר יש לך פצע קור.
- אל תמוציץ את השלפוחיות או חסיר את הגליום, לא זו בלבד שתאנה עלול לזרום את פצע הקור שלך בהידוקים אחרים, אתה עלול להדביק את האנצבעת שלך בגיודיך.
- אל תלחץ את כפי האוכל והשיניים שלך.

**בעל הרישום:** גיי.אס.קי. קונסיסור הליתיקי

ישראל בעימ, ת.ד. 3256, פתח תקווה.

**היצרן:** גלוקס אופרשינסו אנגליה בעימ, ברנדד קאסל, אנגליה.

עלון זה נבדק ואושר עי משרד הבריאות בתאריך: אוגוסט 2014.

מספר רישום התרופה בפקנס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 152-54-34102.
למש הפגשות והחולה הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר.
על אף זאת, התרופה מיועדת לנבי שני המינים.