

## Цикловир Крем

Активное вещество и его концентрации: Ацикловир 5% w/w  
Вспомогательные вещества: приведены в разделе 6.

**Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата.** Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Данный препарат отпускается без рецепта врача. Правильное применение препарата: Если Вы нуждаетесь в дополнительной информации, посетите фармацевта. Вам следует обратиться к врачу, если признаки заболевания (симптомы) становятся более выраженными или не улучшаются после 10 дней.

### 1. Для чего предназначен Цикловир

Цикловир применяется для лечения простуды губ (губного герпеса). Активным веществом препарата является противовирусное соединение ацикловир. Следует наносить при появлении первых признаков герпеса (таки, как ощущение покалывания и зуд). Возможно применение препарата также для ускорения выздоровления в тех случаях, когда уже появились герпетические высыпания.

### 2. Перед началом применения препарата

**Не применяйте Цикловир:**

- Если у Вас когда-либо наблюдалась аллергическая реакция на ацикловир, валацикловир, пропантенол или на какой-либо из других ингредиентов (перечислены в разделе 6).
- Внутримочевой полости (например, при жевании во рту) или в Вашем носу.
- При любой тяжелой инфекции, не являющейся герпесом.
- Для глаз или в области половых органов.

При применении препарата Цикловир следует соблюдать особую осторожность

- Мойте Ваши руки всякий раз до и после нанесения препарата Цикловир.
- Не касайтесь Ваших глаз до тех пор, пока Вы не вымыли руки после нанесения препарата.
- Если случайно крем попал Вам в глаза, промойте их plentifully теплой водой. Если Вы обеспокоены, посетите врача с Вашим врачом.
- Избегайте прикосновения к герпетическим высыпаниям, чтобы не допустить распространения инфекции или ее обострения.
- Если Ваш врач сообщил Вам, что Ваша иммунная система ослаблена, перед началом лечения любого вида инфекции, свяжитесь с Вашим врачом.
- Если у Вас имеется какое-либо сомнение о наличии у Вас герпеса, свяжитесь с Вашим врачом.
- Если Ваши герпетические высыпания очень усилились, свяжитесь с Вашим врачом.

Если Вы принимаете или недавно принимали другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

**Беременность и кормление грудью**  
Следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед применением препарата Цикловир, если Вы беременны, пытаетесь забеременеть или кормите грудью.

**Важная информация о некоторых ингредиентах препарата:**  
Противогрибковый спирт способен вызвать раздражение кожи. Цетостерилловый спирт способен вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

### 3. Каким образом применяют препарат?

Подходит для всех возрастов

- Консультируйтесь с врачом или фармацевтом, если Вы не уверены.
- **Общепринятая дозировка:** следует наносить препарат при появлении первых признаков герпеса (таки, как ощущение покалывания и зуд).

- Обычно смазывайте пораженный участок 5 раз в день.
- Продолжайте лечение в течение 5 дней. Если Ваши герпетические высыпания заживают по истечении этого времени, Вы можете применять крем в общей сложности до 10 дней.
- Проводите лечение Вашего герпеса в течение полных 5 дней, чтобы обеспечить быстрый выздоровление.
- Если Вы забыли применить препарат, сделайте сразу, как только Вы об этом вспомнили, и продолжайте лечение, как и прежде.
- Если у Вас не произошло полного излечения герпетических высыпаний по истечении 10 дней или в какой-то момент состояние ухудшилось, свяжитесь с Вашим врачом.
- Никогда не передавайте Ваш Цикловир другим, даже если симптомы заболевания у них схожи с Вашими.
- Количество крема в данной упаковке достаточно для лечения одной вспышки герпеса. При возникновении рецидивов в будущем начинайте лечение с появления первых признаков развития герпеса (таки, как ощущение покалывания или зуд). Возможно начать лечение также на стадии появления пузырька.
- **Не превышайте рекомендуемую дозу.**
- **Не глотайте крем.** Только для наружного применения. Если Вы случайно проглотили какое-либо количество крема, вряд ли это вызовет негативные последствия, однако, если это Вас беспокоит, проконсультируйтесь с Вашим врачом. Если ребенок случайно проглотил препарат, немедленно обратиться к врачу или в ближайшую отделение больницы и возмите с собой упаковку препарата.
- Не принимайте препараты в «темноте! Каждый раз при применении препарата проверяйте этикетку и дозировку. В случае необходимости пользуйтесь очками.

### 4. Возможные побочные явления

Как и при лечении любой лекарством, применение препарата Цикловир способно вызвать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.

**Прекратите применение препарата и немедленно обратитесь к Вашему врачу, если Вы замечаете:**

- Явления, которые выглядят как аллергические реакции, например, опухание губ, лица и век.

**Дополнительные побочные явления:**

- Легкое жжение или покалывание, возникающие после нанесения крема. Эти явления быстро проходят.
- Покраснение, зуд или легкая сухость или шелушение кожи, включая губы, крапивница или крапивница.
- Если появилось побочное явление, если одно из побочных явлений становится более выраженным, или если Вы страдаете от побочного явления, не указанного в данной инструкции, Вам следует посоветоваться с врачом.

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку «Учет о побочных явлениях лекарственных средств»: [www.hsa.gov.uk](http://www.hsa.gov.uk) или посетив сайт Министерства здравоохранения ([www.hsa.gov.uk](http://www.hsa.gov.uk)) и нажав на ссылку на форму онлайн, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или перейдя по ссылке <https://forms.gov.uk/handbook/government/government-appeal-form> или <http://www.hsa.gov.uk/about-us/feedback>

### 5. Как следует хранить препарат?

- Избегайте отдаленности! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей или младенцев месте, и вне поля их зрения, во избежание отравления. Не высказывайте претензий без получения точных указаний врача.
- Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
- Храните препарат при температуре ниже +25°C, но не в холодильнике.

### 6. Дополнительная информация

В дополнение к активному веществу, препарат также содержит:

Propylene glycol, white soft paraffin, cetostearyl alcohol, liquid paraffin, атропин 165 (флуорид прохлоридат, масляной эмульсии 100), poloxamer 407, simethicone 20, sodium lauryl sulfate, and purified water.  
Как выглядит лекарство и каково его содержание упаковки.

Цикловир выпускается в виде помпы-дозатора или тюбика, с 2 г препарата. Возможно, что не все виды упаковок будут в продаже.

### Дополнительная информация о герпесе

Герпес – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом простого герпеса (HSV), который находится в «дремлющем» состоянии и располагается в нейронах, иннервирующих губы и кожу вокруг них.

**Когда происходит первичное заражение?**  
Первичное заражение происходит обычно в раннем детстве, по-разному, при контакте человека, инфицированного этим вирусом. Вирус проникает через кожу, продвигается в направлении нерва и сохраняется в нервном ганглии в течение неопределенного времени.

**Что может способствовать активации вируса?**

Различные факторы, включая простуду, грипп, менструации, усталость, эмоциональное потрясение, стресс, физическую травму, воздействие сильного солнечного света и в случаях, когда Вы чувствуете себя «нездоровым». В момент, когда вирус активизируется, он движется в обратном направлении – по нерву к коже губ и вокруг них, и там уже вызывает развитие герпеса.

**Помните - герпес заразен**  
Вирус способен инфицировать другие участки тела. Чтобы снизить риск распространения инфекции, не касайтесь других частей тела к Вашим герпетическим высыпаниям или пользуйтесь Вашими полотенцами и т.д. Вам следует избегать поцелуев и орального секса, если у Вас или Вашего партнера/Вашей партнерши имеются активная форма герпеса. Всегда мойте Ваши руки до и после контакта с участками, пораженными герпесом.

- Избегайте контакта с Вашими глазами. Инфицирование глаз вирусом простого герпеса (HSV) может привести к воспалению как переднего отдела глаза (роговица).
  - Избегайте поцелуев – в особенности, с детьми, когда у Вас имеются проявления герпеса.
  - Не используйте пинцет и не удаляйте корочки. Так Вы можете не только инфицировать Ваш герпетический высыпание другим микробами, но и инфицировать вирусом Ваши пальцы.
  - Не давайте другим пользоваться Вашим посудой для еды и питья.
- Владельцы лицензий:** CSK КОНСЪЛТЕР КЕЛСЕР ИЗРАИЛЬ ПТД, п/а 3256, Петат-Тиква.

**Производитель:** Гленко Оперейтс Англия Птд., Бэрнард Казель, Англия.  
Данная инструкция проверена и утверждена Министерством здравоохранения в: Августе 2014.  
Регистрационный номер препарата в Государственном реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 152-54-34102.