

תוכן עלון זה עודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך: מאי 2018

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

רייאטאז 150 מ"ג כמוסות

רייאטאז 200 מ"ג כמוסות

רייאטאז 300 מ"ג כמוסות

החומר הפעיל וכמותו:

כל כמוסה של רייאטאז 150 מ"ג מכילה:
אטזנביר (כסולפט) 150 מ"ג Atazanavir (as sulfate) 150 mg

כל כמוסה של רייאטאז 200 מ"ג מכילה:
אטזנביר (כסולפט) 200 מ"ג Atazanavir (as sulfate) 200 mg

כל כמוסה של רייאטאז 300 מ"ג מכילה:
אטזנביר (כסולפט) 300 מ"ג Atazanavir (as sulfate) 300 mg

הכמוסה מכילה לקטוז.

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

רייאטאז מיועדת למבוגרים וילידים מעל גיל 6 שנים. תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות מתחת לגיל שלושה חודשים. רייאטאז אינה תרופת משתם כנגד נגיף ה- HIV-1 (Human Immunodeficiency Virus type 1 - נגיף הכשל החיסוני האנושי מסוג 1) הניתנת בשילוב עם תרופות אנטי-רטרוויראליות אחרות המיועדות לטיפול בזיהומי HIV-1.

HIV-1 הינו הנגיף אשר גורם למחלת האיידס (תסמונת הכשל החיסוני הנרכש).

שימוש עם תרופות אנטי-רטרוויראליות אחרות לטיפול בזיהום ה-HIV-1, רייאטאז עשויה לעזור בהורדת כמות נגיף ה-HIV-1 בדם (נקראת גם עומס נגיפי) ובהעלאת מספר תאי הדם מסוג CD4+ (T) אשר עוזרים להילחם בזיהומים אחרים.

הורדת כמות נגיף ה-HIV-1 בדם והעלאת מספר תאי הדם מסוג CD4+ (T) עשויים לעזור לשפר את המערכת החיסונית שלך, ויכולים להוריד את הסיכון שלך לתמותה או לזיהומים העלולים להופיע כשהמערכת החיסונית שלך חלשה (זיהומים אופורטוניסטיים).

רייאטאז אינה מרפאת זיהום HIV-1 ואינה מרפאת איידס. יש להקפיד ליטול את תרופות ה- HIV-1 על מנת לשלוט בזיהום HIV-1 ולהפחית מחלות אחרות הקשורות ל- HIV.

1.למה מיועדת התרופה?

רייאטאז מיועדת לטיפול בנגיף ה- HIV-1 (Human Immunodeficiency Virus type 1 - נגיף הכשל החיסוני האנושי מסוג 1) הניתנת בשילוב עם תרופות אנטי-רטרוויראליות אחרות המיועדות לטיפול ב-HIV-1 (Antiretroviral agents) במבוגרים ובילדים מעל גיל 6 שנים.

רייאטאז איננה מיועדת לתינוקות מגיל שלושה חודשים.

2.קבוצה תרפויטית: מעכבי פרוטאזות.

2.לפני שימוש בתרופה:

- אין להשתמש בתרופה אם:**
 - אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אטזנביר כסולפט) או לכל אחד ממרכיבי התרופה האחרים (ראה סעיף 6).
 - אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות. נטילת רייאטאז עם התרופות הבאות עלולה להשפיע על פעילותה. רייאטאז עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, מסכנות חיים או למוות בשימוש עם התרופות הבאות: אלפוזוסין; ציסאפריד; אלבסביר/גרזופרביר; דיהידרוארגוטאמין מסילאט, מתילארגונבין, ארגונבין, ארגוטאמין סטרטסביר; אינדינאביר; אירינוטקאן; לורסידון (במידה ורייאטאז ניתנת בשילוב עם ריטונאביר); לובאסטאטין; מידאזולם (במתן דרך הפה לצורך הרגעה); נביראפין; פימוזיד; ריפאמפין; סילדנאפיל לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי; סימבסטטין; ילדך נוטל אחת מהתרופות הרשומות למעלה עם רייאטאז. טריאזולם.
 - הנך מניקה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

אין להשתמש בתכשיר למטרה שונה מזו שלשמה נרשם. אתה הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. התכשיר מכיל לקטוז. אם אובחנה אצלך אי סבילות לסוכרים מסוימים - היוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.

לפני הטיפול ברייאטאז ספר לרופא אם:

- אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.
- אתה סובל מבעיות בלב.
- אתה סובל מליקוי בתפקוד הכבד כולל זיהום בנגיף ההפטיטיס B או C.
- אתה עובר טיפול דיאליזה.
- אתה סובל מסוכרת.
- אתה סובל מהמופיליה.
- אתה סובל מבעיות רפואיות אחרות.
- הנך משתמשת באמצעי מניעה הורמונאליים כגון זריקות, התקן תוך רחמי או טבעת וגינלית, מדבקה עורית למניעת היריון וגלוליות למניעת היריון אשר עלולים לא לפעול במהלך הטיפול עם רייאטאז. יש להיוועץ ברופא במשך באשר לאמצעי מניעה שניתן להשתמש בהם במהלך הטיפול עם רייאטאז.
- הנך בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, ראי סעיף "היריון והנקה".
- לאחר שתינוקך ייוולד, יש לספר לרופא אם גוון עורו או החלק הלבן של עיניו הופך לצהוב.

בדיקות ומעקב:

הרופא שלך יבצע לך בדיקות דם על מנת לבדוק את תפקודי הכבד כולם. נטילת רייאטאז ובמהלך הטיפול. הרופא שלך יבצע לך בדיקות דם ושתן על מנת לבדוק את תפקודי הכליות, טרם נטילת רייאטאז ובמהלך הטיפול.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

שמור את רשימת התרופות אותן הנך נוטל על מנת להציגה לרופא המטפל ולרוקח. היוועץ ברופא או ברוקח בנוגע לרשימת התרופות אשר מגיבות עם רייאטאז. אין ליטול תרופה חדשה ללא התייעצות מוקדמת עם הרופא המטפל שלך. הרופא המטפל יכול ליישך לך אם נטילת תרופות אחרות יחד עם נטילת רייאטאז אינה בטוחה.

אין להשתמש בתרופה אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות. נטילת רייאטאז עם התרופות הבאות עלולה להשפיע על פעילותה. רייאטאז עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, מסכנות חיים או למוות בשימוש עם התרופות הבאות:

אלפוזוסין; ציסאפריד; אלבסביר/גרזופרביר; תרופות ממשפחת הארגט, הכוללות: ארגוטאמין, ארגוטאמין פיברטסטיביר; אינדינאביר; אירינוטקאן; לורסידון (במידה ורייאטאז ניתנת בשילוב גלצפרביר/פיברנטסטיביר; אינדינאביר; אירינוטקאן; לורסידון (במידה ורייאטאז ניתנת בשילוב עם ריטונאביר); לובאסטאטין; מידאזולם (במתן דרך הפה לצורך הרגעה); נביראפין; פימוזיד; ריפאמפין; סילדנאפיל לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי; סימבסטטין; צמח ההיפריקום פרפראטום (St. John's wort); טריאזולם.

בעיות חמורות עלולות להופיע אם אתה או ילדך נוטל אחת מהתרופות הרשומות למעלה עם רייאטאז.

ייתכן והשימוש בתרופות הבאות יחד עם רייאטאז (עם או בלי ריטונאביר) ידרוש שינוי במינון או במשטר המינון של רייאטאז או של התרופות המופיעות מטה. יש להיוועץ ברופא המטפל אם אתה נוטל אחת או יותר מהתרופות הבאות:

- תרופות לטיפול ב– HIV כגון: דיידאנוזין, טנופוביר דיזופרוקסיל פומארט, אפאבירנז, סקווינביר, ריטונאביר
- בוצפרביר, סופוסובוצר, ולפאטאסביר, ווקסילאפרביר לטיפול בדלקת כבד מסוג C
- תרופות סותרות חומצה, תרופות מנוגדות להפרשת חומרי כגון: קרבמזפין, פניטואין, פנוברביטל, למוטריג'ין
- תרופות לטיפול בהפרעות קצב לב: אמiodרון, בפרידיל, לידוקאין (במתן סיסטמי), קווינידין וורפרין - נוגד קרישה
- תרופות נגדות בדיכאון כגון: משפחת הטרציקליים, טראזודון
- תרופות נגדות פרסוכים לטיפול באפילפסיה כגון: קרבמזפין, פניטואין, פנוברביטל, למוטריג'ין
- אנטי-פטרייתים כגון: קטוקונאזול, איטראקונאזול, ווריקונאזול
- קולכיצין - למניעה או טיפול בשיגדון (Gout)
- ריפאבטין - לטיפול ב"אנטיביוטיקה לשחפת
- קוויטאפין ולורסידון - אנטיפסיכטי
- במדודיאפנינים: מידאזולם (במתן פרנטרלי)
- חוסמי תעלות סידן כגון: דילטיאזם, פלודיפין, ניפדיפין, ניקרדיפין, ורפמיל
- בוסנטן - לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי
- תרופות להורדת כולסטרול - אטורבסטטין, רווסובסטטין
- תרופות הורמונאליות למניעת היריון (גלולות) - אטינלי אסטרידיול, נורגסטיטט או נוראיתנדרון
- תרופות מדכאות מערכת חיסון - ציקלוספורין, סירוליומוס, טקרולימוס סאלמטרול (במשאף)
- פלוטיקאזון - סטרואיד תברסיס לאף או במשאף
- אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידים מסוג קלריתרומיצין
- משככי כאבים אופיואידיים: בופרנורפין
- תרופות לטיפול ביתר לחץ דם עורקי: ריאתי או לטיפול באין אונות - סילדנאפיל, טדאפיל, ורדנאפיל

שימוש בתרופה ומזון:

יש ליטול את התרופה בשלמותה עם מזון. אין לפתוח את הכמוסות.

היריון והנקה:

- לפני הטיפול ברייאטאז ספרי לרופא אם את בהיריון או מתכננת להרות. היוועצי ברופא המטפל על נטילת רייאטאז במהלך ההיריון או אם הנך מתכננת להיכנס להיריון.
- אמצעי מניעה הורמונאליים כגון זריקות, התקן תוך רחמי או טבעת וגינלית, מדבקה עורית למניעת היריון וגלולות למניעת היריון עלולים לא לפעול במהלך הטיפול עם רייאטאז. יש להיוועץ ברופא באשר לאמצעי מניעה שניתן להשתמש בהם במהלך הטיפול ברייאטאז.
- לאחר שתינוקך ייוולד, יש לספר לרופא אם גוון עורו או החלק הלבן של עיניו הופך לצהוב.
- אין להניח אם הנך נוטלת רייאטאז בשל החיסון (ראה סעיף 6) לזיהום HIV-1 (אטינלי אסטרידיול, נורגסטיטט או נוראיתנדרון). רייאטאז עשויה לעבור לתינוק דרך חלב האם. היוועצי ברופא לגבי הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך.

הניהג ושימוש במכונית:

אם הנך חש בסחרחורות, יש לפנות לרופא שלך מיד.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים בתרופה:

רייאטאז מכילה לקטוז. אם אובחנה אצלך אי סבילות לסוכרים מסוימים היוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר הטיפול בהוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

רייאטאז חייבת להילקח בשילוב עם תרופות אנטי-רטרוויראליות אחרות.

יש ליטול את התרופה במועד קבוע כל יום כפי שהורה לך הרופא. יש ליטול את התרופה בהתאם למינון ופרק הזמן שנקבע על ידי הרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש ליטול את התרופה בשלמותה עם מזון. אין לפתוח את הכמוסות.

אין להפסיק טיפול או לשנות מינון ללא הנחייה מהרופא המטפל. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

חשוב להיות במסגרת טיפולית של הרופא המטפל במשך תקופת הטיפול ברייאטאז.

תמיד שמור לך כמות מספיקה של רייאטאז על מנת שהתרופה לא תאזל. הפסקה של נטילת התרופה, איטילוז לזמן קצר, עלולה להקשה לעליית רמת נגיף ה-HIV-1 בדם. הנגיף עלול לרכוש עמידות לרייאטאז ועלול להפוך לרופק בלתי יעיל. הפסקה עלולה לזמן קצר לטיפול.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, יש ליטול מנה מיד כשזכרת לויטול את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנה כפולה במקום המנה ששכחח.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק הנוחית **בדוק פעם** שהנך נוטל הרופא. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש ברייאטאז עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

רייאטאז עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות. יש לפנות לרופא במקרים הבאים:

- שינויים בקצב הלב. פנה לרופא מיד במידה ואתה מרגיש סחרחורת. זה עלול להעיד על בעיה בלב.
- פריחה עורית. פריחה בעור שכיחה בחולים הנוטלים רייאטאז, אך יכולה לעיתים להיות חמורה. פריחה עורית בדרך כלל חולפת תוך שבועיים ללא שינוי בטיפול. פריחה יכולה להתלוות לתסמינים רציניים אחרים ועלולה להיות חמורה.
- אם אתה מפתח פריחה חמורה או פריחה עם אחד מהתסמינים הבאים, הפסק את הטיפול ברייאטאז ופנה לרופא מיד!
 - הרגשת חולי או תסמינים דמויי שפעת
 - חום
 - כאבי שרירים או מפרקים
 - עניניים אדומות או מודלקות (conjunctivitis)
 - שלפוחיות
 - פצעים בפה
 - התנפחות של הפנים
 - גוש נכאוב, חם או אדום מתחת לעור
- גוון צהוב בעור או בחלק הלבן של העיניים הינה תופעה שכיחה בחולים הנוטלים רייאטאז ולרוב אינה מזיקה, אך לעיתים יכולה להוות תסמין של בעיה חמורה. תופעה זו יכולה להיגרם כתוצאה מעלייה ברמת הבילירובין בדם (בילירובין נוצר בכבד). למרות תופעה זו איננה מזיקה לכבד, לעור, או לעיניים. יש לפנות לרופא באופן מיידי במידה ואתה מבחין בגוון צהוב בעור או בחלק הלבן של העיניים.
- בעיות בכבד. אם הנך סובל מבעיות בכבד כולל דלקת כבד מסוג B או C, הן עלולות להחמיר במשך הטיפול ברייאטאז. הרופא שלך יבצע לך בדיקות דם על מנת לבדוק את תפקודי הכבד. טרם נטילת רייאטאז ובמהלך הטיפול. ספר לרופא מיד אם הנך חש בתסמינים הבאים: שתן כהה (בצבע תה), גוון עורך או החלק הלבן של עיניך הופך לצהוב, צואה בהירה, בחילה, גרד, כאבים באזור הקיבה.

- מחלות כליות כרוניות. רייאטאז עלולה להשפיע על תפקוד הכליות. הרופא שלך יבצע לך בדיקות דם ושתן על מנת לבדוק את תפקודי הכליות, טרם נטילת ריייאטאז ובמהלך הטיפול.
- סוכרת או רמות סוכר גבוהות (היפרגליקמיה) דווחו או החמירו בחלק מהמטופלים הנוטלים תרופות ממשפחת מעכבי הפרוטאז כגון רייאטאז. חלק מהמטופלים נדרשו להתחיל ליטול תרופות לטיפול בסוכרת או לערוך שינוי בטיפול התרופתי בסוכרת.
- אבנים בכליות דווחו בחלק מהמטופלים ברייאטאז. דווח לרופא באופן מיידי אם אתה חווה תסמינים של אבנים בכליות העלולים לכלול: כאב בגב התחתון או באזור הבטן התחתונה, הופעת דם בשתן, או כאב בזמן מתן שתן.
- בעיות בכיס המרה דווחו בחלק מהמטופלים ברייאטאז. דווח לרופא באופן מיידי אם אתה חווה תסמינים של בעיות בכיס המרה העלולים לכלול: כאב בחלק הימני או האמצעי עליון של הבטן, חום, בחילות והקאות, הצהבת העור או החלק הלבן של העין.
- חולי המופיליה. חולים בהמופיליה דיווחו על עליה בדימומים במשך הטיפול בתרופות ממשפחת מעכבי פרוטאזות כגון רייאטאז.
- שינויים בושמון בגוף יכולים להתרחש במטופלים הנוטלים תרופות לטיפול ב- HIV-1. שינויים אלה יכולים לכלול עליה בכמות השומן בחלק העליון של הגב והצוואר, בחזה, ובהיקף הגוף. ייתכן ותחווה איבוד שומן מהרגליים, הזרועות, והפנים. הגורם המדויק וההשפעה הבריאותית ארוכת הטווח של מצבים אלה אינם ידועים.
- Drone syndrome (התמוטטות מערכת החיסון) – עלול להתפתח בחולים שמתחילים טיפול בתרופות ל- HIV-1. מערכת החיסון שלך עשויה להתחזק ולהתחיל להילחם בזיהומים רדומים קודמים בגוף. ספר לרופא אם הנך חש בתסמינים חדשים לאחר תחילת נטילת רייאטאז.

תופעות הלוואי הכי שכיחות בזמן הטיפול ברייאטאז כוללות:

בחילה, כאב ראש, כאב באזור הבטן, הקאות, קייטאז שינה, תחושת הרדמות - ירידה בתחושתיות, עקצוץ, או תחושת שריפה בידיים או בכפות הרגליים, סחרחורת, כאבי שרירים, שלשול, דיכאון, חום.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מטרידה אותך, או איננה חולפת, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

זוהי **איננה** רשימה מלאה של תופעות הלוואי של רייאטאז. למידע נוסף, יש לפנות לרופא המטפל או לרוקח.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופות" שממצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק ניתן להשתמש בתרופה תוך 6 חודשים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.
- אין להשתמש אם האטם הפנימי של הבקבוק פגום או חסר.
- יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על **25°C**. יש לסגור היטב את הבקבוק.
- אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש.

6.מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

חומרים בלתי פעילים:

Lactose monohydrate, crospovidone and magnesium stearate.
The hard gelatin capsule shells contain: gelatin, FD&C Blue No. 2, titanium dioxide.
The 300 mg capsule shells also contain: red iron oxide, black iron oxide, and yellow iron oxide.
The capsules are imprinted with link.

הכמוסה מכילה לקטוז.

רייאטאז 150 מ"ג - כל כמוסה מכילה 82.2 מ"ג לקטוז מונוהידרט.

רייאטאז 200 מ"ג - כל כמוסה מכילה 109.6 מ"ג לקטוז מונוהידרט.

רייאטאז 300 מ"ג - כל כמוסה מכילה 164.4 מ"ג לקטוז מונוהידרט.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

רייאטאז 150 מ"ג:

כמוסת גלטיין בגודל #1, שני חלקים, ראש הכמוסה בצבע כחול אטום וגוף הכמוסה בצבע תכלת אטום. הכמוסה כוללת כיתוב לבן "BMS 150mg" וכיתוב כחול "3624". הכמוסה מכילה גרנולות בצבע לבן עד צהוב בהיר.

אריזת הבקבוק מכילה 60 כמוסות.

רייאטאז 200 מ"ג:

כמוסת גלטיין בגודל #0, שני חלקים, גוף וראש הכמוסה בצבע כחול אטום. הכמוסה כוללת כיתוב לבן "BMS 200mg" ו-"3631". הכמוסה מכילה גרנולות בצבע לבן עד צהוב בהיר.

אריזת הבקבוק מכילה 60 כמוסות.

רייאטאז 300 מ"ג:

כמוסת גלטיין בגודל #0, שני חלקים, גוף וראש הכמוסה בצבע אדום אטום וגוף הכמוסה בצבע כחול אטום. הכמוסה כוללת כיתוב לבן "BMS 300mg" ו-"3622". הכמוסה מכילה גרנולות בצבע לבן עד צהוב בהיר.

אריזת הבקבוק מכילה 30 כמוסות.

בעל הרישום וכתובתו:
בריטטול-מאייירס סקוויב ישראל בע"מ, רח' אהרון ברוט 18, קריית אריה, פתח תקווה 4951448, ישראל.

היצרן וכתובתו:
חברת בריטטול-מאייירס סקוויב, ניו בראונסוויק, ניו-ג'רזי, ארה"ב.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

רייאטאז 150 מ"ג: 140-78-30959-00

רייאטאז 200 מ"ג: 141-10-30960-06

רייאטאז 300 מ"ג: 146-78-33389-00

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות באוקטובר 2016 ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות במאי 2018.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.