

**إتوريكوكسيب-ترتيرما ٦٠ ملغ** يساعد على تقليل الألم والتورم (التهاب) في المفاصل وفي العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من فصل عظمي، التهاب المفصل الروماتويديّ والتهاب الفقار الروماتويديّ (Ankylosing spondylitis). **إتوريكوكسيب-ترتيرما ٩٠ ملغ** يساعد على تقليل الألم والتورم (التهاب) في المفاصل والعضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفصل العظمي الروماتويديّ، والتهاب الفقار الروماتويديّ (ankylosing spondylitis). **إتوريكوكسيب-ترتيرما ٩٠ ملغ** يستعمل أيضًا لعلاج قصير الأمد للألم المتوسّط بعد جراحة الأسنان. **إتوريكوكسيب-ترتيرما ١٢٠ ملغ** يساعد على تقليل الألم والتورم (التهاب) في المفاصل وفي العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من النقرس.

**الفصلية العلاجية:** **إتوريكوكسيب-ترتيرما** هو دواء من مجموعة أدوية المسماة مثبّطات COX-2 الانتقائية. والتي تنتمي إلى مجموعة الأدوية المسماة مضادات الالتهاب الالستيرونيدية (NSAIDs).

**ما هو الفصل العظمي؟**

الفصل العظمي هو مرض مفاصل. إنه يحدث نتيجة عن انحلال تدريجي للغضروف الذي ينجد (يُغطّي) أطراف العظام. هذا الأمر يؤدي إلى تورم (التهاب)، ألم، حساسية، صلابة وتقييد.

**ما هو التهاب المفصل الروماتويديّ؟**

التهاب المفصل الروماتويديّ هو مرض التهابي طويل الأمد في المفاصل. إنه يسبب الماء، صلابة، تورم وفقدان متزايد للحركة في المفاصل التي يُؤثر عليها. إنه قد يؤدي إلى التهاب في مناطق أخرى من الجسم.

**ما هو النقرس؟** النقرس هو مرض من نوبات مفاجئة ومكررة لالتهاب مؤلم جدًا واحمرار في المفاصل. إنه يتسبب بواسطة رسوب بلورية معدنية في المفاصل.

**ما هو التهاب الفقار الروماتويديّ (ankylosing spondylitis)؟**

التهاب الفقار الروماتويديّ هو مرض التهابي للعمود الفقري والمفاصل الكبيرة.

**٢. قبل تناول التوريكوكسيب-ترتيرما**

**يُمنع استعمال إتوريكوكسيب-ترتيرما إذا:**

<div><ul style="list-style-type: none"><li>كنت حساسًا لـ <b>etoricoxib</b> أو لأحد المركبات الأخرى لهذا الدواء (مُفصّلة في بند ٦).</li><li>كنت حساسًا لأدوية مضادة للالتهاب الالستيرونيدية (NSAIDs)، بما في ذلك أسبيرين ومثبّطات COX-2 (انظر "الأعراض الجانبية" بند ٤).</li><li>كان لديك قرحة نشطة في المعدة أو نزف في المعدة أو في الأمعاء.</li><li>كان لديك مرض كبدِي وخيم.</li><li>كان لديك مرض كلوي وخيم.</li><li>كنت حاملًا أو قد تكونين حاملًا أو إذا كنت مرضعة (أنظري "الحمل الرضاعة والخصوبة"، بند ٢).</li><li>كنت دون عمر ١٦ سنة.</li><li>كانت لديك مرض معوي التهابي، مثل مرض كرون، التهاب القولون التقرّحي أو التهاب القولون.</li><li>كان لديك ضغط دم مرتفع غير مسيطر عليه بالعلاج (أفحص مع طبيبك أو الممرضة في حالة عدم تذكك من أن ضغط دمك مسيطر عليه جيدًا).</li><li>كنت تعاني من قصور القلب (متوسّط أو وخيم).</li><li>كنت تعاني من مرض قلب إقفاري، أو مرض الأوعية الدموية المحيطة (تنفق غير جيد للدم في الرجلين أو أخصصي القدمين بسبب تضيق أو انسداد الشرايين).</li><li>أصبت بأي نوع من سكتة دماغية (يشمل سكتة مصغرة، نوبة إقفارية عابرة (TIA). قد يزيد إتوريكوكسيب قليلًا الإختطار (احتمال الخطر) لحدوث نوبة قلبية وسكتة دماغية ولذلك لا يجوز تناوله من قبل مرضى كانت لديهم في الماضي مشاكل قلبية أو سكتة دماغية.</li></ul></div>
---

إذا كنت تعتقد بأن أي من هذه له علاقة بك، لا تتناول الأقراص حتى تستشير طبيبك.

**تحذيرات خاصة فيما يتعلق باستعمال إتوريكوكسيب-ترتيرما**

**قبل العلاج إتوريكوكسيب-ترتيرما أخبر الطبيب إذا:**

- كان لديك سابقة لنزيف في المعدة أو لتقرحات.
  - حصل لديك خفاف، مثلًا تعب نوبة طويلة من التقيّظات أو إسهال.
  - كان لديك تعب احتباس السوائل.
  - كانت لديك سابقة لقصور قلبي أو أي مرض قلبي آخر.
  - كانت لديك سابقة لضغط دم مرتفع. يمكن أن يرفع **إتوريكوكسيب-ترتيرما** ضغط الدم لدى مرضى معينين، خاصة في الجرعات المرتفعة. وسوف يربغ طبيبك بقياس ضغط دمك من حين إلى آخر.
  - كانت لديك سابقة لمرض في الكبد أو الكلىة.
  - كنت تتلقّى علاجًا لإلتهاب، فإن **إتوريكوكسيب-ترتيرما** يمكنه أن يمهّده أو يخفي السخونة التي تشكل إشارة لإلتهاب.
  - إذا كان لديك سكري، كولسترول مرتفع أو إذا كنت مدخنًا. يمكن لهذه العوامل أن تزيد الإختطار (احتمال الخطر) لديك لمرض قلبي.
  - إذا كنت امرأة تحاول الحمل.
  - إذا كنت مسنًا (فوق جبل ٦٥).
- إذا لم تكن متأكدًا فيما إذا كان أحد البنود المذكورة أعلاه ينطبق عليك، **تحدّث مع طبيبك قبل تناول إتوريكوكسيب-ترتيرما** وذلك للاستفسار فيما إذا كان هذا المنتج مناسبًا.

**إتوريكوكسيب-ترتيرما** يعمل جيدًا على حد سواء لدى المرضى البالغين الأصغر سنًا والمرضى الأكبر سنًا. إذا كنت فوق سن ٦٥ سنة، سوف يربغ طبيبك بمراقبتك بمهنيّين. من غير الضروري ملائمة الجرعة لدى المرضى فوق جبل ٦٥ سنة.

**تناول أدوية أخرى**

إذا كنت تتناول أو تناولت في الأونة الأخيرة أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، **فيجب إعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي بذلك**.

على وجه الخصوص، إذا كنت تتناول أحد الأدوية التالية، قد يربغ طبيبك بفحصك للتأكد من أن أدويةك تعمل كما المطلوب،

بعد بداية العلاج **إتوريكوكسيب-ترتيرما:**

- أدوية التي تميع الدم (مضادات التخثر) مثل وارفارين.
- ريفامبين (مضاد حيوي).
- ميثوتريكسات (دواء يستعمل لتنشيط جهاز المناعة، ويستعمل أحيانًا لعلاج التهاب المفصل الروماتويدي).
- سيكلوسبورين أو تاكلوريموس (أدوية لكبت جهاز المناعة).
- ليثيوم (دواء لعلاج أنواع مختلفة من الاكتئاب).
- مستحضرات مخصصة لعلاج ضغط الدم المرتفع وقصور القلب، التي تدعى مثبّطات ACE ومحصرات مستقبلة الأنجيوتنسين، مثل إينالابريل وإسبيريل، لوسارتان وفالسارتان.
- مدرات البول.
- ديجوكسين (دواء لقصور القلب ونظم قلب غير منتظم).
- مينوكسيديل (دواء لعلاج ضغط الدم المرتفع).
- ساليترولول أقراص أو محلول للإعطاء عن طريق الفم (دواء للربو).
- أقراص منع الحمل (المنح قد يؤدي لرفع الإختطار لأعراض جانبية لديك).
- علاج هرموني بدلي (المنح قد يؤدي لرفع الإختطار لأعراض جانبية لديك).
- أسبيرين، إن الإختطار لحدوث تقرحات في المعدة يكون أكبر إذا تناولت **إتوريكوكسيب-ترتيرما** مع أسبيرين.
- أسبيرين لمنع نوبات قلبية أو سكتة دماغية.
- الإمكان تناول **إتوريكوكسيب-ترتيرما** مع **جرعات منخفضة** من الأسبيرين. إذا كنت تتناول حاليًا جرعة دوائية منخفضة من الأسبيرين للوقاية من نوبة قلبية أو سكتة دماغية، لا يجوز التوقف عن تناول الأسبيرين بدون استشارة طبيبك.
- أسبيرين وأدوية مضادة للالتهاب الالستيرونيدية (NSAIDs).

**يُمنع تناول أسبيرين بجرعات مرتفعة** أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب أثناء تناول **إتوريكوكسيب-ترتيرما**.

**تناول إتوريكوكسيب-ترتيرما مع الطعام والشراب**

يُمكن تناول أقراص **إتوريكوكسيب-ترتيرما** مع أو بدون الطعام. قد تكون بداية تأثير **إتوريكوكسيب-ترتيرما** أكثر سرعة عند تناوله بدون طعام.

**الحمل، الإرضاع والخصوبة**

الحمل

لا يجوز تناول **إتوريكوكسيب-ترتيرما** خلال الحمل. إذا كنت حامل أو تعتقدن بأنك قد تكونين حامل، إذا كنت تخططين للحمل، لا يجوز تناول الأقراص. إذا حملت، توقفي عن أخذها واستشيري طبيبك. استشاري الطبيب إذ لم تكني متأكدة أو بحاجة إلى مشورة أخرى.

**الإرضاع**

ليس معروفًا إذا كان **إتوريكوكسيب-ترتيرما** يُفرّز في حليب الأم. إذا كنت مرضعة، أو تخططين للإرضاع، استشاري طبيبك قبل تناول **إتوريكوكسيب-ترتيرما**. إذا كنت تتناولين **إتوريكوكسيب-ترتيرما**، لا يجوز الإرضاع.

**الخصوبة**

لا يُوصى باستعمال **إتوريكوكسيب-ترتيرما** لدى النساء اللواتي يحاولن الحمل.

**القيادة واستعمال الماكينات**

لقد تم التبليغ عن دوار ونعاس لدى بعض المرضى الذين تناولوا **إتوريكوكسيب-ترتيرما**.

لا تقد إذا كنت تشعر بدوار أو نعاس.

لا تستعمل أي معدات أو ماكينات إذا كنت تشعر بدوار أو نعاس.

**الأطفال والبالغين**

لا يجوز إعطاء هذا الدواء للأطفال والبالغين من ١٦ سنة.

**٣. كيف تستعمل إتوريكوكسيب-ترتيرما؟**

يجب دومًا تناول **إتوريكوكسيب-ترتيرما** تمامًا بموجب ما قاله لك الطبيب. عليك التحقّق مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

تحدّد الجرعة وطريقة العلاج من قبل الطبيب فقط.

**لا يجوز تناول أكثر من الجرعة الموصى بها لوضعك**. قد يربغ طبيبك بالتحقق من العلاج بين فترة وأخرى. من المهم جدًا أن تستعمل أصغر جرعة التي تحد من الألم لديك وأن لا تتناول **إتوريكوكسيب-ترتيرما** أكثر من البتة المطلوبة. ذلك لأن الإختطار للإصابة بنوبات قلبية أو سكتات دماغية قد يربغ بعد علاج متواصل، خصوصًا بجرعات مرتفعة.

هناك جرعات مختلفة لهذا المستحضر وسوف يصف الطبيب الجرعة الملائمة لك حسب مرضك.

الجرعة الموصى بها بشكل عام هي:

**الفصل العظمي**

الجرعة الموصى بها هي ٣٠ ملغ مرة في اليوم، بالإمكان زيادة الجرعة الدوائية لحد أقصاه ٦٠ ملغ مرة في اليوم،

بحسب الحاجة.

**التهاب المفصل الروماتويدي**

الجرعة الموصى بها هي ٦٠ ملغ مرة في اليوم، مع زيادة قصوى لـ ٩٠ ملغ مرة في اليوم إذا دعت الحاجة.

**التهاب الفقار الروماتويدي**

الجرعة الموصى بها هي ٦٠ ملغ مرة في اليوم، مع زيادة قصوى لـ ٩٠ ملغ مرة في اليوم إذا دعت الحاجة.

**الحالات الألم الحاد**

يجب استعمال **إتوريكيب** في فترة الألم الحاد فقط.

**النقرس**

الجرعة الموصى بها هي ١٢٠ ملغ مرة في اليوم، وتستعمل في المرحلة الحادة من الألم فقط، محدود لـ ٨ أيام علاج كقصوى.

الجرعة الموصى بها هي ٩٠ ملغ مرة في اليوم، محدود لـ ٣ أيام علاج كقصى حد.

**معالجين لديهم مشاكل كبد**

### نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالية (مستحضرات) - ١٩٨٦

يسوق هذا الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إتوريكوكسيب-ترتيرما ٣٠ ملغ	إتوريكوكسيب-ترتيرما ٦٠ ملغ	إتوريكوكسيب-ترتيرما ٩٠ ملغ	إتوريكوكسيب-ترتيرما ١٢٠ ملغ
أقراص	أقراص	أقراص	أقراص

كل قرص يحتوي على:

إتوريكوكسيب 30 mg	إتوريكوكسيب 60 mg	إتوريكوكسيب 90 mg	إتوريكوكسيب 120 mg
إتوريكوكسيب ٣٠ ملغ	إتوريكوكسيب ٦٠ ملغ	إتوريكوكسيب ٩٠ ملغ	إتوريكوكسيب ١٢٠ ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة يوجب مراجعة بند ٦.

**اقرأ هذه النشرة باعنان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.**

- هذه النشرة تحتوي على معلومات ملخّصة عن **إتوريكوكسيب-ترتيرما**. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، إسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.
- هذا الدواء وصف للعلاج من آلمك. لا تعطف إلى آخرين، فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن وضعهم الصحي مماثل لحالتك.
- الدواء غير مخصّص للأطفال والمراهقين دون عمر ١٦ سنة.

**١. ما هو إتوريكوكسيب-ترتيرما ولأي غرض يُستعمل؟**

**إتوريكوكسيب-ترتيرما ٣٠ ملغ** يساعد على تقليل الألم والتورم (التهاب) في المفاصل وفي العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من فصل عظمي.

- إذا وجد لديك مرض كبدى خفيف، لا يجوز تناول أكثر من ٦٠ ملغ مرة في اليوم.  
- إذا وجد لديك مرض كبدى معتدل، لا يجوز تناول أكثر من ٣٠ ملغ مرة في اليوم.

**لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.**

**الاستعمال لدى الأطفال والبالغين**  
لا يجوز إعطاء إيتوريكوسيبترىما للأطفال والبالغين دون جيل ١٦ سنة.  
المسنون

لا توجد حاجة لتعديل الجرعة في المرضى المسنين. كما في كل دواء آخر، يجب توخي الحذر مع المرضى المسنين.

**طريقة الإعطاء**  
قرص إيتوريكوسيبترىما يُعد لإعطاء عن طريق الفم. يجب تناول الأقراص مرة في اليوم. يُمكن تناول إيتوريكوسيبترىما مع أو بدون طعام.

يجب بلع الدواء مع كمية قليلة من الماء.

عند عدم وجود خط شطر، يمنع التقطير. ليست هناك معلومات بخصوص السحق/المضغ.

**إذا أفرط بتناول إيتوريكوسيبترىما أكثر مما كنت بحاجة إليه**

لا يجوز أبداً تناول أقراص أكثر مما أوصى به الطبيب. إذا تناولت أقراص أكثر من اللازم من إيتوريكوسيبترىما، يجب عليك التوجه لتلقي علاج طبي فوراً.

إذا أفرطت بتناول الجرعة أو إذا بلغ طفلك بالخطأ من الدواء، يجب التوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً عبوة الدواء معك.

**إذا نسيت تناول إيتوريكوسيبترىما**

من المهم تناول إيتوريكوسيبترىما بموجب ما وصفه طبيبك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يُمنع تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد، في اليوم التالي واستمر الطبيب. يجب الاستمرار في العلاج وفقاً لما أوصى به من قبل الطبيب.

حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز التوقف عن العلاج بالبداء دون استشارة طبيبك.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام/ يجب التحقق من الموصف والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء. يجب وضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كنت لديك أي أسئلة إضافية فيما يتعلق باستخدام الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

#### ٤. الأعراض الجانبية

ككل الأدوية، قد يسبب إيتوريكوسيبترىما أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين.

لا تُفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، قد لا تعاني من أي واحدة منها.

**إذا كنت تطور أي واحد من الأعراض التالية، عليك التوقف عن العلاج بإيتوريكوسيبترىما والتوجه إلى الطبيب فوراً (انظر "قبل تناول إيتوريكوسيبترىما" بنه ٣٢)**

• ضيق في التنفس، ألم في الصدر وتورم الكاحلين الذي يظهر أو يتفاقم.

• إسهال، الصداع والعيون (يرقان) – هذه إشارات لمشاكل في الكبد.

• ألم بطن وخم أو مستمر أو يبراز أسود.

• تفاعل أرحي – الذي يمكن أن يشمل تفاعلات جلدية مثل تقرحات أو بُقع (بثرات)، أو تورم الوجه، الشفتين، اللسان أو الحلق الذي قد يسبب صعوبة في التنفس.

الأعراض الجانبية التالية يمكن أن تحدث خلال العلاج بإيتوريكوسيبترىما:

• أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين عشرة):

• ألم بطن

• أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى ١٠ حتى ١٠٠ مستخدمين من بين ١٠٠٠):

• سعال جاف (التهاب و/أو ألم بعد فحس سن)

• تورم القدمين و/أو أخمص القدمين نتيجة لاحتباس السوائل (وئمة)

• دوام، صداع

• ارتفاع في ضغط الدم

• آزيز أو ضيق التنفس (تشنج القصبات)

• إسهال، غارات (إفرازات)، التهاب المعدة (التهاب مخاطية المعدة)، حرقة، إسهال، صعوبة في الهضم، عدم راحة في البطن، غثيان، تقيؤ، التهاب المريء، تقرحات في الفم

• تغيرات في فحوص الدم المرتبطة بالكبد

• كدمات

• ضعف وتعب، مرض يُشبه الإنفلونزا

• أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى ١٠ حتى ١٠٠ مستخدمين من بين ١٠٠٠):

• التهاب المعدة والأمعاء (التهاب في جهاز الهضم يشمل المعدة والأمعاء الدقيقة/القولون)، عدوى في المسالك التنفسية العلوية، عدوى في المسالك البولية

• تغيرات في فحوص الدم المخبرية (انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء، انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء، انخفاض في الصفائح الدموية)

• حساسية مفرطة (رد فعل تحسسي بما في ذلك شرى الذي قد يكون على قدر من الجدية مما يقتضي علاجاً طبياً فورياً) زيادة أو هبوط الشهية، زيادة في الوزن

• قلق، اكتئاب، هبوط في الحدة الذهنية، النظر، إحساس أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسات)

• تغيرات في حساسية التئوق، عدم القدرة على النوم، الشعور بالخدر أو الوخز، نعاس

• تشوش الرؤية، تهيج في العين واحمرار

• طنين في الأذنين، ترتج (شعور بظواهر أثناء الوقوف)

• نظم قلب غير منتظم (رجفان أذيني)، نظم قلب سريع، قصور قلب، شعور بضيق، ضغط أو ثقل في الصدر (ذبحة صدرية)، نوبة قلبية.

• تورم، سكتة دماغية، سكتة نامغية صغيرة (نوبة احتباسية عابرة)، ارتفاع وخيم بضغط الدم، التهاب أو عية دموية

• سعال، ضيق تنفس، زعاف (نزيف من الأنف)

• انتفاخ في المعدة أو في الأمعاء، تغير في عادات التغوط، جفاف في الفم، حرقة في المعدة، التهاب في مخاطية المعدة أو تقرحات التي يمكن أن تكون وخيمة و تُسبب نزفاً، متلازمة المعى المتغيث، التهاب البنكرياس

• تورم الوجه، طفح جلدي أو حكة بالجلد، احمرار الجلد

• تخلص/تشنج عضلي، ألم/تصلب عضلي

• ارتفاع بمتسوى اليوتراسيوم في الدم لديك، تغيرات في فحوصات الدم أو فحوصات البول المرتبطة بالكلية، مشاكل وخيمة في الكلى

• إوجاع في الصدر

• أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى ١ حتى ١٠ مستخدمين من بين ١٠٠٠٠):

• وئمة وعائية (رد فعل تحسسي مصحوب بتورم الوجه، الشفتين، اللسان و/أو الحنجرة مما يؤدي إلى صعوبات في التنفس أو البلع، وقد تكون وخيمة وتستوجب تدخل طبي فوري) /رد فعل تآقي / تآقائي الذي يشمل صدمة (رد فعل وخيم يستوجب تدخل طبي فوري)

• ارتباك، عدم راحة

• مشاكل في الكبد (التهاب الكبد)

• مستويات منخفضة من الصوديوم في الدم

• قصور في الكبد، إسهال، الجذ و/أو العينين (يرقان)

• تفاعلات وخيمة في الجلد

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة الويب في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الموجه للاستشارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

يُمكن التبليغ أيضاً عن أعراض جانبية بواسطة البريد الإلكتروني: [safety@trima.co.il](mailto:safety@trima.co.il)

#### ٥. كيفية تخزين إيتوريكوسيبترىما؟

تجنب التسمم! هذا الدواء، كأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول أيدي ونظر الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال إيتوريكوسيبترىما بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المَؤن على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

يجب التخزين في مكان جاف، تحت ٣٠°C.

لا يجوز الفقاء أدوية إلى مصرف المجاري أو إلى سلة النفايات المنزلية. إرسال الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بالاستعمال.

هذه الوسائل تساهم في الحفاظ على البيئة.

#### ٦. معلومات إضافية

على ماذا يحتوي إيتوريكوسيبترىما؟

• المادة الفعالة هي etoricoxib. كل قرص مطلي يحتوي على ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠ ملغ من etoricoxib.

المركبات الأخرى هي:

إيتوريكوسيبترىما ٣٠:

Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate dihydrate, povidone, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC), titanium dioxide, polyethylene glycol.

إيتوريكوسيبترىما ٩٠:

Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate dihydrate, povidone, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC), titanium dioxide, polyethylene glycol, brilliant Blue FCF.

إيتوريكوسيبترىما ٩٠:

Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate dihydrate, povidone, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC), titanium dioxide, polyethylene glycol, brilliant Blue FCF.

إيتوريكوسيبترىما ١٢٠:

Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate dihydrate, povidone, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC), titanium dioxide, polyethylene glycol, brilliant Blue FCF.

كيف يبدو إيتوريكوسيبترىما ومحتوى العبوة إيتوريكوسيبترىما أقرص متوفرة بأربعة عبارات:

• إيتوريكوسيبترىما ٣٠ ملغ أقرص مغلقة، مستديرة ومحدبة الجهتين، بلون أبيض.

• إيتوريكوسيبترىما ٦٠ ملغ أقرص مغلقة، مستديرة ومحدبة من الجهتين، بلون أزرق فاتح.

• إيتوريكوسيبترىما ٩٠ ملغ أقرص مغلقة، مستديرة ومحدبة من الجهتين، بلون أبيض.

• إيتوريكوسيبترىما ١٢٠ ملغ أقرص مغلقة، مستديرة ومحدبة من الجهتين، بلون أزرق فاتح.

أحجام العبوات:

١٠، ١٤، ١٤، ٢٨، ٣٠ في كل لوحة (شريط).

قد لا يتم تسويق جميع الأحجام.

**المنتج وصاحب التسجيل:**  
ترىما: منتجات طبية إسرائيلية معيارت م.ض.، معيارت ٤٠٠٢٣٠٠٠، إسرائيل.

تفحص هذه النشرة والتصديق عليها من قبل وزارة الصحة في حزيران ٢٠١٨.  
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومية في وزارة الصحة:

إيتوريكوسيبترىما ٣٠ ملغ: ١٦٠٠٥٧٠٣٢١١٠٠٠

إيتوريكوسيبترىما ٦٠ ملغ: ١٦٠٠٥٨٠٣٢١١٠٠٠

إيتوريكوسيبترىما ٩٠ ملغ: ١٦٠٠٥٩٠٣٢١١٠٠٠

إيتوريكوسيبترىما ١٢٠ ملغ: ١٦٠٠٦٠٠٣٢١١٠٠٠

لتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المتكدر. لكن الدواء مُخصص لكلا الجنسين.

**٤٠٥٢٣٠٠٠**  
معبروت م.ض.  
منتجات طبية إسرائيلية  
معبروت م.ض.

PIL-0618-05 101388010

