

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - ١٩٨٦
يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط.

أجيستن أقراص للمص

كلوتريمازول ١٠ ملغ (Clotrimazole 10 mg)
المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر - أنظر الفقرة ٦ في النشرة.
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك. الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر ٣ سنوات. عليك إستعماله بشكل صحيح.

إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمتم أو لم تتحسن علامات المرض (الأعراض) بعد ٧ أيام.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟
للعلاج الموضعي بتلوثات داء المبيضات التي تم تشخيصها في جوف الفم والبلعوم. كعلاج وقائي للتقليل من شيوع حالات داء المبيضات في جوف الفم والبلعوم (oropharyngeal candidiasis) لدى معالجين لديهم خلل في وظيفة جهاز المناعة سببه علاج كيماوي، علاج بالإشعاعات، علاج ستيروئيدي بإبيضاض الدم، أورام صلبة (solid tumors) وزراعة كلية.

الفصيلة العلاجية: مضاد للإلتهاب للعلاج الموضعي في الفم.

٢) قبل إستعمال الدواء
❗ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
• كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة كلوتريمازول أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء
• أجيستن أقراص للمص غير مخصصة لعلاج تلوث فطري جهازي.
• لا يجوز إستعمال هذا الدواء لفترة طويلة بدون إستشارة الطبيب.
• يمكن أن يؤثر الدواء على نتائج فحوص وظائف الكبد.

❗ قبل العلاج بـ أجيستن أقراص للمص أخبر الطبيب إذا
• كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء.
• كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.

❗ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

❗ الحمل والإرضاع
يجب إستشارة الطبيب إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
يحتوي المستحضر على سكر! في كل قرص للمص يوجد ٨٨٨ ملغ دكستروز.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟
يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً.
عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.
الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة:
لعلاج تلوث حالي بداء المبيضات: قرص واحد للمص خمس مرات في اليوم لمدة أسبوعين.

كعلاج وقائي لدى مرضى يعانون من تثبيط لجهاز المناعة: قرص واحد للمص ثلاث مرات في اليوم خلال فترة العلاج الكيماوي أو إلى أن ينخفض مستوى الستيروئيدات إلى مقدار دوائي يومي ثابت.
لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.
القرص مخصص للمص - أتركه ليذوب ببطء في الفم لمدة ١٥ - ٣٠ دقيقة تقريباً - لا يجوز البلع.

الفحوص والمتابعة
يوصى بإجراء فحوص دورية لوظائف الكبد، خاصة لدى المرضى الذين يعانون حالياً من مرض في الكبد.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبه الدواء معك.
يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.
لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحة.
• لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أجيستن أقراص للمص قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها. بالإضافة للتأثيرات المرغوبة للدواء، قد تظهر خلال فترة إستعماله أعراض جانبية مثل: غثيان، تقيؤ، الشعور بإنزعاج في الفم، حكة.

الأعراض الجانبية التي تقتضي إهتماماً خاصاً:

يمكن أن يؤثر الدواء على نتائج فحوص وظائف الكبد (أنظر تحذيرات خاصة في الفقرة ٢).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود

على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان التبليغ لشركة بيريجو على العنوان التالي: www.perrigo-pharma.co.il

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية الى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- يجب التخزين دون ٢٥ درجة مئوية.
- بعد الفتح لأول مرة بالإمكان الإستعمال لمدة ٤ أسابيع، على ألا يتجاوز تاريخ إنتهاء الصلاحية.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Dextrose, microcrystalline cellulose, povidone, magnesium stearate.

يحتوي المستحضر على سكر! في كل قرص للمص يوجد ٨٨٨ ملغ دكستروز.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: قنينة تحتوي على ٧٠ قرص للمص دائري ومسطح الشكل بلون أبيض حتى أوف وايت (off-white) مطبوع عليها "PAD 0107" بجانب واحد.
- صاحب الإمتياز: وكالات بيريجو إسرائيل م.ض.، شارع ركيقت ١، شوهام، ٦٠٨٥٠٠٠.

- المنتج: مختبرات بادوك م.ض. (بيريجو مينيسوتا)، مينياپوليس، مينيسوتا، الولايات المتحدة.

- أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في تاريخ: آب ٢٠١٧

- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ١٥٩١٣-٣٤٥٤٠

- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.