

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

١٩٨٦ - (مستحضرات)

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

أوچمنتین ۵۰۰ ملخ آفراس

اقراض محلية.

- إذا كنت تتناول بروبيتنيسيد (يستعمل للنقرس)، فمن الجائز أن يقرر طبيبك ملاعبة الجرعة الدوائية من أوچمنتین.
- إذا كنت تتناول أدوية تساعده على منع تخثر الدم (مثل وارفارين أو أسيتيوكوارول) مع أوچمنتین، فمن الجائز أن يتطلب الأمر إجراء فحوص دم إضافية.
- يمكن أن يؤثر أوچمنتین على طريقة عمل مينوتريكتاس (دواء يستعمل لعلاج السرطان أو الأمراض الروماتيزمية).

تحتوي كل قرص على: ۵۰۰ ملخ أموكسيسيلين (على شكل تريبيدرات) (دواء يستعمل للنقرس)

amoxicillin (as trihydrate)

١٢٥ ملخ حمض كلاؤلاينيك (على شكل محل البوتاسيوم)

clavulanic acid (as potassium salt)

قائمة المركبات الإضافية مفصلة في الفقرة ٦. إقر النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء، حتى تجني هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلحة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي، وصف هذا الدواء من أجلك لا تعطيه للأخر، فهو قد يضره حتى ولو بدا أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(١) لأى غرض مخصوص الدواء؟

يستخدم أوچمنتین لدى الكبار والاطفال لعلاج التلوثات التالية:

- تلوثات في الأذن الوسطى والجيوب الأنفية.
- تلوثات في المطرق التنفسية.
- تلوثات في السالك الوريدي.
- تلوثات في الجلد وفي الأنسجة الرخوة بما في ذلك التلوثات في الأسنان.
- تلوثات في العظام والغضاريف.

أوچمنتین عبارة عن مضاد حيوي الذي يصلح بواسطة إبادة الجراثيم المسببة للتلوثات. فهو يحتوي على مواد انتئن مخالفي الذئب يسمى أموكسيسيلين وحمض كلاؤلاينيك. ينتهي أموكسيسيلين بفصيلة الأدوية المسماة بـ«پينسييلينات» التي يمكن أن تتفاقم عملها أحياناً (تصبح غير فعالة). إن المركب الفعال الآخر (حمض

كلاؤلاينيك) يمنع حدوث هذا الأمر.

الخصية العلاجية: أموكسيسيلين: خاص: حيوي من فصيلة البنسييلينات.

حمض كلاؤلاينيك: مطباطن الإنزيم بيتا-لاكتاماز.

(٢) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الergic) لـ«أموكسيسيلين»، «لحمض كلاؤلاينيك»، «لبيتسيلين» أو لك واحد من المركبات الإضافية التي تحتويها هذا الدواء (مفصلة في الفقرة ٦).
- حدث لديك ذات مرة رد فعل حساسية خطير لا يزال مدارحي آخر. ذلك قد يشمل فطح في الجلد أو انفاس الروجه أو الحنجرة.
- حدث لديك ذات مرة مشاكل في الكبد أو برقان (اصفرار الجلد) عند تناول لمضاد حيوي.

← لا تتناول أوچمنتین إذا اتىتك علية واحد معاذكراً. إذا لم تكن وانتأ، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول أوچمنتین.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

- تحدث مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول أوچمنتین إذا:
- كنت صعباً على رؤوس القطة.
- كنت تتلقى علاجاً جراهء مشاكل في الكبد أو الكلية.
- كنت لا تستطيع تحمل سليم.

إذالم تذكر وانتأ فيها إذا كان هذا الأمر ينطبق عليك، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي.

في حالات معينة، من الجائز أن يتعصب طبيبك نوع الجرثومة المسيبة للتلتوث لديك، وفقاً للنتائج، مما يعني أن العلاج الذي أوجمنتین من عيار آخر أو دواء آخر.

حالات مميّنة يجب انتبه اليها

قد يؤدي أوچمنتین إلى تفاقم حالات معيّنة موجودة، أو يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة، هذه تشمل ردود فعل حساسية، اختلالات (تشنجات)، وتهاب الأمعاء الغليظة.

إذالم تذكر وانتأ فيها إذا كان هذا الأمر ينطبق عليك، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي.

متى الانتهاء لأعراض معينة خلال فترة تناولك لـ«أوجمنتین». تقليل خطورة حدوث آية

فحوص الدم والبول

إذالم تذكر وانتأ فيها إذا كان هذا الأمر ينطبق عليك، فحوص دم (مثل فحوص تقييم حالات الأغلاي الأحمراء أو حفوص لوائح الكبيك) أو فحوص بول («احصن نسب

الجلوكوز»)، وذلك لأن أوچمنتین يمكن أن يؤثر على ثبات فحوصات من هذه النوع.

الأدوية الأخرى وأوچمنتین

إذا كنت تتناول، إذا تناولت جرعة الدوائية الآتية أياً مما ينفع، بل انتظر ٤ ساعات تقريباً قبل تناول الجرعة الدوائية الثانية. لا يجوز تناول جرعة دوائية ماضعة للتمويض عن الجرعة الدوائية المنصبة.

يجب المأوفاة في كل الحالات بوصفة طبية، أدوية نباتية وأضافات غذائية، لاحظ الطبيب

إذا كنت تتناول الپورېرینول (يستعمل للنقرس) مع أوچمنتین، فهو لا يحمل أكبر

بيان تعاني من رد فعل حساسية جلدي.

- قد يؤثر أوچمنتین على طريقة عمل ميكوفينولات موفيتيل (دواء يستعمل لمنع رفض الأعضاء المزروعة).

الحمل، الإرضاع والخصوبة

- إذا كنت في فترة الحمل أو الإرضاع، تعتقدين بانه من الجائز أشك حامل أو تخطي للحمل، توجهي إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك لتلقي استشارة قبل تناول هذا الدواء.

السياقية واستعمال الماكات

- يمكن أن يسبب أوچمنتین اعراضًا جانبية حيث أن هذه الأعراض قد تجعل غير قادر على السباحة، لا تؤثر السباحة أو تشنط الماكات إلا إذا كنت تشعر بشكل جيد.

معلومات هامة عن طرقية عمل مركبات الدواء

- يحتوي هذا الدواء على أقل من ٣٣ ملجم صوديوم في القرص ولذا يعتبر خال من الصوديوم.

(٣) كيفية إستعمال الدواء؟

دائماً يجب إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب، عليك الإستیضاخ من الطبيب أو من الصيدلي إذا مكن وانتأ شاش الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية

الجرعة الدوائية يحدده الطبيب بعد حداه من قبل الطبيب فقط.

الكارب والأطفال الذين يزيدون على ٤٠ كلغ وأكثر

الجرعة الدوائية الاعتيادية هي عادة:

٤٠ قرص أو بديل واحد يومياً على فترات متساوية.

الأطفال الذين يزيدون أقل من ٤٠ كلغ

يوصي بخلاف الأطفال بعمر ٦ سنوات وادون ذلك بواسطة معلق اوچمنتین عن طريق الفم، يجب استشارة الطبيب في حال اعطاء اقراص لأطفال يزيدون أقل من ٤٠ كلغ إن الاقراص يجب إعطاؤها بشكل يعادل معلق اوچمنتین عن طريق الفم.

الاقراص نديمه شفاف على الكتف والبكي.

إذا وجدت لديك مشاكل في الكتف فعن الكلية، فعن الكلية، فعن الكلية.

إذا وجدت لديك مشاكل في الكبد فعن الكلية، فعن الكلية.

إذا وجدت لديك مشاكل في الكبد فعن الكلية، فعن الكلية.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

كيف تتناول أوچمنتین

يجب بلع الأقراص مع علاج الطعام، ي يجب بلع الأقراص علبة الكامل مع كأس من الماء.

بالإمكان شتر الأقراص على طول الخط المؤشر من أجل تسهيل البلع، يجب تناول

فسيق الفرق في نفس الوقت. لا تفترق معلومات بشأن الساق والمضخ.

يجب توزيع الجرعات الموصى بها على مجموع الأدواء، لا تتناول جرعتين خلال ساعة واحدة.

لا يجوز تناول جرعة أوچمنتین لأكثر من أسبوعين. عليك العودة لمراجعة الطبيب إذا ما زلت تشعر بسوء.

إذا تناولت بالخطأ أكثر مما ينبغي من أوچمنتین، فإن العلامات قد تشمل انتزع في

العين (غثيان، تقيؤ أو إسهال)، اختلالات، راجع طبيبك باسرع ما يمكن، وخذ ملوك

علية الدواء ترتيب الطبيب، إذا بطل بالخطأ على الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في مستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا سبست تناول أوچمنتین

إذا سبست تناول جرعة دوائية، فتناولوا الحلبة تدرك بذلك.

لا تتناول الجرعة الدوائية الثالثة أياً مما ينفع، بل انتظر ٤ ساعات تقريباً قبل

تناول الجرعة الدوائية الثالثة. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتمويض عن

الجرعة الدوائية المنصبة.

يجب المأوفاة في كل الحالات بوصفة طبية.

إذا وفقت عن تناول أوچمنتین

حتى ولو شعرت بشكل أفضل، عليك مواصلة تناول أوچمنتین إلى انتهاء العلاج.

كل جرعة دوائية من الجرعات الدوائية هي مهمة من أجل لمساعدتك على محاربة التلوث.

إذا بقيت بعض الجرائم على قيد الحياة، فهي يمكن أن تسبب عودة التلوث.

لانتهاء الأدوية في المخزن يجب تبخيص طابع الدواء والتأكد من البرجعية الدوائية

في كل مرة تتناول فيها دواء، فض النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول استعمال الدواء، اشتهر الطبيب أو الصيدلي

(٤) الاعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال أوجهتين قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين.

لا تنتهي من قائمة الاعراض الجانبية. من الجائز ان اتعاني أي منها. الاعراض الجانبية

المذكورة لاحقاً من شأنها أن تحدث عند استعمال هذا الدواء.

حالات يتوجب عليك الانتباه إليها:

ردود فعل تحسسية:

طفح جلدي

التهاب الكبد (hepatitis)

يرقان، الذي ينجم عن ارتفاع في البيليروبين في الدم (مادة تنتج في الكبد) الذي قد

يؤدي إلى اضطراب الرحل وبطء المعدة لديك

التهاب انتاب الكلية

إطالة زمن التختثر

فقط نشاط (hyperactivity)

احتياجات اجتماعية (due to social needs)

لديهم مشاكل في الكلية

لسنان أسود بديو مليء بالتشعر.

اعراض جانبية التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم أو البول لديك:

انخفاض شديد في عدد خلايا الدم البيضاء

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (غير الدم الانحراف)

بلورات في البول

إذا ظهر طفح جانبي، إذا تفاقمت أحدي الاعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض

جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التلقيع عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الملف على الرابط "تلبيغ عن

اعراض جانبية عقب علاج دوائي، الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الموقع المباشر للتبليغ عن اعراض جانبية.

أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

(٥) كيفية تخزين الدواء؟

تحسن التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أبندي

ومجال رؤية الأطفال وأوالرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التقيّي

بدون تعلميات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على

ظهره عليه، بشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا يجوز التخزين بدرجات حرارة تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.

يجب استعمال الماء المزدوج الماء بخلاف الماء المنوي خلال ٢٠ يوماً من فتح الغلاف.

لا يجوز التخزين في العلبة الأصلية للحملة من الرطوبة.

لا يجوز استعمال الأقراص إذا كانت مشتقة أو مغطوة.

لا يجوز رمي الدواء في الحارق أو في القمامات المنزلية، استشر الصيدلي عن كيفية

النفاخل من أدواة لم تعد قيد الاستعمال. تساعد هذه الخطوات في الحفاظ على البيئة.

(٦) معلومات إضافية

ماذا يحتوي أو يحتوي:

يحتوي الدواء بإضافة لمكونات الفعالة أيضًا على:

microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate نواة القرص -

(Type A), colloidal anhydrous silica and magnesium stearate

hypromellose (5 cps, 15 cps), titanium dioxide (E171),

macrogol (4000, 6000) and dimeticon

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى الخليط:

أوچمنتن: ٥٠ ملء أقصى مللة لونها ما بين الأبيض وأوف وایت، بيسمية الشكل.

مطبوخ عليه، وخط مشقوق على جانب واحد.

هي عبارة ضمن:

- عبوات على شكل لوحيات (بليست)، موجودة ضمن علبة من الكرتون. تحتوي

على كرتون يغطى بورق مطبوع عليه، وفتحة على قرص.

- عبوات على شكل لوحيات (بليست) داخل أفلة من الألومنيوم، موجودة ضمن

علبة من الكرتون. يحتوي الغلاف على كبس ماص للرطوبة. يجب حفظ الكبس

المachsen الرطوبة داخل الغلاف ولا يجوز أكله. تحتوي كل علبة كرتون على ٢

قرصاً.

اسم صاحب الإنتباة وعنوانه: صلاة سليمان (إسرائيل) م.ض، شارع بازل

٢٥ بيت تكتا.

اسم المنتج وعنوان: سليمان (إسرائيل) م.ض، بريتنبور، بريطانيا.

اقررت وزارة الصحة معيقة هذه النشرة ومحظواها حفص ورخص من قبلها بتاريخ:

٢٠١٨ وتم تحديدها بموجب تعلميات وزارة الصحة بتاريخ: ٢٠١٨

رقم سجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

٤٨-٢٥-٧٣-٢٧-٢١

من أجل سهولة وتهorin القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، على الرغم

من ذلك، فإن القراءة تقتصر على الرجال.

العلامات التجارية هي ملكية أو امتياز مجموعة شركات GSK.

٢٠١٨ © صاحب الإنتباة: GSK أو صاحب الإنتباة الخاص بها.

Aug Tab 500 PT/7B