

## هيمافار،

### نقط للبلع ( محلول )

#### ١) إِسْمُ الدَّوَاءِ، شَكْلُهُ وَالْمِيزَانُ:

اسم الدواء: هيمافار.

الشكل: نقط للبلع ( محلول ).

#### النَّادِيَةُ الْعَالَمَةُ وَجَمِيعُهَا بِوَحْيَةِ مُخَالِدِ دِرَاقِيَّةٍ:

١ مل (٢ نقط) يحتوي على حديد (على شكل مقدار هيدروكسيد الحديد متعدد الصالون) ٥٠ مل. Iron (as Iron III Hydroxide Polymaltose Complex) 50 mg/ml.

حديد  $^{2+}$  وفينير (Ferri) هي اسماء مرادفة.

تحتوي كل نقطه على ٢٥ ملجم حديد.

١ مل من الدواء يحتوي على ٥٠ ملجم سكرور لقائمه الدواء غير الفعالة ومكونات الحساسية في الدواء.— انظر الفقرة .٦

#### الرَّأْيُ النَّدْرَةُ يَتَمَمُّنُ حَتَّى تَهَاوِيَ قَبْلَ إِسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ:

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

الدواء مخصوص لكافة الأعمار، ابتداء من الخرج الرضيع،

الأطفال، الافتان، الكبار و حتى المسنين، الدواء

مخصوص للرجال والنساء على حد سواء، عليك

استعمال شكل صحيحة، استشير الصيدلي إذا كنت

بحاجة لمعلومات إضافية، عليك التوجه للطبيب إذا

تفاقمت أو لم تتحسن علامات المرض (الأعراض)

بعد عدد أيام.

#### موجز للمعلومات المفروضة عن الدواء:

يعالج الدواء ويعتنى بنقص كريات الدم الحمراء

وإذفاض في كمية الهيموغلوبين في الدم (قدر

الدم) الناجم عن نقص الحديد في الدم.

الدواء مخصوص لكافة الأعمار، ابتداء من الخرج

وحتى المسنين.

يحدد المقدار الدوائي من الدواء بحسب عمر المحتاج

أو حسب وزنه، المعلومات إضافية يجب قراءة

الفقرة .٧ ينتهي.

#### لأي غرض مخصوص الدواء؟

يعالج الدواء ويعتنى بنقص كريات الدم الحمراء

وإذفاض في كمية الهيموغلوبين في الدم (قدر

الدم) الناجم عن نقص الحديد في الدم.

#### ٢) قبل إستعمال الدواء:

##### ١) يجوز استعمال الدواء:

- إذا كنت حسناً (أبريجي) للنادة الفعلة أو

تكل واحد من المركبات الأساسية التي تدخل في وظيفته

الدواء، النادة الفعلة تذهب في الفقرة .١ والمركبات

الإضافية مفصلة في الفقرة .٧.

- لا يجوز استعمال هذا الدواء في حالات فقر الدم

الآخر التي لا تترافق معنقي في الحديد، مثل:

فقر الدم الإيجري.

- لا يجوز استعمال الدواء في حالات اختزان الحديد

في أنسجة الجسم (Haemochromatosis) (أندرا جلا) أو في إرهاص يكون فيها استقلال

مخزون الحديد المتوفى في الجسم غير طبيعي.

##### ٣) تدابير خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

- يجب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت

تعاني أو عانت في الماضي من خلل في وظيفة

الجهاز الهضمي ( بلا فرج )، الجهاز الدموي ( بلا

الشلل)، من رض النكري (بحجو المستحضر

على نك)، نقص مد مشخص، أو إذا كنت تفتى

تقى قد تمثل مذكر.

- إذا كنت حساساً لأي أدواء أو أي دواء، عليك إبالغ

الطبيب عن ذلك قبل إستعمال الدواء.

##### ٤) إذا كنت تتناول لزوة أخرى بما في ذلك أدوية

بدون وصفة طبية وأساقفات غذائية، إنك للطبيب

أو الصيدلي عن ذلك.

##### ٥) العمل والإرهاص: إذا كنت في فترة الحمل ولو

مرضة، فيجب استشارة الطبيب لسلامة المقدار

الدوائي.

##### ٦) كيفية استعمال الدواء؟

يجب الاستعمال دائمًا بحسب التوصيات، عليك

الاستراحة من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكون

وافتقاً

##### المقدار الدوائي الاعتيادي للكبار والمرأة:

يمرعى ١٢ سنة وما فوق؛ المقدار الدوائي الاعتيادي

هو عادة:

لمبلغ نقط الداء؛ ٦٠٠٥ ملجم نقطنة في اليوم.

لعلاج فقر الدم: حتى ٦ ملجم حديد ( نقطتين )

كل ١ بلغ من وزن جسم الطفل للبيوم.

كل نقطه تحتوي على ٢٥ ملجم حديد.

##### المقدار الدوائي الاعتيادي لدى رفع حتى عمر ستة:

المقدار الدوائي الاعتيادي هو عادة حتى ١٥ ملجم حديد للبيوم (فتح .٦ نقط في اليوم). لا يجوز تجاوز هذا المقدار الدوائي.

وتفاوت توصية مراكز «الأدوية والطفلة» التابعة لوزارة الصحة، يجب استعمال الجدول أدناه، الذي يفضل

المقادير الدوائية بحسب عمر الطفل.

العمر	النقط	النقط	النقط
النقط	النقط	النقط	النقط
٦ أشهر	٧ ملجم	٧ ملجم	٦ ملجم
٦ أشهر	١٥ ملجم	١٥ ملجم	١٥ ملجم

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

##### تناول الدواء:

- بالزنكان تناول المقدار الدوائي اليومي مرة واحدة في اليوم أو يمكنه دوائية مسكنة، لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

- يجب الحرص على قياس المقدار الدوائي بواسطة

القطارة.

- يجب الانتظار فترة زمنية قدرها ساعتين على

الأقل بين تناول هذا الدواء وبين تناول مصادر

الحموضة، مسكنات، حيوانية من مجموعة

