



## ٥ كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأطفال وأو الرضع وذلك لتفادي إصabitهم بالتسنم، لا تسبب التقيني بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

**مسحوق جاف** يجب تخزينه في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة. يجب تخزين دون درجة مئوية.

معلق سائل: خزن في البراد (٨-٢ درجات مئوية) لا يجوز التجفيف.

بعد التحضير، يجب استعمال المعلق خلال ٧ أيام.

## ٦ معلومات إضافية

\* يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً على:

Silicon dioxide (Anhydrous), Carboxymethylcellulose sodium, Aspartame, Crospovidone (PVP), Sodium benzoate, Xanthan gum, Colloidal anhydrous silica, Magnesium stearate, Strawberry flavour (including maltodextrin).

أنت أيضًا معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء في الفقرة ٢

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:  
أوجمنتين معلق ٤٠٠ مل (قطعة التوت) مسحوق لتخضير معلق قموي، هو مسحوق أوف وايت متوفّر ضمن قناع زجاجية شفافة، بعد تحضيره تحتوي القناعية على ٣٥ مل، أو ٤٠ مل، أو ٧ مل، أو ١٠ مل كل خليط سائل لونه أوف وايت يسمى معلق.
- إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: چلاكسوسميكلان (إسرائيل) م، شارع بازل ٢٥ بيت تكفا.
- إسم المنتج وعنوانه: سستيلكان بنشام م ض، برينتفورد، بريطانيا.
- أقرت وزارة الصحة صبغة هذه الشارة ومحتملها فحص وفحص من قبلها بتاريخ: آذار ٢٠١٨، وتم تحديدهما بموجب تعليمات وزارة الصحة بتاريخ آيار ٢٠١٨.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ١٢٢٠٧-٩٢٧٨٨
- من أجل سهولة وتهور القراءة، تم بيغافاه هذه النشرة بصيغة المذكرة، على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصوص لكلا البندين.

### تعليمات لاستعمال حquette الفياسن

يتم التزويد بمقدمة من أجل إعطاء أو حفظ

المقدمة مخصصة للاستعمال مع أوجمنتين فقط ولا يجوز استعمالها من أجل إعطاء أيه أدوية أخرى، لأن التدريجيات خاصة بهذا المنتج تزور المقدمة مع منسق الذي يتبع لها الإتصاص بالقنية، بينما الجرعة الدوائية على حquette الفياسن الفموية بالمتليليات (ml). على سبيل تناول/إعطاء طفل الجرعة الدوائية التي أوصي بها الطبيب.

تأكد من أن ختم الغطاء كاملاً قبل الاستعمال الأول.

الأمر.

- (١) ضع القنية جيداً قبل كل جرعة دوائية.
- إنزع غطاء القنية.
- اضف كمية الماء المدونة على ملصقة القنية.
- أغلق القنية، إلقها وخف جيداً.
- إنزع غطاء القنية.

(٢) إنزع المنسق عن المقدمة. امسك القنية بقمة واندخل المنسق في غفن القنية (يجب أن يبقى المنسق في مكانه). أدخل المقدمة داخل المنسق تتأكد من أنها مؤمنة.

(٤) إقلب القنية بينما تمسك المقدمة في مكانها وإسحب الجرعة الدوائية المطلوبة كما وصف من قبل الطبيب.

(٥) ضع القنية بشكل عامودي وقم بابخراج المقدمة.

(٦) من أجل تناول/إعطاء الجرعة الدوائية، ضع طرف المقدمة بذدر داخل الفم وادفع بجهة مكبس المقدمة نحو الأسفل (كر المرافق، ٤، ٥، ٦ إذا اطلب أكثر من مقدمة واحدة /إعطاء الجرعة الدوائية).

(٧) إغسل المقدمة جيداً بالماء نظيف. دع المقدمة تجف تماماً قبل الإستعمال التالي.

(٨) أعد غطاء القنية.  
خزن في البراد ودائماً خض قبل الاستعمال.  
بعد التحضير، يجب استعمال المعلق خلال ٧ أيام.

العلامات التجارية هي بملكية أو بامتياز مجموعة شركات GSK.

© 2018 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

← راجع الطبيب حالاً إذا قاستي أنت/طفلك من إحدى تلك الأعراض.  
توقف عن إعطاء/تناول أو چمنتين.

التهاب الأمعاء الخليلية  
يؤدي إلى التهاب الأمعاء الخليلية إلى إسهال مائي الذي يترافق عادة بدم ومخاط، وإلى الم في البطن / أو سخونة.

← راجع الطبيب باسرع ما يمكن لتلقي استشارة وذلك إذا قاستي أنت/طفلك من تلك الأعراض.

### اعراض جانبية إضافية

اعراض جانبية شائعة جداً

من شأنها أن تظهر لدى أكثر من ١ من كل ١٠ أشخاص  
• إسهال (الدبار الكبار)

اعرض جانبية شائعة

من شأنها أن تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠ أشخاص

• قطرة (المبيضات، ثلوث فطري في المهبّل، الفم أو ثنياً الجلد)  
عيان، حاسنة عند تناول جرعة دوائية مرتفعة

← إذا ظهر عيان، تناول/اعطي أوجمنتين مع وجة الطعام

• تقيّف

• إسهال (الدبار الأطفال)

اعرض جانبية غير شائعة

من شأنها أن تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠ شخص

• طفح في الجلد، حكة

• طفح باز ودح (شري)

• مشاكل هضمية

• دوار

• صداع

اعراض جانبية غير شائعة التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم:

• ارتفاع في إنزيمات الكبد

اعرض جانبية نادرة

من شأنها أن تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠٠ شخص

• طفح في الجلد، الذي من شأنه أن يشمل حويصلات (التي تبدو مثل بقع داكنة في المركز محيطة بطفحة شاحبة، مع حلقة داكنة حول الأطراف - حمامس متعددة الأشكال erythema (multiforme

← إذا لاحظت إحدى تلك الأعراض راجع الطبيب عاجلاً.

اعراض جانبية نادرة من شأنها أن تظهر في فحوص الدم:

• قلة عدد خلايا الدم التي تشارك في تثثر الدم

• قلة عدد خلايا الدم البيضاء

اعرض جانبية بشيوع غير معروف (لا يمكن معرفة الشيوع من المعطيات

المتوفر)

• ردود فعل تحسسية (انظر سابقًا)

• الالتهاب الأمعاء الخليلية (انظر سابقًا)

• الالتهاب الشأن الواقي الذي يغلف الدماغ (التهاب السحايا الدماغية اللا تلوثي)

• ردود فعل جلدية خطيرة

• طفح أحمر منتشر مع حويصلات وتقشر للجلد، خاصة حول الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفينس - جونسون)، وعرض أكثر خطورة، الذي يؤدي إلى

تقشر واسع للجلد (أكثر من ٣٠٪ من مساحة سطح الجسم - انحلال البشرة الأخرى

(السمي) [DRESS])

• طفح أحمر منتشر في الجلد يترافق بحويصلات صغيرة حاوية على قبح (exfoliative dermatitis)

• طفح أحمر حرشفي يترافق بنتهوات تحت الجلد وحويصلات (exanthematos pustulosis)

• اعتراض شبيهة بالإنفلوانزا تترافق بطفح، سخونة، انتفاخ في الغدد، وناتحة شاذة

في فحوص الدم (إما في ذلك ارتفاع حمّى خلايا الدم البيضاء [eosinophilia] وازديزيات الكبد (رد فعل للدواء الذي يشمل كثرة الحمضيات وأعراض جهازية [DRESS])

← راجع الطبيب حالاً إذا قاستي أنت/طفلك من إحدى تلك الأعراض.

• الالتهاب الكبد (hepatitis)

• يرقان، الذي ينجم عن ارتفاع في البيليروبين في الدم (مادة تنتتج في الكبد) الذي قد يؤدي

إلى اصغرار الجلد وبياض العين لدى طفل/دبر

• الالتهاب الأنفي الكلية

• إطالة مدة النخت

• فرط نشاط (hyperactivity)

• اختلالات (الذي أشخاص يتناولون جرعة دوائية مرتفعة من أوجمنتين أو لديهم مشاكل

في الكلى)

• لسان أسود يbedo مليء بالشعر

• قمع على الإنسان (الدبار الأطفال)، عادة يمكن إزالته بالترشيش

اعرض جانبية التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم أو البول:

• إنخفاض شديد في عدد خلايا الدم البيضاء

• إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (نفّر الدم الانحلالي)

• بلورات في البول

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما يعاني

طفلك/تعاني أنت من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة

الطبيب.

بالإكمان التلبيغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «

أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

