

Инструкция по применению препарата, в соответствии с "Положением о фармацевтах (Препараты)" - 1986

Лекарство продается без рецепта врача

Тародент Ополаскиватель для рта

Активное вещество: Хлоргексидина глюконат 0.2 весовых %
(Chlorhexidine gluconate 0.2% w/v)

Список неактивных ингредиентов препарата приводится в пункте 6.

Прежде чем начать применение препарата, внимательно прочтите инструкцию до конца. Инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Препарат не предназначен для применения у детей моложе 12 лет. Если дети младше указанного возраста, обратитесь к врачу перед использованием. Необходимо применять данный препарат согласно указаниям в пункте дозировки настоящей инструкции. Если Вам потребуется дополнительная информация, проконсультируйтесь у фармацевта.

1. Для чего применяют данный препарат?

- Для предотвращения образования зубного налета
- Как вспомогательное средство для лечения и профилактики воспаления десен (гингивита)
- Как вспомогательное средство для поддержания гигиены ротовой полости
- Для применения после стоматологических операций и процедур, способствует заживлению десен
- Для применения при язвах и воспалениях при использовании зубных протезов и при грибковой инфекции ротовой полости

Фармакологическая группа: Антисептик

2. Перед применением препарата:

X Не следует применять препарат:

- Если вы страдаете аллергией на активное вещество хлоргексидина глюконат или на любой из дополнительных компонентов, содержащихся в препарате (см. раздел 6 «Дополнительная информация»).

Особые предостережения в связи с приемом препарата:

- **Применение препарата у детей младше 12 лет разрешается только по рекомендации врача.**
- **Не следует применять препарат на каком-либо другом участке тела, за исключением ротовой полости.** Не следует глотать препарат. При попадании препарата в глаза или уши следует тщательно промыть их водой.
- **При тяжелой аллергической реакции, вам следует прекратить применение препарата и немедленно обратиться за помощью.** (См. раздел «Побочные явления»).
- **Не следует применять препарат сразу после того, как вы чистите зубы.** Для получения дополнительной информации см. раздел «Как применять препарат».
- **Не следует отбеливать ткани, которые находились в контакте с ополаскивателем для рта.**
- **На зубах и языке могут временно появляться пятна.** См. «Побочные явления».
- **Возможны изменения вкусовых ощущений или ощущение жжения.** См. «Побочные явления».

¶ Если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

¶ Беременность и грудное вскармливание

Можно применять препарат, если вы беременны или кормите грудью.

3. Как применять препарат?

Если вы не уверены в отношении дозировки и способа приема препарата, то нужно проконсультироваться об этом с врачом или фармацевтом.

Не следует превышать рекомендуемую дозировку.

Не глотать.

Некоторые зубные пасты могут ослабить эффективность ополаскивателя для рта. После чистки зубов необходимо основательно прополоскать полость рта водой и подождать 5 минут, прежде чем использовать Тародент Ополаскиватель для рта, либо вы можете использовать ополаскиватель для рта в другое время в течение дня.

Общепринятая дозировка:

Используйте препарат два раза в день. Наполните мерный стаканчик до линии отметки 10 мл. Тщательно прополощите полость рта в течение одной минуты, а затем выплюньте раствор.

При гингивите: рекомендуется применять в течение месяца.

Для лечения язв в ротовой полости: продолжайте применение препарата в течение двух дополнительных дней после заживления.

Воспаления ротовой полости вследствие зубных протезов: очистите свои зубные протезы и положите их в раствор ополаскивателя для рта на 15 минут дважды в день.

После стоматологических операций: полощите в соответствии с указаниями вашего стоматолога.

Если ваши симптомы не проходят, **обратитесь к врачу.**

Следует отмерять необходимую дозу препарата при помощи специального мерного стаканчика.

Если по ошибке препарат проглотил ребенок или взрослый, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку от препарата.

Не следует принимать лекарство в темноте! Необходимо проверять этикетку препарата и его дозу при каждом приеме. Если вы пользуетесь очками, наденьте их перед приемом лекарства.

Если у вас есть дополнительные вопросы по поводу применения препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные явления

Как и в случае с любым другим препаратом, применением Тародента Ополаскивателя для рта может вызывать побочные явления у некоторых пользователей. Не пугайтесь, читая перечень этих явлений. Возможно, что вы не испытаете ни одно из них.

Следует прекратить полоскание рта и немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас появились сыпь, отек ротовой полости

или лица или если у вас начались **затруднения дыхания**. Все эти явления могут быть симптомами тяжелой аллергической реакции, которая встречается крайне редко.

Следует прекратить полоскание рта и **обратиться к врачу**, если возникли **раздражение в ротовой полости, боли или отек внутренней части щек**.

Дополнительные побочные явления, которые могут возникать:

- **Временное появление пятен на языке**, которые исчезают после прекращения применения препарата.
- **Временное появление пятен на зубах**. Можно устранить его посредством чистки зубов. Вы можете предотвратить появление пятен, если будете воздерживаться от питья чая, кофе и красного вина (особенно, в течение одного часа после применения препарата), и посредством ежедневной чистки зубов зубной пастой (см. раздел «Как применять препарат»). Если пятна не исчезают, то можно удалить их путем профессиональной чистки и полировки зубов у стоматолога или зубного гигиениста. Зубные протезы можно чистить с помощью средств для чистки протезов.
- Вы можете почувствовать **изменение вкусовых ощущений или ощущение жжения, «мурашек» или покалывания** на языке при первом применении ополаскивателя для рта. Обычно эти явления прекращаются при продолжительном использовании. Если они продолжаются, то следует обратиться к врачу.
- Если у вас происходит **шелушение кожи** внутри ротовой полости, разбавьте ополаскиватель водой в количестве 1:1.

При появлении побочного явления, а также если какое-либо из побочных явлений усугубляется или если вы страдаете побочным явлением, не указанным в данной инструкции, вам следует проконсультироваться у врача, стоматолога или фармацевта.

Можно сообщить о побочных явлениях в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку «Сообщение о побочных явлениях лекарственного лечения», которая находится на главной странице интернет-сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), чтобы перейти на электронный бланк сообщения о побочных явлениях, или перейдя по ссылке

<http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. Как хранить препарат?

- Не отравитесь! Этот препарат, как и любое другое лекарство, следует хранить в закрытом месте, не доступном для детей и (или) грудных детей (и вне поля их зрения). Таким образом, вы сможете предотвратить отравление препаратом. Не вызывайте рвоту без соответствующего указания врача.
- Не следует принимать препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке. Сроком годности препарата является последний день указанного на упаковке месяца.
- Храните препарат в прохладном и темном месте.
- Храните препарат в оригинальной упаковке.
- Упаковка 300 мл – срок использования: до 9 месяцев после первого открытия. Упаковка 50 мл – срок использования: до 1 месяца со дня первого открытия.

6. Дополнительная информация

В дополнение к активному ингредиенту, препарат также содержит:

Purified water, Sorbitol sol., Ethanol, Polysorbate 80, Peppermint oil

Как выглядит препарат и содержимое упаковки – прозрачный раствор (от полностью прозрачного до слегка мутного) с запахом мяты. Препарат продается в пластмассовой бутылке с крышкой, недоступной для открывания детьми, и мерным стаканчиком. Бутылка содержит 300 мл или 50 мл раствора. Возможно, что в продаже находятся бутылки не всех размеров.

Производитель и Владелец регистрации

«Таро Таасия Рокхит Лтд.», Ул. Ха-Китор 14, Хайфский залив 2624761.

Данная инструкция проверена и утверждена Министерством здравоохранения в июне 2013 года и уточнена и дополнена согласно указаниям Министерства здравоохранения в августе 2018 года.

Регистрационный номер препарата в государственном реестре лекарственных препаратов Министерства здравоохранения.: 60.32.27698.