

## يُسوق الدواء بدون وصفة طبيب

### إيبوبروفين فورته ٤٠٠،

### حبوسلات

تحتوي كل حبوسلة من **إيبوبروفين فورته ٤٠٠** على **إيبوبروفين** (Ibuprofen) يعاير ٢٠٠ ملغ. هذا الدواء مخصص للكبار والأطفال والمرافقين فوق عمر ١٢ سنة. تحتوي كل حبوسلة من **إيبوبروفين فورته ٤٠٠** على **إيبوبروفين** (Ibuprofen) يعاير ٤٠٠ ملغ.

مواد غير فعالة: انظر البند ٦ "معلومات إضافية".

**أقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك الدواء**، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا تورفت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء مخصص للكبار والأطفال والمرافقين فوق عمر ١٢ سنة. عليك تناول الدواء وفقاً لتعليمات في البند ٣ "كيفية تناول الدواء" في هذه النشرة.

استشر الصيدلي إذا كنت تحتاج لمعلومات إضافية. عليك التوجه إلى الطبيب إذا تأقمت علامات (أعراض) المرض، أو إذا لم تتحسن بعد ١٠ أيام لدى الكبار و- ٣ أيام لدى الأطفال والمرافقين بين الأعمار ١٢-١٨ سنة.

### ١. لأي عرض مخصص الدواء

**إيبوبروفين فورته ٤٠٠** هما مستحضران مخصصان لعلاج الصداع المتكرر بالتحقیقة؛ لتسكين الآلام الخفيفة حتى المتوسطة - الشدّة. صداع الأسنان الآلام التهابية الشهرية الأم الظهر، الآلام العضلات ومضادات التهابات في حالة الأمراض الروماتيزمية. **إيبوبروفين ٢٠٠** مخصص أيضاً لخفض حرارة الجسم.

**الفصيلة العلاجية:** ينتمي إيبوبروفين لمجموعة الأدوية المسماة بمضادات التهاب الستيرويدية (NSAIDs).

### ٢. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الرجي) للمادة الفعالة (إيبوبروفين)، أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند ٦).
- كان لديك في الماضي رد فعل تحسسي (مثل: ربو، انفتاح في الوجه، سيلان الأنف أو العرق) عند تناول إيبوبروفين أو مسكن الأم مشابه من مجموعة مضادات التهاب الستيرويدية.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي (حائضين أو أكثر) من قرحة أو نزيف في جهاز الهضم.
- عانيت في الماضي من نزيف أو تنقيب في الجهاز الهضمي عقب استعمال دواء من فصيلة مضادات التهاب الستيرويدية.
- كنت تعاني من قصور كبدي وخيم، قصور كلوي وخيم أو قصور وظيفي في القلب.
- كنت في الثلاثة شهور الأخيرة من الحمل.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- **قبل العلاج بـ إيبوبروفين ٢٠٠ / إيبوبروفين فورته ٤٠٠** أخبر الطبيب إذا:
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من الربو.
- كنت تعاني من مشاكل في الكلية في الكبد أو في الأوعية.
- كنت تعاني من مشاكل في القلب (مثل قصور في القلب، ندبة صدرية).
- عانيت في الماضي من نوبة قلبية، ضيق التنفس، إغماءة الشريان التاجي، الجراحة عانيت من نوبة قلبية، أعراض الميغما (التخاض جريان الدم في الأرجل أو القدمين عقب تضيق أو انسداد الشرايين) أو إذا عانيت من أي نوع كان من سكتة ماعية (يشمل السكتة الماعية البسيطة أو نوبة نقص الشريفة العارضة TIA).
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من ارتفاع ضغط الدم، كنت تعاني من السكري، كوليسترول مرتفع، أو إذا كان لديك ماضى عائلي من أمراض القلب أو سكتة ماعية.
- كان لديك ماضى لمرض في الجهاز الهضمي (مثل التهاب القولون التقرحي أو داء كرون).
- كنت تعاني من أمراض نادر التي تضرب بالنسيج الضام أو من ندبة حزامية (معرضة لمرض مناعي ذاتي الذي يؤدي لآلام في المفاصل، تغيرات في الجلد واضطرابات في أعضاء أخرى).
- كنت مقل على الخضوع لعملية جراحية (يشمل جراحة الأسنان) وذلك لأن الدواء قد يزيد من احتمالية حدوث نزيف.
- كنت مثنى.
- كنت في السنة شهور الأولى للحمل.

### • تحذيرات إضافية:

ينتمي إيبوبروفين لمجموعة أدوية والتي قد تؤدي لتضرر الخصوية لدى النساء. الضرر منكمب مع توقف العلاج بالدواء. عند الاستعمال من حين لآخر، ليس منصفاً أن تضرر احتمالات حدوث الحمل؛ لكن إذا كنت توهين مخططاً في حصول الحمل، عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

مضادات التهابات ومسكنات الآلام مثل إيبوبروفين قد تكون متعلقة بإرتفاع طفيف بخطر حدوث نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو سكتة ماعية. خصوصاً عند تناول مقادير لوائية مرتفعة. لا يجوز تجاوز الجرعة أو فترة العلاج الموسمي بهما.

هناك مخورة حدوث ضرر كلوي لدى الأطفال والمرافقين في حالات الجفاف.

### المسنون

المسنون هم ذوو ميول أكبر لتطور أعراض جانبية عقب تناول مستحضرات من مجموعة مضادات التهابات الستيرويدية، مثل إيبوبروفين، وبالأخص نزيف أو تنقيب في المعدة، والثآذن قد يكونا ميثاقان.

### فترات بعث بالأدوية:

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى والتي تحتوي على مضادات التهاب لا ستيرويدية (مثل أسبيرين، إيبوبروفين) - لا يجوز تناول هذه الأدوية سوية مع إيبوبروفين ٢٠٠ / إيبوبروفين فورته ٤٠٠ من أجل تقليل خطورة حدوث أعراض جانبية. يمكن تناول أسبيرين بمقدار لوائي منخفض (حتى ٥٠ ملغ في اليوم) بتوصية من الطبيب فقط.
- ستيرويدات (لعلاج حالات التهابية)؛ قد يزيد الاستعمال المتزامن من خطورة حدوث قرحة أو نزيف في الجهاز الهضمي.
- المضادات الحيوية المسماة كوليوتات.
- أدوية مضادة لتخثر الدم (مسيلات الدم) مثل ميثبات التخثر مثل أسبيرين/ حمض الأسيتيل سليلسيك، وارفارين، نيكوليدين).
- أدوية لتخفيف الألم (مثل كليكوزيدات ألب-ديجوسين).
- أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثل ميثبات الأزييم المحول لألدوستين ACE مثل كليتوبرين، حاضرات بيتا مثل إيتونول أو مضادات المستقبل أنجيو تينسين II مثل لوسارتان). قد يقلل إيبوبروفين من تأثير هذه الأدوية.

مدرات بولية (قد يقلل إيبوبروفين من تأثيرات المدرات البولية). أدوية التنظيم المؤقتة لاجهال المناعة (مثل ميتوتريكسات، سيكلوسبورين، تاكلوليموس).

أدوية لعلاج الهوس أو الاكتئاب (مثل الليثيوم - هناك دلائل بأن الاستعمال المتزامن يرفع من نسب الليثيوم في الدم، أو مثل الميثبات الانتقالية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs) - الاستعمال المتزامن قد يزيد من خطورة حدوث نزيف في الجهاز الهضمي).

أدوية لإيقاف الحمل (مثل ميفيبريستون). أدوية لعلاج الإنزيم (مثل زينو فونين).

### استعمال الدواء والطعام

يجب بلع الدواء مع كأس من الماء. يمكن تناول مع أو بدون طعام.

### الحمل والإرضاء الحوصوية:

أخبري الطبيب إذا أصبحت حاملاً خلال العلاج بـ إيبوبروفين ٢٠٠ / إيبوبروفين فورته ٤٠٠. لا يجوز تناول إيبوبروفين ٢٠٠ / إيبوبروفين فورته ٤٠٠ خلال الثلاثة شهور الأخيرة للحمل.

استشيري الطبيب قبل استعمال الدواء إذا كنت في السنة شهور الأولى للحمل.

إذا كنت مرضعة، استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء. أنظري البند ٢- "تحذيرات إضافية" بشأن تأثير الدواء على الحوصوية.

### سيفارة واستعمال الماكنات:

عند استعمال المقدار اللوائي الموسمي به لفترة الاستعمال الموسمي بهما، ليس هناك احتمال لحدوث أعراض جانبية والتي قد تؤثر على هذه الاعطاليت.

### ٣. كيفية استعمال الدواء

**إيبوبروفين ٢٠٠ / إيبوبروفين فورته ٤٠٠** مخصص للاستعمال قصير الأمد. فقط يجب تناول الجرعة الأقل للأصغر فترة زمنية، والمطلوبه من أجل تخفيف الأعراض. عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً بشأن المقدار اللوائي وطريقة العلاج بالدواء.

المقدار اللوائي الاعتيادي عادة هو:

### كبار وأطفال فوق عمر ١٢ سنة:

**إيبوبروفين ٢٠٠:** ٢-١ حبوسلات، حتى ٣ مرات في اليوم، يجب الانتظار ٤ ساعات على الأقل بين الجرعة والجرعة الأخرى. لا يجوز تناول أكثر من ٦ حبوسلات خلال ٢٤ ساعة.

**إيبوبروفين فورته ٤٠٠:** حبوسلة واحدة، حتى ٣ مرات في اليوم. يجب الانتظار ٤ ساعات على الأقل بين الجرعة والجرعة الأخرى. لا يجوز تناول أكثر من ٣ حبوسلات خلال ٢٤ ساعة.

لا يجوز تناول المقدار اللوائي الموسمي به.

المقدار اللوائي لدى الأطفال: لا يجوز استعمال الدواء لدى الأطفال دون عمر ١٢.

### فترة العلاج

يجب استشارة الطبيب عند الحاجة لعلاج لأكثر من ٣ أيام لدى الأطفال والمرافقين بين الأعمار ١٢-١٨ أو إذا تأقمت الأعراض. لدى الكبار، لا يجوز تناول الدواء لفترة تزيد عن ١٠ أيام متواصلة بدون تعليمات من الطبيب.

توجه الطبيب أو الصيدلي إذا استمرت الأعراض، إذا تأقمت الآلام أو السخونة، أو عند ظهور أعراض جديدة.

**طريقة تناول:** يمكن شطير الدواء، لا يجوز سحق أو مضغ الدواء وذلك من أجل تجنب طعمه المر. يجب بلع الدواء مع كأس من الماء. يمكن تناول مع أو بدون طعام.

### إذا تناولت بالخطأ مقداراً لوائياً أكبر

إذا تناولت بالخطأ مقداراً لوائياً أكبر، قد تظهر أعراض مثل غثابن أو غثيان، تغير في البطن، إسهال، رنين في الأذنين، صداع، نزيف في الجهاز الهضمي.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا تناولت طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لفرقة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبه الدواء معك.

في حالات التسمم الوخيم يحتمل حدوث أعراض مثل: توهان، بقطة أو سبات وأحياناً تشنجات. تقام الربو جازز لدى مرضى الربو.

إذا نسيتم تناول الدواء، إذا نسيتم تناول الدواء في الوقت المعتاد، يجب مواصلة تناول الدواء وفقاً لتعليمات الفصيلة اعلا. لا يجوز تناول جرعات أكبر من المقدار اللوائي المتيق.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء، ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا تورفت لديك أسئلة إضافية بما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### ٤. أعراض جانبية

كما بكل دواء، إن استعمال إيبوبروفين ٢٠٠ / إيبوبروفين فورته ٤٠٠ قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تفرغ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية من الجازز ألا تعاني أيها منها.

يمكن تقليل خطورة الأعراض الجانبية بواسطة تناول المقدار اللوائي الأقل لفترة الزمنية الأصغر والضروريين للعلاج.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً لتلقي مساعدة طبية (جراحة الطوارئ في المستشفى أو الطبيب) إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية:

- أعراض لنزيف في الجهاز الهضمي، مثل: ظهور براز دموي أو أسود كالفطران، تغير نموي أو جزيئات علفية تظهر كترسب في الماء.
- أعراض لرد فعل تحسسي وخيم، مثل:
  - صعوبة في التنفس أو صفير غير مفسر.
  - تور أو نبض سريع.
  - ردود فعل جلدية وخيمه مثل حكّة، طفح، تشقر الجلد أو ظهور حوصلات (مثل متلازمة ستيفنس جونسون)
  - انفتاح في الوجه، في اللسان أو في الحنجرة.
- مثيرات التهابية أو مشاكل في جهاز الدورة الدموية: نزيف أو كدمات غير معتاديه أو غير مفسرة، سخونة، ألم حجرة، تورحات في القدم، أعراض شبيهة بالأنفولانزا أو رهاب وخيم.
- مثيرات للمشاكل في الكبد: مثل، ألم بطن، إرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين) أو تبول بلون بني غامق.

يجب التوجه للطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية:

- سخونة، صداع، رقية متصلة، تغيرات.
- صعوبات في الهضم، الألم بطن، إمساك، إسهال، انفتاح، غثيان.

- ألم في الصدر، نبض سريع أو غير منظم.
- مشاكل في الكبد أو في الكلى، والمحموية بانتفاخ في اليدين أو الرجلين.

أدوية مثل إيبوبروفين ٢٠٠ / إيبوبروفين فورته ٤٠٠ قد تكون متعلقة بإرتفاع طفيف في خطورة حدوث نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو سكتة ماعية. انظر البند ٦ "تحذيرات إضافية".

إذا ظهر عرض جانبي، أو تأقمت أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يُمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلو عن توفسوت لوائي، عقب تسول ترفوت" ([www.health.gov.jo](http://www.health.gov.jo)) في صفحة التبلو لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.jo](http://www.health.gov.jo)) الذي يوجه للاستشارة المباشرة للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:

<https://forms.gov.jo/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic/moh.gov.jo>

### ٥. كيفية تخزين الدواء

- تحجب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول يدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date).
- الظاهر على ظهر العبوة، يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- **ظروف التخزين:** احفظ في مكان جاف. لا يجوز حفظ بدرجة حرارة فوق ٢٥ درجة مئوية.

### ٦. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة على:

٢٠٠٠: Microcrystalline cellulose, Maize starch, Crosscarmellose sodium, Magnesium stearate, Hypromellose, Cammelose sodium, Silica colloidal anhydrous, Talc, Stearic acid, Titanium dioxide E-171, Erythrosine aluminium lake E-127, Macrogol, Camauba wax, Quinoline yellow aluminium lake E-133, Brilliant blue FCF aluminium lake E-104.

### إيبوبروفين فورته ٤٠٠:

Microcrystalline cellulose, Maize starch, Crosscarmellose sodium, Magnesium stearate, Cammelose sodium, Silica colloidal anhydrous, Hypromellose, Stearic acid, Titanium dioxide E-171, Talc, Macrogol, Camauba wax.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

**إيبوبروفين ٢٠٠:** حبوسلات بلون زهري مع خط شطر من جهة واحدة.

**إيبوبروفين فورته ٤٠٠:** حبوسلات بلون أبيض مع خط شطر بكلا الجانبين.

### أحجام العبوة المصادق عليها:

إيبوبروفين ٢٠٠: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٥٠، ١٠٠، ٢٠٠ حبوسلة.  
إيبوبروفين فورته ٤٠٠: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٥٠، ١٠٠، ٢٠٠ حبوسلة.  
من الجازز ألا تسوق جميع أحجام العبوة.

تم فحص هذه النشرة والمصادقة عليها من قبل وزارة الصحة بتاريخ: ٢٠١٨.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

إيبوبروفين ٢٠٠: ٣٠٧٦٢-٩٨٨-١٢٧

إيبوبروفين فورته ٤٠٠: ٣٠٧٦٣-٩٧٢-١٢٧

من أجل سهولة توهين القراءة بصيغة هذه النشرة بصيغة المذكور، من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

صاحب التسجيل والمنتج: ديكسل م.ض، شارع ديكسل ١، أور عقيفا ٣٠٦٠٠٠.

يُنْتِج من إسرائيل ويسوق من قبل: سوبرفارم (إسرائيل) م.ض، ص.ب. ١٢١٧، هرتسليا ٤٧٢٥١٤