

تحتوي كل حبّولة على إيبورو فين (nefropurpubl) بعقار ملغ.

مواد غير فعالة: انظر البند ٦ "معلومات إضافية".

٢٠٠ بعقار على إيبورو فين قبل استعمال الدواء، تجتهد هذه النشرة على معلومات موجّة إلى المستهلك (دواء) التي توفر لديك إذن استهلاكه.

اقرأ النشرة بأكملها حتى تأويتها قبل استعمال الدواء، تجتهد هذه النشرة، على الأدوية التي يتناولها المستهلك (دواء)، إذا توفر لديك إذن استهلاكه.

هذه الأدوية مخصوصة للكبار، الأطفال والمرأهقين فوق عمر سنة

علىك تناول الدواء وفق التسلسلات في البند ٣ "كيفية تناول الدواء"

استشر الطبيب إذا كنت تحتاج لمعلومات إضافية.

علىك توجه إلى الطبيب إذا اتفقت علامات (اعراض) المرض، أو إذا لم تتحسن بعد أيام لدى الكبار -٣ أيام لدى الأطفال، والمرأهقين بين الأعمار ١٨-١٢ سنة.

١. لاي غرض مخصوص الدواء

إيبورو ٢٠٠ هو مستحضر مخصوص لعلاج الصداع المتعلق بالشيخوخة، لكنك لا يمكنه حتى المتوسطة مثل: صداع، آلام المolar الشهري، آلام الطفيف، آلام العضلات، وصداع، الوجه، أسنان، آلام العين، والآلام العصبية، وآلام المخ.

الاتّهاب في حالة الأمراض الروماتيزمية، مخصوص أيضاً لخفف حرارة الجسم.

الفصيلة العلاجية: ينتهي إيبورو فين لمجموعة الأدوية مصادات الاتهاب اللستيرينية (NSAIDs).

٢. قبل استعمال الدواء إذا

كنت تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

أوريه آخر، ولا يمكنه حتى التهاب العصب الشرياني (مثل: التهاب العصب الشرياني، أو التهاب العصب الشرياني، أو التهاب العصب الشرياني، أو التهاب العصب الشرياني، أو التهاب العصب الشرياني).

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذن تناول أو تناولت موخرًا، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

٣. كافية استعمال الدواء

يحتوي إيبورو فين لمجموعة أدوية والتي قد تؤدي لتضرر الخصوبة لدى النساء، الصبر تعنفك مع توفر العلاج بالدواء، عند الاستعمال يجب تناول قصيرة حدوث الأعراض، لأقصر فترة زمنية، والمطوبة من أجل تخفيف الأعراض، عليك التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكفاً لبيان المقدار الدوائي وطريق العلاج بالدواء.

يجب التوجه الطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية:

- سخونة صداع متصلنة تقواط.

- ضغط عيني في الصدر، نفاس سريع وغير منظم.

- مشكل في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في البينين أو

الأدوية مثل إيبورو ٢٠٠ قد تكون متعلقة بارتفاع ضغط طيف في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في البينين أو

الأدوية مثل إيبورو ٢٠٠ قد تكون متعلقة بارتفاع ضغط طيف في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

- مسكنات في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بالتوخاخ في خطرة حدوث تهيج.

- مسكنات في الصدر، آلام ملطف.

يحتوي كل حبّولة على إيبورو فين (nefropurpubl) بعقار ملغ.

مواد غير فعالة: انظر البند ٦ "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة على معلومات موجّة إلى المستهلك (دواء)، إذا توفر لديك إذن استهلاكه.

إذا توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء مخصوص للكبار، الأطفال والمرأهقين فوق عمر سنة

علىك تناول الدواء وفق التسلسلات في البند ٣ "كيفية تناول الدواء"

استشر الصيدلي إذا كنت تحتاج لمعلومات إضافية.

علىك توجه إلى الطبيب إذا اتفقت علامات (اعراض) المرض، أو إذا لم تتحسن بعد أيام لدى الكبار -٣ أيام لدى الأطفال، والمرأهقين بين الأعمار ١٨-١٢ سنة.

٣. كافية استعمال الدواء

يجب استعمال الدواء قبل تناول المقدار المسمى بعقار إيبورو فين.

يجب استعمال المقدار المسمى بعقار إيبورو فين.

يمكن تناول المقدار المسمى بعقار إيبورو فين.