

Препарат продается без рецепта врача

Адекс 200, Каплеты

Каждая каплета содержит ибупрофен (Ibuprofen) в дозировке 200 мг.

Список неактивных компонентов: смотрите пункт 6 дополнительная информация .

Перед началом применения данного препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Данная инструкция включает краткую информацию о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Препарат предназначен для взрослых, детей и подростков старше 12 лет.

Вам следует использовать препарат в соответствии с указаниями в пункте 3. Как использовать препарат данной инструкции. Если Вам необходима дополнительная информация, обратитесь к фармацевту.

Вам следует обратиться к врачу в случае, если признаки заболевания (симптомы) ухудшились или если они не улучшились через 10 дней для взрослых и 3 дня для детей и подростков в возрасте 12-18 лет.

1. Для чего предназначен препарат?

Адекс 200 является препаратом, предназначенным для лечения головной боли, связанных с беременностью, для сопротивления легких и мицеллярных болей, головные боли, зубные боли, мицеллярные боли, боли в спине, мышечные боли и являясь противовоспалительным препаратом для лечения ревматических заболеваний.

Терапевтическая группа: ибупрофен относится к группе препаратов называемой нестероидные противовоспалительные препараты (NSAIDs).

2. Перед применением препарата

Не следует пользоваться препаратом, если:

- у Вас повышенная чувствительность (аллергия) к действующему веществу (ибупрофен) или к любому другому компоненту препарата (смотрите пункт 6);
- у Вас была в прошлом аллергическая реакция (например, астма, отек лица, насморк или сны) после приема аспирина или любого болеутоляющего препарата из группы нестероидных противовоспалительных средств;
- Вы страдаете или страдали в прошлом (2 или более случаев) язвой или желудочно-кишечным кровотечением;
- Вы ранее страдали от кровотечения или извнешней болезни желудочно-кишечного тракта, после использования нестероидных противовоспалительных препаратов;
- Вы страдаете острой печеночной, почечной или сердечной недостаточностью;
- Вы находитесь на последних трех месяцах беременности

Особые предупреждения относительно использования препарата:

• Перед лечением Адексом 200 следует сообщить врачу в случае, если:

- Вы страдаете или страдали в прошлом от астмы;
- Вы страдаете заболеваниями почек, печени или кишечника;
- Вы страдаете заболеваниями сердца (например, сердечная недостаточность, стенокардия), перенесли инфаркт миокарда, операцию аортокоронарного шунтирования, заболеваниями периферических артерий (снижение притока крови к ногам или стопам из-за сужения или закупорки артерий) или перенесли инсульт любого типа (включая мини-инсульт или

транзиторную ишемическую атаку - "TIA").

- Вы страдаете или страдали в прошлом повышенным кровяным давлением, у Вас сахарный диабет, высокий уровень холестерина либо в Вашей семье отмечались случаи заболеваний сердца или инсультов.

- Вы страдаете заболеваниями желудочно-кишечного тракта (например, изъянным колитом или болезнью Крона).

- Вы страдаете заболеваниями, поражающими соединительную ткань либо системной красной волчанкой (автоиммунное заболевание, вызывающее боль в суставах, изменения кожи и поражающее другие органы).

- Вы собираетесь перенести операцию (включая стоматологическую операцию), поскольку препарат может повысить риск возникновения кровотечения.

- Вы курите.

- Вы находитесь на первых шести месяцах беременности.

• Дополнительные предупреждения:

- Ибупрофен относится к группе препаратов, которые могут вызывать нарушения fertильности у женщин. Этот эффект обратим с прекращением лечения препаратом. При использовании от случая к случаю, маловероятно, что данный препарат может нарушить Вашу шансы забеременеть; однако, если Вам не удается забеременеть, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

- Противовоспалительные и болеутоляющие препараты, такие как Ибупрофен, могут быть связаны с небольшим увеличением риска возникновения инфаркта миокарда или инсульта, особенно при приеме высоких доз препарата. Не превышайте рекомендуемую дозу или продолжительность лечения.

- Существует риск поражения почек у детей и подростков при обезоживании.

Пожилые люди

У пожилых людей существует повышенная склонность к возникновению побочных эффектов вследствие приема нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как Ибупрофен, и особенно возникновения желудочно-кишечного кровотечения или перфорации, которые могут оказаться смертельными.

Взаимодействие с другими лекарствами:

Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту. В особенности, если Вы принимаете:

- Другие препараты, содержащие нестероидные противовоспалительные средства (такие как аспирин, Ибупрофен). Не принимайте эти препараты вместе с Адексом 200, чтобы снизить риск возникновения побочных эффектов. Низкую дозу аспирина (до 75 мг/сутки) можно принимать исключительно по рекомендации врача.

Стероиды (для лечения воспалительных процессов). Их одновременное использование может увеличить риск возникновения язвы или кровотечения в пищеварительном тракте.

Антибиотики, которые называются хинолонами.

Антикоагулянты (кровоизливающиеся антикоагулянты, такие как аспирин/асегтапиасилиловая кислота, варфарин, тиклопидин).

Препараты, стимулирующие деятельность сердца (такие как сердечные гликозиды - дигоксин).

Препараты для лечения высокого кровяного давления

(например, ингибиторы АПФ, такие как Каптоприл). Взрослым не следует принимать данный препарат более двух блокаторов, например, атенолол или антагонисты рецепторов ангиотензина II, такие как Лосартан). Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если симптомы продолжаются, усиливается боль или лихорадка, либо возникают новые симптомы.

• Дуэтекти (Ибупрофен может ослабить действие этих препаратов).

• Препараты для временного подавления иммунной системы (такие как Метотрексат, Циклосторин, Теролимус).

• Препараты для лечения мании или депрессии [такие как Лит - имеются данные о том, что их одновременное употребление может привести к увеличению уровня липидов в крови а также селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (SSRIs) - одновременное употребление может увеличить риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения].

• Препараты для прекращения беременности (например, Мифепристон).

• Препараты для лечения СПИДа (такие как Эфовудин).

Применение лекарства и пища

Следует проглотить лекарство, запив стаканом воды. Можно принимать одновременно с пищей или отдельно.

Беременность, трудное вскармливание и фертильность:

Собирайте врачи, если Вы забеременели во время приема Адексом 200.

Не следует принимать Адекс 200 во время последних трех месяцев беременности.

Посоветуйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если Вы находитесь в периоде первых 6 месяцев беременности.

Если Вы кормите ребенка грудью, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом, прежде чем принимать препарат.

Смотрите пункт 2 "Дополнительные предупреждения" о влиянии препарата на фертильность.

Введение и управление механизмами

При соблюдении рекомендованной дозировки и продолжительности употребления, не ожидается возникновение эффектов способных влиять на эти действия.

3. Как использовать препарат?

Адекс 200 предназначен только для кратковременного применения.

Следует принимать наивысшую низкую дозировку, в течение самого короткого срока, которая облегчает симптомы. При возникновении сомнений по поводу дозировки или способа применения препарата Вам следует обратиться к врачу или фармацевту.

Обычно принятая дозировка является:

• Взрослые и дети старше 12 лет: 1-2 каплеты, до 3 раз в день. Следует подождать не менее 4 часов между дозами. Не принимайте более 6 каплет в течение 24 часов.

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Дозировка для детей: данный препарат не следует употреблять детям в возрасте до 12 лет.

Продолжительность лечения

Проконсультируйтесь с врачом, если требуется более 3 дней для лечения детей и подростков в возрасте 12-18 лет, либо если наблюдается усугубление симптомов.

• Препараты, стимулирующие деятельность сердца (такие как сердечные гликозиды - дигоксин).

• Препараты для лечения высокого кровяного давления

лихорадка, боль в горле, язвы во рту, гриппоподобные симптомы и крайняя усталость.

- Признаки нарушения работы печени, такие как: боль в животе, желтуха (пожелтение кожи и белков глаз) или темно-коричневое мочеиспускание.

Обратитесь к врачу, если у Вас возникли следующие побочные эффекты:

- Жар, головная боль, скованность мышц шеи, рвота.
- Затруднения пищеварения, боли в животе, запор, понос, метрорит, тошнота.
- Боли в груди, быстрый или нерегулярный пульс.
- Признаки нарушения работы печени или почек, сопровождающиеся отеком рук или ног.

Такие препараты как Адекс 200 могут быть связаны с небольшим увеличением риска возникновения инфаркта миокарда или инсульта. Смотрите пункт 2 "Дополнительные предупреждения".

Если появился побочный эффект, если один из побочных эффектов обострился, или если Вы страдаете от побочных эффектов, не указанных в данной инструкции, Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

Можно отправить отчет о побочных эффектах в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку [этот](http://www.mos.gov.ru/uroven/uroven_2/uroven_3/uroven_4/uroven_5/uroven_6/uroven_7/uroven_8/) ярко-зеленый квадрат, который находится на домашней странице веб-сайта Министерства здравоохранения (www.mos.gov.ru) и ведет к онлайн форме отчета о побочных эффектах, или путем ввода ссылки: <https://forms.gov.ru/globaldata/getsequence.aspx?formType=AdverseEffectMedic@mos.gov.ru>

5. Как хранить препарат?

• Избегайте отравления! Данное лекарство, как и любое другое, следует хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. Не высыпайте рвоту, не получив на это четких указаний врача!

• Не используйте препарат после истечения срока годности (ех. Date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

• Условия хранения: храните в сухом месте, не храните при температуре выше 25°C.

• Не храните разные лекарства в одной упаковке.

6. Дополнительная информация

В дополнение к действующему веществу препарат включает:

Microcrystalline cellulose, Maize starch, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Hypromellose, Carmellose sodium, Silica colloidal anhydrous, Talc, Stearic acid, Tridymite dioxide E-171, Erythrosine aluminum lake E-127, Macrogol, Carnauba wax, Quinoline yellow aluminum lake E-104, Brilliant blue FCF aluminium lake E-133.

Как выглядят лекарство и что содержит упаковка:

Капсулы розового цвета с линией деления на одной стороне.

Утвержденные размеры упаковки:

10, 16, 20, 30, 40, 50, 100, 1000 каплет.

Данная инструкция проверена и утверждена Министерством здравоохранения в Мае 2018

Регистрационный номер лекарства из государственного реестра Министерства здравоохранения: 039-71-26007-00

Производитель и владелец лицензии: ДЕКСЕЛЬ АДА
ул. Декель 1, Орикса 306000, Израиль