

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - ١٩٨٦
يُمنقّ الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

أبسترال ١٠٠ مِغ

أبسترال ٢٠٠ مِغ

أبسترال ٣٠٠ مِغ

أقراص للأخذ تحت اللسان

التركيب:

كل قرص يحتوي على:

المادة الفعالة وكميتها:

أبسترال ١٠٠ مِغ: فنتانيل (كستيرات) Fentanyl (as citrate) 100 mcg
أبسترال ٢٠٠ مِغ: فنتانيل (كستيرات) Fentanyl (as citrate) 200 mcg
أبسترال ٣٠٠ مِغ: فنتانيل (كستيرات) Fentanyl (as citrate) 300 mcg
أبسترال ٤٠٠ مِغ: فنتانيل (كستيرات) Fentanyl (as citrate) 400 mcg
أبسترال ٦٠٠ مِغ: فنتانيل (كستيرات) Fentanyl (as citrate) 600 mcg
أبسترال ٨٠٠ مِغ: فنتانيل (كستيرات) Fentanyl (as citrate) 800 mcg

مواد غير فعّالة ومورجات: انظر بند ٦ في النشرة : "**معلومات إضافية**".

اقرأ النشرة باسعاد حتى نهايتها قبل البدء باستعمال الدواء. هذه النشرة تحتوي على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء وصف لك. لا تعطه إلى آخرين، فهو قد يسبب الضرر لهم إذا بدا لك أن مرضهم مماثل. الدواء مخصص للبالغين فوق جيل ١٨.

تتناول هذا الدواء مع أدوية من فصيلة البنزوديازيبينات، أدوية أخرى مثبطة لجهاز الاعصاب المركزي (بما في ذلك سموم) أو كحول أو قنبش قد تسبب شعور بالنعاس العميق، صعوبات في التنفس (خمود تنفسي)، غيبوبة وموت.

١. لأي غرض مُخصص الدواء؟

أبسترال مُخصص لعلاج الألم الإخترافي لدى مرضى السرطان الذين يُعالجون بأدوية قوية لتسكين الأوجاع (أفيونيات) بشكل ثابت.

الألم الإخترافي هو ألم يظهر بشكل مفاجئ، بالرغم من أنك تستعمل مسكنات الألم أفيونية بشكل ثابت.

الفصيلة العلاجية: المادة الفعالة بأفراص أبسترال للأخذ تحت اللسان هي فنتانيل. فنتانيل ينتمي لمجموعة أدوية مخدرة قوية تستعمل لتسكين الآلام والتي تسمى أفيونيات.

٢. قبل استعمال الدواء

⊗ لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا كنت حساسًا (ديك حساسية) للمادة الفعّالة فنتانيل أو لأيّ واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في بند ٦).
- إذا كنت تعاني من مشاكل وخيمة في التنفس.
- إذا كنت لا تستعمل بشكل ثابت أدوية تستلزم وصفة طبيب من نوع أفيون يوميًا وفي أوقات ثابتة لمدة أسبوع على الأقل للسيطرة على ألمك المتواصل (على سبيل المثال أدوية أفيونية مثل: كودالين، فنتانيل، هيدرومورفون، مورفين أو كسيكودون، فيتينين). إذا لم تكن تستعمل دواء من هذا النوع **لا يجوز** لك استعمال أبسترال لأن الدواء قد يرفع الإختطار لتنفس بطيء وأو سطحي بشكل خطير، أو لانقطاع النفس.
- إذا كنت تعاني من ألم قصير الأمد المختلف عن الألم الإخترافي.

Ⓜ تحذيرات خاصة متعلّقة باستعمال الدواء

أخبر طبيبك أو الصيدلي قبل العلاج إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من الحالات التالية، لأن طبيبك سيحتاج للأخذ بالاعتبار هذه المعلومات لعلامة الجرعة من أجلك:

- إصابة في الرأس، لأن أبسترال يمكن أن يحجب مدى خطورة الإصابة.
- مشاكل في التنفس أو إذا كنت تعاني من مرض ضعف العضلات (مياسيتينيا عراقيس).
- أو إذا كنت تعاني من مشاكل قلب وخاصة إذا كنت تعاني من نظم قلب بطيء.
- ضعفدم مخفض.
- مرض في الكبد أو الكلى، قد يتوجب على طبيبك أن يلائم الجرعة بمزيد من الحذر.
- وزم في الملح وأو ارتفاع بالضغط داخل الجمجمة (ارتفاع الضغط في الدماغ الذي يسبب الألم شديدة في الرأس، غثيان/تقيؤ وضبابية في الرؤية).
- تقرحات في القدم أو التهاب في العشاء المخاطي للقم (انتفاخ واحمرار بتجويف القدم).
- إذا كنت تتناول أدوية ضد الاكتئاب أو الدواء، اقرأ بإسعاد البند التالي "أدوية أخرى وأبسترال".
- إذا تطوّر لديك في إحدى العرات قصور كلوي أو نقص في الهورمونات الجنسية (نقص في الإندروجين)مع استعمال الأفيونات.

في فترة العلاج بأبسترال، عليك إبلاغ الطبيب أو طبيب الأسنان بذلك تتناول هذا الدواء إذا:

- كنت تنوي الخضوع لعملية جراحية أيًا كانت.
- إذا كنت تعاني من ألم أو حساسية متزايدة للألم (**hyperalgesia**) وللذان لا يستجيبان لمقدار دوائي أكبر من الدواء كما حدد لك من قبل الطبيب.
- كنت تعاني من نوح الأعراض التالية: غثيان، تقيؤ، فقدان الشهية للطعام (**anorexia**)، إرهاب، ضعف، دوام وانخفاض ضغط الدم. نوح الأعراض التالية قد يشكل مؤشر لحالة خطر ممكن على الحياة والتي تسمى قصور الغدة الكظرية، وهي حالة التي لا تنتج فيها الغدد الكظرية قدر كافي من الهورمونات.

أدوية أخرى وأبسترال

إذا كنت تتناول، أو تتناول مؤخرًا، أدوية أخرى يشمل الأدوية التي تتباع بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أبلغ بذلك الطبيب أو الصيدلي.

أدوية معينة قد تزيد أو تنقص من تأثيرات أبسترال. لذلك أخبر الطبيب إذا كنت على وشك البدء بالعلاج، تغير الجرعة أو توقف العلاج بالأدوية التالية لأنه قد يتوجب على الطبيب ملائمة جرعة أبسترال :

- أدوية مضادة للفطريات المستعملة لعلاج العدوى الفطرية، مثل كيتوكونازول أو إيتراكونازول.
- مضادات حيوية من مجموعة الماكروليدات المستعملة لعلاج العدوى، مثل إريثروميسين.

- أدوية مضادة للفيروسات الناعمة لعلامة مثيبلت الأتريم بروتياز المستعملة لعلاج تلوّث الناجمة عن الفيروسات – مثل ريتوناير.
- ريفامبين أو ريفانوتين (أدوية المستعملة لعلاج تلوّثات بكتيرية).
- كلارك يامازين، فينتوتين أو فينوباربيتل (أدوية المستعملة لعلاج الإختلاجات/الصرع).
- أدوية من مصدر نباتي التي تحتوي هيبيريكوم (*Hypericum perforatum*) [St John's wort].
- أدوية تحتوي على كحول.
- أدوية من عائلة مثبطات الأتريم مونوامين أوكسيداز (MAOI). المستعملة لعلاج الاكتئاب الرخيم وبمرض باركنسون. أبلغ طبيبك إذا تناولت نواه من هذا النوع خلال الأسبوعين الأخيرين.
- أنواع معينة من مسكنات الآلام القوية المسمى محاكيات أو مثبطات جزئية مثل نوبزيتوزيفين، نيفلويفين وفينتوزستين. من الممكن أن تشعر بأعراض متلازمة فظلم (مثل غثيان، تقيؤ، إسهال، قلق، قشعريرة، رجفة وتعرق) خلال استعمال هذه الأدوية.

- أبسترال ممكن أن يزيد من التأثير المُنوّم للأدوية التالية وأيضًا زيادة الإختطار (**احتمال الخطر**) لخمود تنفسي وانخفاض ضغط الدم:
- أدوية أخرى لتسكين الآلام القوية (أدوية من عائلة الأفيونيات لتسكين الآلام أو السعال)
- أدوية للتخدير العام (المعدة للتخدير بوقت العمليات الجراحية)
- أدوية مرخية للعضلات
- أدوية منومة
- أدوية لعلاج:
 - ← الاكتئاب
 - ← الحساسية (مضادات هيستامين منومه سُمّعات H1)
 - ← قلق وذهان (أدوية من عائلة الباريتورات، بنزوديازيبينات، أدوية منومه أو مضادة للقلق)
- أدوية تحتوي على كلوندين (لعلاج ارتفاع ضغط الدم)

الإختطار لأعراض جانبية يرتفع إذا كنت تتناول أدوية مثل مضادات اكتئاب أو مضادة للذهان، لأنه يُحتمل تفاعل بين الأدوية المتمثل بتغيرات في الوضع النفسي [على سبيل المثال تهيج (عدم هدوء)، هوس، غيبوبة]، وأعراض أخرى مثل سخونة مرتفعة فوق ٣٨ درجة مئوية، ارتفاع بنظم القلب، ضغط دم غير مستقر وسُمّعات معززة، تصلب عضلات، قلة تنسيق وأو أعراض في الجهاز الهضمي (مثل غثيان، تقيؤات، إسهال). في هذه الحالة، سيصحك الطبيب إذا كان أبسترال ملائمًا لك.

استعمال الدواء بالتزامن مع الغذاء والشراب

عصير الجريب فروت ممكن أن يزيد من خطر الأعراض الجانبية لأبسترال لذلك يمنع شرب عصير الجريب فروت في فترة العلاج بأبسترال.

استعمال الدواء وتناول الكحول

أبسترال ممكن أن يسبب النعاس لدى مرضى معينين. لا يجوز استهلاك الكحول أثناء العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب لأنه من الممكن أن يسبب نعاس مفرط.

الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال أبسترال إذا كنت حاملًا. إلا إذا قبل غير ذلك من قبل الطبيب بشكل صريح لأن فنتانيل ممكن أن يسبب أعراض المُطام عند المولود ويشكل خطرًا على حياته.

لا يجوز الإرضاع في فترة العلاج بأبسترال، ولا يجوز بدء الإرضاع قبل مرور على الأقل ٥ أيام على الجرعة الأخيرة من أبسترال. فنتانيل قد ينتقل لحليب الأم ومن الممكن أن يسبب نعاس وخمود تنفسي لدى الطفل الرضيع.

إذا كنت حاملًا أو مُرضعة يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الأدوية.

السياقة واستعمال الآلات

أبسترال يمكن أن يضرب بتركه النفسية و/أو الحسية على تنفيذ مهام ذات إختطار محتمل مثل السياقة أو تشغيل الآت.

إذا كنت تشعر بالدوار، ضبابية بالرؤية أثناء استعمال أبسترال، **لا يجوز قيادة المركبة أو تشغيل الآت**.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

قبل بدء العلاج بأبسترال سيشرح لك طبيبك كيف عليك أن تتناول أبسترال للحصول على تخفيف ناجح للألم الإخترافي.

يجب استعمال الدواء دائمًا وفقًا لتعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

المستحضر مُعد لاستهلاكه فقط بحسب تعليمات طبيبك. المستحضر ممنوع للاستعمال من قبل شخص آخر غيرك، لأنه من الممكن أن يشكل خطرًا وخيمًا على الصحة، خاصة لدى الأطفال.
أبسترال هو دواء مختلف عن أدوية أخرى قد تكون تتناولتها بالماضي لعلاج ألم إخترافي،**دائمًا يجب تناول أبسترال بالجرعة التي خُددت لك من قبل طبيبك** - هذه الجرعة ممكن أن تكون مختلفة عن الجرعة لأدوية أخرى كنت قد تناولتها بالماضي لعلاج الألم الإخترافي.

الجرعة وطريقة الاستعمال يُحددان من قبل طبيبك فقط. الجرعة الاعيادية عادة هي:

بداية العلاج - إيجاد الجرعة الأكثر ملائمة

لكي يعمل أبسترال بنجاعة، على الطبيب أن يحدد الجرعة الأكثر ملائمة لعلاج ألمك الإخترافي. أبسترال يُسوق بعدة جرعات. ممكن أن يُطلب منك أن تُجرب جرعات مختلفة من أبسترال لفترة عدة نوبات من الآلام الإخترافي لإيجاد الجرعة الأكثر ملائمة لك. طبيبك سيساعدك على ذلك وسيوجهك كيف تجد قرء القرص الأكثر ملائمة لك.

إذا لم تشعر بتحسن الألم بشكل كافي بعد جرعة واحدة، من الممكن أن يرشدك طبيبك لتناول جرعة إضافية لعلاج نوبة الألم الإخترافي.

لا يجوز تناول جرعة إضافية، إلا إذا أمرك طبيبك بذلك، لأن هذا الشيء من الممكن أن يؤدي إلى استهلاك جرعة زائدة.

من الممكن أن يأمرك الطبيب أن تتناول جرعة تحتوي على أكثر من قرص واحد على التوالي. **يمكن القيام بذلك فقط إذا أمرك الطبيب بذلك بشكل صريح.**

يجب الانتظار ساعتين على الأقل من تناول الجرعة الأخيرة من أبسترال وحتى تناول الجرعة القادمة لعلاج نوبة إضافية من ألم إخترافي.

جرعة المُدايَمة (استكمال العلاج) - بعد أن تم إيجاد الجرعة الأكثر ملائمة لك في اللحظة التي وجدت أنت وطبيبك جرعة الأبسترال التي تتحكم بألمك الإخترافي، لا يجوز تناول هذه الجرعة أكثر من أربع مرات في اليوم. جرعة أبسترال ممكن أن تكون أكثر من قرص واحد.
يجب الانتظار ساعتين على الأقل من تناول جرعة الأبسترال الأخيرة وقبل تناول الجرعة القادمة لعلاج نوبة إضافية من الآلام الإخترافي.

إذا بحسب رأيك جرعة الأبيسترال التي تتناولها لا تتحكم بآلمك الاخترافي بشكل كاف، أخبر طبيبك، من الممكن أن هناك حاجة لملازمة الجرعة من جديد. لا يجوز تغيير جرعة أبيسترال، إلا إذا قيل ذلك بشكل صريح من قبل الطبيب.

لا يجوز تخفي الجرعة الموصى بها.

كيفية الاستعمال:

أبيسترال مُعد للاستعمال تحت اللسان. يجب وضع القرص تحت اللسان، هناك سوف يذوب بسرعة، وهكذا المادة الفعالة، فنتائيل، يُمْتَصُّ بالغشاء المخاطي للثم، وعندما يُمْتَص، فنتائيل يبدأ بتسكين الأوجاع.

عندما تعاني من ألم اخترقي، خذ الجرعة التي حددت من قبل طبيبك بالشكل التالي:

- إذا كان فمك جافًا تناول الماء لترطيبه. يمكن بصق أو بلع الماء.
- أخرج القرص من لويحة الأقراص (البليستر) فوراً قبل الأستعمال على النحو التالي:
 - ← إحصل واحد من مربعات لويحة الأقراص (البليستر) عن طريق التمزيق على طول الخطوط الفاصلة (أترك باقي مربعات لويحة الأقراص (البليستر) مع بعض).

← قم بتقسير طرف رفائق الألومنيوم باتجاه السهم المُعلَّم، وأخرج القرص بحذر. لا تحاول دفع القرص عن طريق غطاء الرقاقة، لأن هذا الشيء ممكن أن يضر به.

- ضع القرص تحت اللسان إلى الوراء قدر المستطاع حتى يذوبه التام.
- أبيسترال سيذوب بسرعة تحت اللسان وسيُمتص لكي يخفف من الألم.

لا يجوز مص، شطر، سحق، مضغ أو بلع القرص.

يجب وضع القرص بكماله تحت اللسان.

لا يجوز الشرب أو الأكل حتى الذوبان التام للقرص تحت اللسان.

إذا أفرطت بالخطأ في تناول الجرعة:

- يجب إخراج بقايا الدواء فوراً من الفم.
- أخبر صمّاك بذلك أو شخص آخر.
- توجه حالاً للطبيب أو لفرقة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معه. على مراقب المريض أن يحافظ على يقظة المريض بواسطة التحدث معه أو هزه من حين إلى آخر.

أعراض الجرعة المفرطة تشمل:

- تعلّس متّطرف
- تنفّس سطحي وبطيء
- تقلص عضلات

في حالة ظهور هذه الأعراض يجب استدعاء مساعدة طبية طارئة فوراً.

إذا تناولت بالخطأ بالغ أو طفل من الدواء، يجب نقله فوراً للطبيب أو لفرقة الطوارئ بالمستشفى وإحضار عبوة الدواء.

يجب المتابعة على العلاج كما أوصى به الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

إذا أصبحت لا تعاني من الألم الاخترافي، باستطاعتك إيقاف استعمال أبيسترال لكن عليك الاستمرار باستعمال دوائك الأفيوني الثابت لمعالجة الألم المتواصل وفقاً لتعليمات طبيبك.

إذا توقفت عن تناول أبيسترال، قد تعاني من أعراض فُطام التي تشبه الأعراض الجانبية الخاصة بأبيسترال.

إذا كنت تعاني من أعراض فُطام أو كنت قلقًا من تسكين ألمك، عليك استشارة الطبيب. سينظر الطبيب فيما إذا كنت بحاجة لدواء لمعالجة أعراض الفُطام.

لا يجوز تناول أدوية بالظلام! تحقق من الملمس والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بما يخص استعمال الدواء، قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

4. أعراض جانبية

ككل أي دواء، قد يسبب استعمال أبيسترال أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تتزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

إذا كنت تشعر بالتعبس بشكل متّطرف أو غير عادي، أو تنفسك يصيح بطنيء أو سطحي، يجب التوجه فوراً للطبيب أو للمستشفى القريب لتلقي علاج طارئ (انظر أيضا فصل ٣ " إذا أفرطت بالخطأ في تناول الجرعة ").

أعراض جانبية شائعة جدًا (قد تظهر على أكثر من ١ من بين ١٠ أشخاص):

- لغثيثان

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر على حتى ١ من بين ١٠ أشخاص):

- نوار، الأورأس، نعلس زائد
- ضيق في التنفّس
- التهاب بتجويّف الفم، تقيؤ، إمساك، جفاف في الفم
- تعرق، انهقاد/تعب،قلة الطاقة

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر على حتى ١ من بين ١٠٠ شخص):

- تفاعلات أو جوة (حساسية)، رجفة، اضطرابات بالروية أو ضبابية الرؤية، إبطاء أو تسارع نظم القلب، ضغط دم منخفض، فقدان الذاكرة
- اكتئاب، أفكار شوكية أو الشعور بالخوف بدون سبب، شعور بالارتباك،شعور بعدم الإدراك، شعور بقلق/قلة هدوء/حزن، شعور بالفرحة غير عادي (شيق)، تغيرات بالمزاج
- شعور متواصل بالامتلاء، ألم بالباطن، عسر الهضم (اضطراب بالمعدة)
- قرحات بالفم مشاكل باللسان، ألم بلقمو أو بالحلق، ضغطبالحلق، قرحات بالشفاه أو باللثة
- فقدان الشهية، فقدان أو تغير بحاسة الذوق/الشم
- صعوبة بالخلود إلى النوم أو اضطرابات بالنوم، قلة الانتباه/سهولة الشرود، قلة الطاقة/ضعف
- اضطرابات بالجلد، طفح جلدي، حكة، تعرق ليلي، انخفاض بحساسية للشمس، الميل للإصابةبسهولة
- آلم أو تصلب بالمفصل، تصلب عضلات
- أعراض الفُطام من السموم (مثل غثيان، تقيؤ، إسهال، قلُق، قشعريرة، رجفة، تعرق)، تناول جرعة مفرطة بالخطأ لدى الرجال: عدم القدرة على الوصول/أو المحافظة على الانتصاب، شعور عم غير جيد.

أعراض جانبية شيوعتها غير معروف (الشيوخ لا يمكن تقدير بالاعتماد على المعطيات الموجودة):

- لسان منتفخ، مشاكل تنفّس وخيمة، سقوط إجمراو الوجه، شعور بالفناء المفرط

إسهال، إختلاجات (تشنجات)، فتقاع البيدين أو الرجلين، روية أو سماع أصيابه غير موجودة بلواقع (هلوسة)، سخونة، تملّق بالسموم (إمقان)، استعمال مفرطللسوم

إن الأستعمال المتواصل لـ فنتائيل خلال الحمل قد يسبب أعراض فُطام لدى المولود والتي قد تشكل خطرًا على الحياة (انظر البند ٢).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط " التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي " الموجود في صفحة البيت بموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الموجه للاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

كذلك يمكن التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني لوحدة سلامة المُعالّجين لأصحاب التسجيل:

drugsafety@neopharmgroup.com

٥. كيف تُخزّن الدواء؟

تُحفظ التسم | أبيسترال هو دواء قوي جدًا لتسكين الآلام الذي قد يُشكل خطرًا على الحياة إذا أخذ بالخطأ من قبل طفل، لذلك، يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق ومقفّل بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ونظرهم، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

يوصى بحفظ هذا الدواء بمكان مقفل

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة الخارجية واللويحة(البليستر). تاريخ انتهاء الصلاحية يتغير للأيوم الأخير من نفس الشهر. **شروط التخزين:** لا يجوز التخزين فوق ٢٥ درجة مئوية.يجب التخزين في عبوة اللويحة (بليستر) الأصلية للحماية من الرطوبة.

كيف يتم التخلص من أقراص ليس لها استعمال؟ إذا بقي لديك أقراص أبيسترال ليس لها حاجة أكثر، يجب إعطائها للصيدلية القريبة لكي يتم إتلافها بطريقة آمنة وبذلك المحافظة على البيئة. لا يجوز إلقاء الأدوية في المجاري أو القمامة البيئية.

٦. معلومات إضافية

• بالإضافة للمادة الفعالة تحتوي الدواء أيضا على:

Mannitol, Silicified microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أبيسترال هو قرص أبيض صغير للأخذتحت اللسان، القرص يأتي بقوة وأشكال مختلفة. طبيبك يصف لك القوة وعدد الأقراص الملائم لك. قرص أبيسترال ١٠٠ مكغ هو قرص أبيض مستدير قرص أبيسترال ٢٠٠ مكغ هو قرص أبيض بيضوي الشكل قرص أبيسترال ٣٠٠ مكغ هو قرص أبيض بشكل مثلث قرص أبيسترال ٤٠٠ مكغ هو قرص أبيض بشكل جوهرة قرص أبيسترال ٦٠٠ مكغ هو قرص أبيض بشكل الحرف "D" قرص أبيسترال ٨٠٠ مكغ هو قرص أبيض بشكل كسبولة يسوق أبيسترال بعبوات تحتوي ١٠ أو ٢٠ قرص. الأقراص معبئة بلويحات (بليستر).

قد لا تكون جميع أحجام العبوات مسوّقة.

- اسم صاحب التسجيل وعنوانه:** نينوفارم مرض، هشيلواح ٦، ص.ب.٧٠٦٣، بيتح تكفا ٤٩١٧٠٠١.
- اسم المُنتج وعنوانه:** إبيسكا كويندوروم مرض، كويندوروو، كينت، بريطقيا،صالح كيلوا كيرين مرض،جلشيلس، بريطقيا.
- فحصت هذه النشرة وتم المصافحة عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ ٢٠١٥.١٠ وتم تحديثها وفق تعليمات وزارة الصحة في تاريخ ٩ ٢٠١٨.٠٩.
- أرقام تسجيل الأدوية في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:**

أبيسترال ١٠٠ مكغ ٣٣٢٦٢ ٤٨٧٣
أبيسترال ٢٠٠ مكغ ٣٣٢٦٣ ٤٨٧٤
أبيسترال ٣٠٠ مكغ ٣٣٢٦٤ ٤٨٧٥
أبيسترال ٤٠٠ مكغ ٣٣٢٦٥ ٤٨٧٦
أبيسترال ٦٠٠ مكغ ٣٣٢٦٦ ٤٨٧٧
أبيسترال ٨٠٠ مكغ ٣٣٢٦٧ ٤٨٧٨

* للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. لكن الدواء مُخصّص لكلا الجنسين.

