

ماكليفن ٤٠٠ ملغم تحضير معلق للشرب

كل ٥ مل معلق محضر تحتوي على:
٤٠٠ ملغم أموكسيسيلين (على شكل تربيدرات)

٧٥ ملغم حمض كلاغولانيك (على شكل ملح البوتاسيوم)
Clavulanic acid (as Potassium salt).

قائمة المركبات الإضافية مفصلة في الفقرة

٦ اقر الشفارة بمعنى حتى نهاية قابل استعمال الدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات

موجزة عن الدواء، إذا توفر لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وتفصيل هذه الدواء من أحكامه من أجل مطلك لا تطبخه للأخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو

بدى لك أن لاحظه الطبية مشابهة لحالتك.

(١) لاي غرض مخصوص الدواء؟

يستخدم ماكليفن للأكل، الأطفال والرضع لمعالجة التلوثات التالية:

• ثلوثات في الأذن المتوسطة والجريب الأنفية

• ثلوثات في الفرج التنفسية

• ثلوثات في المسالك البولية

• ثلوثات في الجلد والأنسجة الرخوة، بما في ذلك التلوثات في الاستئنان

• ثلوثات في العظام والمفاصل

• التهاب اللوزتين المتركر

لا تتوفر معلومات سريرية بخصوص معالجين دون عمر شهرين.

ماكليفن هو مضاد حيوي يدخل عن طريق إبراد الجراثيم التي تسبب التلوثات، هو تحتوي

على دوالين مختلفين يسميان أموكسيسيلين وحمض كلاغولانيك.

يتنبئ أموكسيسيلين إلى فصيلة الأدروية المسماة "بنسليفانيات" التي يمكن في بعض

الأحيان أن يتوقف عملها (تصبح غير فعالة)، المركب الفعال الآخر (حمض كلاغولانيك)

يمنع حدوث ذلك.

الفصيلة العالجية:

أموكسيسيلين: مضاد حيوي من فصيلة البنسلينات.

حمض كلاغولانيك: مثبات الإنزيم بينما لا يكتام.

(٢) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كنت أنت أو طفلك متأثر بالدواء (البريجي) للماء الفعال أموكسيسيلين، حمض كلاغولانيك.

لادوية أخرى من فصيلة البنسلينات أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها

الدواء (فصيلة في الـ ٦).

• حدث لك أو طفلك ذات مرة رد فعل حساسية شديد لا يزيد على ممضاد حيوي آخر، هذا الأمر

يمكن أن يشمل طفح جلدي أو انفاسوجه أو الح猩حة.

• كانت لديك أو طفلك ذات مرة مشاكل في الكبد أو برقان (اصفرار الجلد) أثناء تناول

مضاد حيوي.

← لا تستعمل ماكليفن أو لا تعطي طفلك ماكليفن إذا انطلق عليك أو على طفلك

واحد مما ذكر، إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء /تناول

ماكليفن.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

(٣) قبل العلاج بـماكليفن، إدخال الطبيب إذا:

• كنت تعاني أنت أو طفلك من مرض القible (داء وحدات النواة الانتقائي)

• كنت أنت أو طفلك تتلقىان علاجاً جراء وجود مشاكل في الكبد أو في الكلية

• كنت، أو طفلك قادر على التبول بشكل سليم

إذا لم تكن واثقاً من ابتعاث واحد من تلك الحالات عليه أو على طفلك، تحدث مع الطبيب أو

الصيدلي قبل إعطاء /تناول ماكليفن.

من الجائز أن يقوم الطبيب في حالات معينة بفحص نوع الجرثومة المسيبة للتلوث بحسب

النتائج، من الجائز أن يعطي لك طفلك علاجاً جراء وجود مشاكل في الكبد أو دواء آخر.

(٤) الحالات التي يتوجب عليك الإبتعاد عنها

ماكليفن قد يسبب بعض الحالات القاتمة، أو يسبب اعراضًا جانبية شديدة، هذه تشمل ردود

فعل حساسية، اشتراكات (شنجات) وإنقباض العاء الغليظة.

يتوجب عليك الإبتعاد عن الأعراض معينة أنت تناولت أنت أو طفلك ماكليفن، وذلك للتلقيح من

خطورة حدوث أي مشاكل انتظر القرفة ٤ - الحالات التي يتوجب عليك الإبتعاد عنها.

(٥) فوائد الماء والبول

إذا كنت تجربى أنت أو طفلك بحوص الماء (مثل الفحوص التي تقام حالة خلايا الدم الحمراء أو

خross وظائف الكبد) أو خوص البول (الفحص تسب البوليورين)، بلغ الطبيب بذلك، طفلك

ستعمل ماكليفن، ولكن ماكليفن يمكن أن يؤثر على نتائج فحوص من هذا النوع.

(٦) التداخلات /التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أنت أو طفلك موخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية

بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، اخذ للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالخصوص:

• إذا كنت تستعمل أنت أو طفلك بوريورين (يستخدم لعلاج التقرس)، من الجائز أن يقرر

الطبيب ملامة المقدار الدوائي لماكليفن.

• إذا تم تناول الأدوية التي تساعد على منع تختثر الدم (مثل وقارفان أو أسيتوكومارول)

مع ماكليفن، فمن الجائز أن يتحسن الأمر لإجراء فحوص دم إضافية.

ماكليفن يمكن أن يؤثر على طريقة عمل ميتوتيكسيات (دواء يستعمل لعلاج السرطان أو الأمراض الروماتيزمية).

ماكليفن يمكن أن يؤثر على طريقة عمل ميكوفينولات موفيتيل (دواء يستعمل لمنع رفض الأعضاء المزروعة).

(٧) استعمال الدواء والطعام
اعطى /تناول ماكليفن مع وجبة الطعام.
الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت أنت أو طفلك، التقليدة على استعمال هذا الدواء، في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتقدين بأنه من الجائز أن تكون تجربتك غير مطلوب للحمل أو الرضاعة، راجع طبيبك أو الصيدلي لإلستمارته قبل استعمال هذا الدواء.

(٨) السياقة واستعمال الماكينات
من المأذن أن تكون ماكليفن أعراض جانبية والاعراض قد تجعلك غير مؤهل للقيادة، لا تقم بالسياقة أو شغيل الماكينات، إلا إذا كنت شعرت بشكل جيد بخصوص الأطفال، يجب تجنبهم من ركوب السيارات أو من طلاق الدراجات أو من اللعب بالقارب من حركة المرور وما شابه.

(٩) معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء
يحتوي ماكليفن على أسيارتام (E951) الذي يعتبر مصدرًا لـ فنيبل (اللينين). هذا قد يلحق الضرر بالمركب المنتمي إلى فصيلة الفينيل كتون، أضطراب جيني نادر تؤديكم إلى الفينيل الذين لا يزال الجسم غير قادر على طلاقه كما ينبغي حتى يحتوي هذا الدواء على أقل من ٢٣ ملغم سوسيوم لكل ٥ مل، وبالتالي يجب تجنب خالن من الأدواء.

(١٠) كثافة استعمال الدواء
داشما ينصح استعمال الدواء بحسب تعليمات الطبيب. عليك الاستنصار من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقادير الدوائية، وطريق العلاج بالدواء المقادر الدوائي.

الكمار والأطفال الذين يزنون ٤٠ كيلو أو أكثر
• هذا المعلق غير موصى به عادة للكمار والأطفال الذين يزنون ٤٠ كيلو وما فوق، راجع الطبيب أو الصيدلي للإستمارته.

الأطفال الذين يزنون أقل من ٤٠ كيلو
ثم حساب كثافة المقادر الدوائي الـ ٤٠ كيلو.

• سوسيوم طبيبك من ماكليفن من أجل فتح عليك اعطائه للرضيع أو طفلك.

• الدواء متوفّر مع مقدمة الفراسن (أنظر تعليمات استعمال مقدمة الفراسن)، يتوجب عليك

استعمال مقدمة الفراسن وذلك لطفلك المقدار الذي ينصح به للأطفال الذين يزنون ٤٠ كيلو وما فوق.

• لا تتوفر معلومات سريرية بخصوص مقدمة الماكين.

المتعلقات الذين لديهم مشاكل في الكليتين والكبد

• إذا وجدت لديك أو لدى طفلك مشاكل في الكليتين أو الكبد، فيجب تجنب ماكليفن.

• إذا وجدت لديك أو لدى طفلك مشاكل في الكبد، فيجب تجنب الماكليفن.

• إذا وجدت لديك أو لدى طفلك مشاكل في الكبد، فيجب تجنب الماكليفن.

لا يجوز تناول المقادير الدوائية الموصى بها.

(١١) تعليمات تحضير المعلق
لتفتح الفنيدية يجب ضغط غطاء الفنيدية للأسفل وتدويره من أجل فتحه بحسب الصورة على

ظهر الغطاء. يجب إزالة حبتاء الغطاء بلف ويشكل تأم.

قبل استعمال المعلق على الماء، يجب ضغط غطاء المعلق مع الماء بحسب الصورة على

لاحقاً وتذكر على علبة الكرتون والفنيدية.

بالنسبة لـ ٥٥ مل - يجب فتح الغطاء بالفتحة للأسفل.

• بالنسبة لـ ٦٠ مل - يجب إضافة ٥٤ مل من الماء.

• بالنسبة لـ ٧٠ مل - يجب إضافة ٦٧ مل من الماء.

• بالنسبة لـ ١٠٠ مل - يجب إضافة ٨٩.٣ مل من الماء.

بعد إضافة الماء يجب غسل الفنيدية في الحال بتدفق وذلك الحصول على علبة.

يجب الرحمن على قياس المقادير الدوائية بواسطة مقدمة الفراسن الفموية.

عليك تناول / إعطاء بـ ماكليفين (٣٧) للمقادير الدوائية الموصى به من قبل الطبيب.

١) بعد تجفيف المعلق، قم بإزالة الماء من طرف الحفنة وأدخله بقوه داخل الفنيدية.

العلاءات التي تأتيها خاصه بهذا الماكليفن.

٢) أسلوب المفعنة، أغلق الفنيدية على تختتها بحيث تكون المفعنة ثابتة في مكانها.

٣) أسلوب مكبس المفعنة، بلف الغطاء بالفتحة للأسفل وبذلك ينبع الماء.

٤) عند الانتهاء من ملء المفعنة قم بقلب الفنيدية ثانية وحرر المفعنة عن الملاطم بلف.

الملامش داخل عنق الفنيدية.

بعد الاستعمال يجب إغلاق الفنيدية وغسل المفعنة بشكل تام بالماء الفاتر وتجفيفها جيداً قبل الـ إستعمال التالي.

خزن في البراد ودائماً يجب خفض الفنيدية جيداً قبل كل استعمال. من لحظة تحضيره، يجب

استعمال المعلق خلال ٧ أيام.

1 2 3 4

