

זינט טבליות 125 מ"ג

כל טבליה מכילה צפורוקסים (כ- אקסטיל) 125 מ"ג **Cefuroxime (as axetil) 125 mg**

זינט טבליות 250 מ"ג

כל טבליה מכילה צפורוקסים (כ- אקסטיל) 250 מ"ג **Cefuroxime (as axetil) 250 mg**

זינט טבליות 500 מ"ג

כל טבליה מכילה צפורוקסים (כ- אקסטיל) 500 מ"ג **Cefuroxime (as axetil) 500 mg**

רשימת המרכיבים הנוספים מפורטת בסעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

זינט טבליות על-ידי אנטיביוטיקה המשמשת לטיפול במבוגרים ובילדים. היא מפעלת על-ידי השמדת החיידקים שגורמים לזיהומים. היא שייכת לקבוצת תרופות הנקראת **צפלוספורינים** (דור שנ').

זינט טבליות משמשת לטיפול בזיהומים של:

- הגרון
- הסינוס
- האוזן התיכונה
- היראות או החזה
- דרכי השתן
- העור והרקמות הרכות.

זינט טבליות יכולה לשמש גם:

- לטיפול במחלת ליים (זיהום המופץ על-ידי טפילים הנקראים קרציות). יתכן והרופא שלך יבדוק את סוג החיידק הגורם לזיהום שלך ויבחן האם החיידק רגיש לזינט טבליות במהלך הטיפול שלך.

קבוצה תרופית:

אנטיביוטיקה מסוג צפלוספורינים, דור שנ'.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לצפורוקסים אקסטיל או לאנטיביוטיקות כלשהן מסוג צפלוספורינים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (כמפורט בסעיף 6).
- אם הייתה לך אי פעם תגובה אלרגית חמורה (רגישות יתר) לכל סוג אחר של אנטיביוטיקה מסוג בטא-לקטאם (פניצילינים, מונובקטאמים וקרבאפנים).
- ← אם אתה חובש שזה חל עליך, אל תיקח זינט טבליות לפני שתבדוק זאת עם הרופא שלך.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

ילדים

זינט טבליות אינה מומלצת לילדים מתחת לגיל 3 חודשים, מכיוון שהבטיחות והיעילות אינן ידועות בקבוצת גיל זאת.

אתה חייב לשים לב לסימפטומים מסוימים, כגון תגובות אלרגיות, זיהומים פטרייתיים (כגון *קנדידה*) ושלשול חמור (דלקת דמוית ממברנה של המעי הגס (*pseudomembranous colitis*)) בזמן שאתה נוטל זינט טבליות. זה יפחית את הסיכון לבעיות כלשהן. ראה 'מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם' בסעיף 4.

אם אתה זקוק לבדיקת דם

זינט טבליות עלולה להשפיע על התוצאות של בדיקת רמות סוכר בדם או של בדיקת דם המכונה *בדיקת קומבס*. אם אתה זקוק לבדיקת דם: ← **ספר לאדם הלוקח את הדגימה שאתה נוטל זינט טבליות.**

תרופות אחרות וזינט טבליות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה או אם יתכן ותיקח תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות המשמשות להפחתת נכות החומצה בקיבה שלך (לדוגמה *נוגדי חומצה* המשמשים לטיפול בצרבת) יכולות להשפיע על אופן הפעולה של זינט טבליות.
- פרובוצייד
- נוגדי קרישה שניתנים דרך הפה

שימוש בתרופה ומזון

זינט טבליות טבליות אחרי האוכל. זה יעזור להגביר את יעילות הטיפול.

גלולות למניעת הריון

זינט טבליות עלולה להפחית את יעילותן של גלולות למניעת הריון. אם את לוקחת גלולות למניעת הריון בזמן שאת מטופלת בזינט טבליות, את צריכה להשתמש גם בשיטה **למניעת הריון** (כגון קונדומים). התייעץ עם הרופא שלך.

הריון, הנקה ופוריות

אם את בהריון או מיניקה, חשבת שיתכן ואת בהריון או מתכננת להרות, היועצי ברופא או ברוקח שלך לפני נטילת תרופה זו.

ניגיה ושימוש במכונית

זינט טבליות יכולה לגרום לך להיות פחות ערני. אחרות שגורמות לך להיות פחות ערני.

← **אין לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות בזמן השימוש בתרופה** אם אתה מרגיש לא טוב. באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

- זינט טבליות מכילה:
 - Propyl parahydroxybenzoate ו- Methyl parahydroxybenzoate העלולים לגרום לתגובות אלרגיות (יתכן ומאוזרות)
 - Sodium benzoate
 - 0.00152 מ"ג בכל טבליה של 125 מ"ג.
 - 0.00203 מ"ג בכל טבליה של 250 מ"ג.
 - 0.00506 מ"ג בכל טבליה של 500 מ"ג.
- תרופה זו מכילה פחות מ- 23 מ"ג נתון בטבליה ולכן נחשבת נוטלת נתן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים

המינון המקובל בדרך כלל של זינט טבליות הוא 250 מ"ג עד 500 מ"ג פעמיים ביום כתלות בחומרה ובסוג הזיהום.

ילדים

המינון המקובל בדרך כלל של זינט טבליות הוא 10 מ"ג/ק"ג (עד למקסימום של 125 מ"ג) עד 15 מ"ג/ק"ג (עד למקסימום של 250 מ"ג) פעמיים ביום כתלות בחומרה ובסוג הזיהום.

משך הטיפול המקובל הוא 7 ימים (עשוי לנוע בטווח של 5-10 ימים).

אין לעבור על המנה המומלצת

בהתאם למחלה או לאופן שבו אתה או ילדך מגיבים לטיפול, המנה ההתחלתית עשויה להשתנות או שיהיה צורך ביותר ממחזור אחד של טיפול.

יש לבלוע את זינט טבליות בשלמותן עם קצת מים, **לאחר האוכל.**

אין ללעוס, לכתוש או לחלק את הטבליות - זה עלול להפוך את הטיפול לפחות יעיל.

לילדים קטנים שאינם בולעים טבליות, יש להשתמש בתחריף.

מטופלים עם בעיות בכליות

אם יש לך בעיה בכליות, הרופא שלך עשוי לשנות את המנה שלך.

← **פנה לרופא שלך אם זה חל עליך.**

אם נטלת בטעות שלין מינון גבוה יותר

אם אתה נוטל יותר מדי זינט טבליות, תהיה עלול לסבול מהפרעות נוירולוגיות, ויבודש יש **במיוחד גבוהה לפתח התקפים** (פרכוסים). ← אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מה התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה. קח את המנה הבאה שלך בזמן הרגיל היועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אל תפסיק ליטול זינט טבליות ללא קבלת יעוץ.

חשוב שתשלים את מחזור הטיפול המלא בזינט טבליות. אל תפסיק ליטול את התרופה, אלא אם הרופא שלך מיישך לך להפסיק. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא, כיוון שאם אתה לא משלים מחזור מלא של טיפול, הזיהום עלול לחזור.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בזינט טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם

מספר קטן של אנשים הנוטלים זינט טבליות עלולים לפתח תגובה אלרגית או תגובה עורית העלולה להיות חמורה. חסמינים של תגובות אלה כוללים: **תגובה אלרגית חמורה.** הסימנים כוללים **פריחה מוגבלת ומגדרת, התנפחות,** לעיתים על הפנים או הפה. הגורמת לקשיי נשימה.

• **פריחה בעור,** שעלולה להיות מלווה בשלפוחיות, ונראית כמו **מטרות קטנות** (כתם כהה מרכזי המוקף באזור חיוור עם טבעת כהה סביב השוליים).

• **פריחה מפושטת עם שלפוחיות וקילוף של העור** (אלה עלולים להיות סימנים של *סממנות טיבנס-ג'ונסון* או *טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס* (*toxic epidermal necrolysis*)).

מצבים אחרים שאתה צריך לשים לב אליהם כשאתה נוטל זינט טבליות כוללים:

• **זיהומים פטרייתיים.** תרופות כמו זינט טבליות יכולות לגרום לגידול יתר של פטרייה (*קנדידה*) בגוף אשר עלול להוביל לזיהומים פטרייתיים (כגון פטרת הפה). תופעת לוואי זו סבירה יותר אם אתה נוטל זינט טבליות לזמן ממושך.

• **שלשול חמור (דלקת דמוית ממברנה של המעי הגס (*pseudomembranous colitis*)).** תרופות כמו זינט טבליות עלולות לגרום לדלקת במעי הגס, הגורמת לשלשול חמור, בדרך כלל עם דם וריד, כאב בטן, חום.

• **תגובת ג'אריש-הרקסהיימר.** חלק מהחולים עלולים לפתח חום גבוה, צמרמורות, כאב ראש, כאב שרירים ופריחה בעור במהלך הטיפול בזינט טבליות למחלת ליים. זה ידוע כתגובת *ג'אריש-הרקסהיימר*. התסמינים נמשכים בדרך כלל כמה שעות או עד ליום אחד.

← **פנה לרופא מיד אם מופיע אחד מהתסמינים האלה.**

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות

אלה עלולות להופיע ב- **עד 1 מתוך 10 אנשים:**

- זיהומים פטרייתיים (כגון *קנדידה*)
- כאב ראש
- סחרחורת
- שלשול
- בחילה
- כאב בטן.

תופעות לוואי שכיחות שעלולות להופיע בבדיקות דם:

- עליה בסוג של תאי דם לבנים (*אאונינופליה*)
- עליה באימיני כבד.

תופעות לוואי שאינן שכיחות

אלה עלולות להופיע ב- **עד 1 מתוך 100 אנשים:**

- הקאות
- פריחות בעור.

תופעות לוואי שאינן שכיחות שעלולות להופיע בבדיקות דם:

- ירידה במספר טסיות הדם (תאים שמסייעים בקרישת דם)
- ירידה במספר תאי הדם הלבנים
- בדיקת קומבס חיובית.

תופעות לוואי אחרות

תופעות לוואי אחרות התרחשו במספר קטן מאוד של אנשים, אך שכיחותן המדויקת אינה ידועה:

- שלשול חמור (דלקת דמוית ממברנה של המעי הגס (*pseudomembranous colitis*))
- תגובות אלרגיות
- תגובות בעור (כולל חמורות)
- חום גבוה
- הצהבה של לובן העיניים או של העור
- דלקת כבד (*הפטטיס*).

תופעות לוואי שעלולות להופיע בבדיקות דם:

- תאי דם אדומים הנחרסים במהירות רבה מדי (*אנמיה המוליטית*).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מתרופעת הלוואי מחמייה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי התפוגה (exp. date). המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אחסן מתחת ל- 30°C באריזה המקורית במקום יבש.

אין להשתמש בתרופה אם הטבליות סדוקות או אם אתה מבחין בסימנים גלויים אחרים של קלקול התרופה.

אין להשליך תרופות לבזבז או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאינן בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם -

Tablet Core: Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium Type A, Hydrogenated vegetable oil, Sodium lauril sulphate, Silica colloidal anhydrous.

Film Coat: Hypromellose, Propylene glycol, Methyl parahydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Opaspray White M-1-7120J (Titanium dioxide, Hypromellose, Industrial methylated spirits, Sodium benzoate, Purified water).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה -

טבליות זינט 125 מ"ג הן טבליות בצבע לבן-אוף-וויט, מצופות, בצורת כמסוה, מקורות משני הצדדים, חלקות בצד אחד ומוטבעות עם "GX ES5" בצד השני. הן ארוכות באריות בליסט עם רדיד אלומיניום, סגורות בקרטון. כל אריזה מכילה 10 או 50 טבליות.

טבליות זינט 250 מ"ג הן טבליות בצבע לבן-אוף-וויט, מצופות, בצורת כמסוה, מקורות משני הצדדים, חלקות בצד אחד ומוטבעות עם "GX ES7" בצד השני. הן ארוכות באריות בליסט עם רדיד אלומיניום, סגורות בקרטון. כל אריזה מכילה 10 או 50 טבליות.

טבליות זינט 500 מ"ג הן טבליות בצבע לבן-אוף-וויט, מצופות, בצורת כמסוה, מקורות משני הצדדים, חלקות בצד אחד ומוטבעות עם "GX EG2" בצד השני. הן ארוכות באריות בליסט עם רדיד אלומיניום, סגורות בקרטון. כל אריזה מכילה 2, 10 או 50 טבליות. יתכן ולא כל גדלי האריות משווקים.

שם בעל הירושה וכתובתו: גלקסו אופריישנס אנגליה בע"מ, רח' יבול 25, פתח תקוה.

שם היצרן וכתובתו: גלקסו אופריישנס אנגליה בע"מ (גלקסו וולקס אופריישנס), ברנד קאסל, אנגליה.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

זינט טבליות 125 מ"ג: 41-40-25801

זינט טבליות 250 מ"ג: 41-42-25801

זינט טבליות 500 מ"ג: 41-41-25803

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

סימני מסחר הינם בעלות או בכנינות של קבוצת החברות של GSK. ©2018 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.