

קסילו-פוא[®], תרסיס לא'

החוור הפעיל ורכיבו:
קסילומטАЗולין הידרוכלוריד 0.1% (Xylometazoline hydrochloride 0.1%).
לרשימת החומר הבוטני פיעלים, אנא ראה סעיף 6.

קרא בעין את העלן עד סופו בטרם תשמש בתרופה. עלן זה מכיל מידע מצוי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12 אשר רגשים יותר להופעת תופעות לוואי,
אל בהמלצת הרופא וחתת השגתו.

עלן להשתמש בצורה נסופת. הייעוץ ברוקח אם הינך זקוק למיצע נוסף.
לרופא באם סמני המחלת (התסמים) מוחדרים או אינם משתפרים לאחרר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

- להקלת מהירה של גוש באף במשך עד 10 דקות.
- קסילו-פוא מכווית את כל הדם באף וכן מפחיתה את הגודש באף. דבר זה מאפשר לחולים הסובלים מהמצטננות לשום דרך האף.
- קובצת טרפזית: קבוצת הסימפטומים.

2. לפני שימוש בתרופה:

- אין להשתמש בתרופה:
- אם אתה ריש (אלרג) לחומר הפעיל (קסילומטАЗולין הידרוכלוריד), לאחד ממרכיביו התרופהอาจ ערערת או לתכשירים דומים לאוთה מטרה.
 - במקרים של דלקת של רירית האף.
 - לאחר התערבות אנטרוביוליך דרכ האף או לאחר התערבות כירוגית אחרת החושפת את קרטמי המוח.
 - לאחר כויה טרבס-ספנאדיילית של בלוטת האנטרוביוליך דרכ האף או לאחר ניתוח אף ולוע.
 - הינך סובל מחלת תוך-עיני מוגבר, במיעוד ברקית (גלאוקומה) צרת זווית.
 - ילדים מתחת לגיל 12 שנים.

3. איזה גוזגות הנוגאות לשימוש בתרופה:

- אזהרות מיוחדת הנוגאות לשימוש בתרופה:
- לפני הטיפול בקסילו-פוא ספר לרופא אם:
 - אתה סובל ממלחות קרדיאו-סוקולריות חמורות (כגון: מחלת לב כלילית) ולהץ דם גבוה.
 - אתה סובל מפרוסטטה (עمرונית) מוגדרת.
 - אתה סובל מלחץ דם גבוה, מחלת לב, מהפראות מטabolicות כגון: מפעילות יתר של בלוטת התריס וסכרת.
 - אתה סובל מגיידול שפיר של בלוטת יותרת הכליה (אדרנל, פאוכרומוציטומה).
 - עברת עבר ניוטון אף ולוע.
 - אם אתה ריש למזון כלשהו או לנפיחות קרונת ופגעה ברירית האף.
 - שימוש מוגשות או וופרין עלול לגרום לנפיחות קרונת ופגעה ברירית האף.
 - אין להשתמש בתרופה זו על עתיים קרובות או יותר מ-3 ימים רצופים מביי להיעוץ רפואי. יש להמתין מספר ימים לפני שימוש חוזר בתכשיר.
 - אם אתה סובל מ眩ון כרוני, יש להשתמש רק תחת השגחה רפואית בغال הסיכון לפגיעה בברירית האף.

היכולות להעיד על תגובה אלרגית:
• קושי בנשימה או בבליעה.

- נפיחות של הפנים, שפתיים, לשון או גרון.
- גיד חמור בעור המלווה בפריחה אדומה או ביליטות בעור.

תופעות לוואי שכיחות:
• צריבה או יובש של רירית האף, התעשות.

תופעות לוואי שיאן שכיחות:

- תגובה של ריגניות יתר (מחלה המלווה בפריחה, גרד, נפיחות העור והריריות).
- עליה בנסיבות של הרירות לאחר הפסקת השפעת התרופה, דימום באף.

תופעות לוואי נדירות:
• דיפוקות לב, עליה בפעולות הלב (טכיקרדיה), עליה בלחץ הדם.

תופעות לוואי נדירות מאד:
• חולור מנוחה, נזוזי שינה, עיפות (ישוניות, הידמות), כאב ראש, הדיזות (בעיקר בילדים).

תופעות לוואי שלקצוב הלב.
• עופיות (בעיקר בילדים).

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלן, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחנן את התרופה?

מנע הרעלת התרופה זו ולרורopeה אחרת יש לשמר במקומ סגור מחוץ להישג ידים וראיתם של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת התרופה. אל תגרום להקה לא להרואה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחריו ותאריך התפוגה (date. exp.) המופיע על גביה הארץ. המופיע על גביה הארץ מופיע על מגנן המשאבה מספר פעמיים עד שהתמייה משתחררת (בדרכ כל פעמיים). הערכת מוכנה כתעת לשימוש.

תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. **אופן השימוש בתכשיר – הוראות כלליות:**

לפני כל שימוש, הסור את המכסה. קנה את האף בעדינות.

לחץ על מגנן המשאבה מספר פעמיים עד שהתמייה משתחררת (בדרכ כל פעמיים). הערכת מוכנה כתעת לשימוש.

תראש זקוף, החדר את פפיו הספרי לחוץ ולוחץ פעם אחד, תוך כדי שאיפה קלה. רסס פעם אחד בכל נחיר עד 3-5 פעמיים ביום, לפי הצורך.

שיטף את פפיו התריסים במים חמימים, אך הקפד שלא יכנסו מים לתוך הקבקוק. נגב במפעת ניר נקייה וסגור היטב.

אם נטלת בטעות מין גבונה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מוץ של בית-חולים, והבא אליו התופה איתך. הסמינים של מין יתר יכולות להיות מבלבלים: תקופות של עוררות מערכת העצבים המרכזית והמערכת הקרדיא-סקולרית יכולות להפוך לתפקידם של דיכוי מערכת העצבים המרכזית. מינים מסוימים וסקולריות. מינים מסוימים של עוררות מערכת העצבים המרכזית: חרדה, הזימות וסמיות. מינים של דיכוי מערכת העצבים המרכזית: ריריה בחום הגוף, עיפות, שינויו ותדרותם (קומה). התסמים הבאים יכולים להפוך לתפקידם של דיכוי מערכת העצבים המרכזית והמערכת הקרדיא-סקולרית. מינים מסוימים של עוררות מערכת העצבים המרכזית: חרדה, הזימות וסמיות. מינים של דיכוי מערכת העצבים המרכזית: ריריה בחום הגוף, עיפות, שינויו ותדרותם (קומה). חייווון, עור בעקב החליל כתזאה מרידה במעטן, דפקות לב (פלפיטציות), דום לב, בצתת ריאות, דיכי נשימתית ודום נשימה, בחילה והקאות, עליה או ריריה בלחץ הדם, קצב לב לא סדר, קצב לב מהיר, קצב לב איטי.

בכל הרישום וכותבתו: קיומה בע"מ, רח' החורש 33, כפר שמריהו 4691000

היצמן וכותבתו: אורספארם, אסארברוקן, גרמניה

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלתי במשרד הבריאות:
139-83-31417-00

שם הפטשות והקלת הקרייה, עלון זה נוסח בלשון ذכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

אם אתה לוקח, או אם לך לחת לآخرונה, תרופה אחרת כולל תרופות לא' מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. במקרה בו ייחד עם מכבי מונאמיאוקסידין) או תרופה לפחות דם. השימוש בתרופות אלו יחד עם קסילו-פוא עלול להעלות את לחץ הדם כתוצאה מהשפעה על התפקיד הקרדיאו-סוקולרי.

הריון והנקה:

אם אתה בהריון או מניקה יש להיעוץ לרופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה. אין מספיק מידע בנוגע לבטיחות השימוש בתרופה בזמן הרון והנקה, וכן יש להיעוץ לרופא אשר ישקול את התועלות מול הטיסין.

3. כיצד השתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או לרוקח אם אין בעו:

המינון המקבול לילדים מעל גיל 12 שנים ומוגברים בדרך כלל הוא:
לחיצה אחת בכל נחיר עד 3 פעמיים ביום. אין לדסס יותר מ-3 פעמיים ביום בכל נחיר.

אין עבר על המגה המומלצת.

אין לבולו.

תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

לפני כל שימוש ניר נקייה וסגור היטב.

למנעת הפצת הזיהום, אל תשתמש בקבקוק ליותר מדם אחד.

אם נטلت בטעות מין גבונה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד

לרופא או לחדר מוץ של בית-חולים, והבא אליו התופה איתך. הסמינים של מין יתר יכולות להיות מבלבלים: תקופות של עוררות מערכת העצבים המרכזית והמערכת הקרדיא-סקולרית. מינים מסוימים של עוררות מערכת העצבים המרכזית: חרדה, הזימות וסמיות. מינים של דיכוי מערכת העצבים המרכזית: ריריה בחום הגוף, עיפות, שינויו ותדרותם (קומה). התסמים הבאים יכולים להפוך לתפקידם של דיכוי מערכת העצבים המרכזית והמערכת הקרדיא-סקולרית. מינים מסוימים של עוררות מערכת העצבים המרכזית: חרדה, הזימות וסמיות. מינים של דיכוי מערכת העצבים המרכזית: ריריה בחום הגוף, עיפות, שינויו ותדרותם (קומה). חייווון, עור בעקב החליל כתזאה מרידה במעטן, דפקות לב (פלפיטציות), דום לב, בצתת ריאות, דיכי נשימתית ודום נשימה, בחילה והקאות, עליה או ריריה בלחץ הדם, קצב לב לא סדר, קצב לב מהיר, קצב לב איטי.

אם שחתת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, המשך לפי זמני השימוש הרגילם. בשום אופן אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התויה והמנה **בכל פעם** שהינך מטל תרופה. הריכב משקפים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע בתרופה, הייעוץ לרופא או לרוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בקסילו-פוא עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרה רישימת תופעות הלוואוי. יתכן ולא תסבול מכך אהת מהן. הפסק את השימוש בתרופה ונינה מיד לרופא באם הינך חש באחד מהתופעות הבאות,

נסוף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:
Sorbitol, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate dodecahydrate, Disodium edetate, Water for injections.

ללא חומר משמר

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

בקבוק פלסטיק המכיל 15 מ"ל של תמייה צולחה וחסורת צבע.

בכל הרישום וכותבתו: קיומה בע"מ, רח' החורש 33, כפר שמריהו 4691000

היצמן וכותבתו: אורספארם, אסארברוקן, גרמניה

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלתי במשרד הבריאות:
139-83-31417-00

שם הפטשות והקלת הקרייה, עלון זה נוסח בלשון ذכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.