

IMLYGIC (talimogene laherparepvec)

Имлайджик: информация для пациентов и контактирующих с ним близких

Форма и содержание данной брошюры были рассмотрены и одобрены Министерством здравоохранения в июне 2017 года

Данная брошюра содержит важную информацию о безопасности, которую вы должны знать до и во время лечения препаратом Имлайджик. Внимательно изучайте данную информацию до и после каждой процедуры. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или опасения по поводу данного лечения, обратитесь к вашему врачу или медсестре.

Данная брошюра сформулирована в мужском роде, но предназначена для лиц обоих полов.

Что я должен знать об препарате Имлайджик?

- Имлайджик является ослабленной формой вируса простого герпеса 1 типа (HSV-1), который также известен как простой герпес.
- Имлайджик может вызвать опасную для жизни герпетическую инфекцию у людей с ослабленной иммунной системой.
- Имлайджик может нанести вред эмбриону. Если вы беременны или планируете беременность, следует сообщить об этом вашему врачу.
- Во время или после лечения препаратом Имлайджик у вас могут появиться герпетические высыпания или более тяжелая форма герпетической инфекции.
- Вирусом Имлайджик могут заразиться контактирующие с вами близкие (лица, проживающие с вами в одном доме, сиделки, половые партнеры или тот, кто делит с вами постель) в случае, если они напрямую контактируют с физиологическими жидкостями вашего организма или с местами введения инъекции.
- Вы должны поделиться данной информацией с контактирующими с вами близкими, особенно если речь идет о беременной женщине или о человеке с ослабленной иммунной системой.
- Места введения инъекции всегда должны быть закрыты герметичной повязкой из воздухонепроницаемого и водонепроницаемого материала. Накладывайте повязку в соответствии с инструкциями и пояснениями лечащего вас медработника. Если повязка ослабла или упала, немедленно замените её на чистую повязку.

Как проявляются признаки и симптомы герпетической инфекции?

- Боль, жжение или ощущение покалывания в области пузырьков на губах или гениталиях, либо на пальцах или ушах, с образованием струпа (корки) или без.
- Боль в глазу, чувствительность к свету, выделения из глаз, покраснение глаз, слезотечение или нечёткость зрения.
- Слабость в руках или ногах.
- Патологическая сонливость.
- Связанная с головной болью лихорадка.
- Рвота.
- Спутанность сознания/психического состояния.
- Потеря памяти.
- Судороги.

Если вы испытываете эти симптомы в процессе или после применения препарата Имлайджик, немедленно сообщите об это вашему врачу.

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной информацией на оборотной стороне.

Что мне делать, чтобы предотвратить распространение вируса Имлайджик?

- Следует избегать прямого контакта между местами введения инъекции или физиологическими жидкостями и контактирующими с вами близкими:
 - Пациенту следует сократить до минимума риск контакта близких людей с его кровью или физиологическими жидкостями в течение периода лечения препаратом Имлайджик и в течение 30 дней после последней инъекции препаратом Имлайджик. Следует воздержаться от следующих действий:
 - Половой контакт без латексного презерватива.
 - Поцелуи – в случае, если у одного из вас есть открытые ранки на губах или во рту.
 - Совместное пользование столовыми приборами, кухонными принадлежностями и питьевой посудой.
 - Совместное пользование инъекционными иглами, лезвиями для бритья и зубными щетками.
- Не чешите и не касайтесь места введения инъекции.
- Места введения инъекции всегда должны быть закрыты герметичной повязкой из воздухонепроницаемого и водонепроницаемого материала. Если из места введения инъекции есть какие-либо выделения, оставьте повязку на месте до их прекращения. Следует накладывать повязку в соответствии с указаниями лечащего вас медработника. Если повязка ослабла или упала, немедленно замените её на чистую повязку.
- Любые использованные повязки и материалы для санации следует помещать в герметичный полиэтиленовый пакет и выбрасывать в мусорную корзину, чтобы предотвратить прямой контакт других жильцов дома с этими объектами.

Что мне сказать контактирующим со мной близким людям о периоде моего лечения препаратом Имлайджик?

- Следует воздерживаться от прямого контакта с физиологическими жидкостями вашего организма или с местами введения инъекции.
- Перед заменой вашей повязки следует надевать одноразовые перчатки.
- В случае случайного контакта с препаратом Имлайджик, следует промыть пораженный участок проточной водой с мылом и/или обработать дезинфицирующим средством. Если у кого-то из близких появились симптомы и/или признаки герпетической инфекции, следует попросить их обратиться к их лечащему врачу.

Если речь идет о беременной женщине или о человеке с ослабленной иммунной системой, им категорически запрещено менять вам повязку или обрабатывать места введения инъекции.

Если у вас есть вопросы относительно лечения препаратом Имлайджик, поговорите со своим врачом или медсестрой.

Вы можете оказать содействие, сообщив о любом побочном явлении, который у вас, возможно, появится. О побочных явлениях можно сообщать в Министерство здравоохранения при помощи онлайн-формы отчета о побочных явлениях, которую можно найти на главной странице сайта Министерства здравоохранения по адресу www.health.gov.il, или перейдя по ссылке:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formsType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>
Либо сообщить местному дистрибьютору в Medison по электронной почте, отправив сообщение на адрес: pv@medisom.co.il.

При отправке сообщения о побочных явлениях следует всегда указывать номер партии, указанный в карте информации по безопасности пациента.