

IMLYGIC® (talimogene laherparepvec)

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه البطاقة
ومحتواها فُحص ورُخص من قبلها في
حزيران 2017

إيملايغيك بطاقة معلومات الأمان للمُتعالج

تعليمات تخص الطاقم المُعالج: يجب ملء بطاقة جديدة عند إعطاء إيملايغيك للمرة الأولى.
قم بتدوين رقم الدُفعة بهذه البطاقة حول كل إعطاء لـ إيملايغيك.
إذا وجدت حاجة أثناء العلاج، يجب إعطاء بطاقة جديدة للمُتعالج.

إسم المُتعالج: _____

إسم الطبيب الذي وصف إيملايغيك: _____

رقم هاتف الطبيب: _____

إسم المركز / المؤسسة الطبية (إذا أمكن): _____

تاريخ بدء العلاج بـ إيملايغيك: _____

أرقام دُفعات إيملايغيك (تواريخ الإعطاء):

أرقام دُفعات إيملايغيك (تواريخ الإعطاء):	

مُنْتَج المستحضر وصاحب الإمتياز: أمجين يوروي بي . في

معلومات تخص أفراد الطاقم الطبي، غير الذين قاموا بوصف وصفة لـ إيملايغيك:

لمعلومات كاملة حول المستحضر يجب قراءة نشرة الطبيب بتمعن

(https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/mucar_List.asp?p=1&Sr_Type=B_Rishaon&Y_Name=AMGEN EUROPE B.V.&Letter=Amgen&Y_Code=1031&safa=h)

- إذا توفرت لديك أية أسئلة أو إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية حول إستعمال إيملايغيك، الرجاء الإتصال بالموزع المحلي مديسون على رقم الهاتف: 03 - 9250215
- في حال حدوث تلوث هريس، الرجاء الإتصال بالموزع المحلي مديسون على رقم الهاتف: 03 - 9250215
- إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية، فيمكنك طلب كراسة معلومات إيملايغيك الخاصة بالطاقم الطبي من مديسون، الموزع المحلي، على رقم الهاتف: 03 - 9250215

يمكنك المساعدة عن طريق التبليغ عن أي عرض جانبي الذي من الجائز أن يكون قد حدث لك. بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة www.health.gov.il أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formsType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

أو تبليغ الموزع المحلي مديسون: pv@Medison.co.il

معلومات تخص المُتعالجين: يجب أخذ هذه البطاقة معك في أي وقت. يجب عرض هذه البطاقة لأفراد الطاقم الطبي (طبيب، ممرضة) أثناء الإستشارة أو المبيت في المستشفى.

إذا تطور لديك أو لدى أحد الأشخاص القريبين منك تقرح هريس (مثلاً تقرح البرد)، فيجب الإتصال بالطبيب (إسم ورقم الهاتف يظهران في الأعلى). بالإمكان فحص الجرح لتحديد فيما إذا نجم عن إيملايغيك.

إيملايغيك حساس للدواء المضاد للفيروسات أسيكلوفير ويمكن معالجة التلوث المحتمل بهذا الدواء بحسب ما يحدده طبيبك.

بالإمكان تلقي معلومات إضافية من كراسة معلومات إيملايغيك من أجل متعالجين وأشخاص قريبين منك.