

ديسلورتيدين - تريما شراب

- حتى تنتهي من رد فعلك للدواء.
- ٢.٧. معلومات مهمة عن جزء من مركيبات الدواء
ديسلورتيدين، تريما شراب يحتوي على سكروز وسوسبيتول، إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريرات معينة، احصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.
- ٢.٨. الاستعمال لدى الأطفال والمرأهفين
الدواء غير مخصص للأطفال تحت جيل سنة.
٣. كيف تستعمل ديسلورتيدين - تريما شراب؟
يجب دائماً استعمال ديسلورتيدين، تريما شراب وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك أن تتحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.
- الجرعة ومدة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
- الجرعة الموصى بها للأطفال عادةً هي:
اطفال بسن ٥ سنوات: ٥ مللي متر.
اطفال بسن ١١-٦ سنوات: ٥ مللي متر في اليوم.
- الجرعة الموصى بها للبالغين والمرأهفين (من جيل ٢١ سنة وما فوق) عادةً هي:**
١٠ مللي متر في اليوم.
- هذا الدواء مخصوص للتناول عن طريق الفم.
يجب بلع الدواء وبعد ذلك شرب القليل من الماء. يمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام.
لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.
- انتبه:**
بالأدبية السائلة، يجب عليك استعمال كأس قياس، محققة أو قطرة المخصصة جمعها لقياس الكمية الصحيحة من الدواء. استثنى من فضلك بتوصية الصيدلي من أجل الحصول على واء القيايس المناسب. تبنت استعمال ملقة بيضاء لتقياس كمية الدواء. تختلف الملاعق المسغيرة البيضاء بجمها ومن المحمّل أن لا تصل إلى كمية الدواء الصحيحة.
- الأغطية المقاومة للفتح من قبل الأطفال قد قللت بصورة كبيرة عدد حالات التسمم الناجمة عن الأدوية في كل سنة. إذا كنت تواجه صعوبة في فتح العبوة، بإمكانك التوجه إلى الصيدلي للحصول على مساعدة.
- يخصص الدواء للعلاج، ويحذّر طبيبك ما هو نوع رنجح الأنف التحسسي الذي تعاني منه وأيضاً سيحدّدكم من الوقت عليك تناول ديسلورتيدين - تريما شراب.
- إذا كان رشحك التحسسي يظهر على قفرات (أعراض تظهر لمدة أقل من ٤ أيام في الأسبوع أو لمدة أقل من ٤ أسابيع)، سيسوّي لك طبيبك برنامج علاج المتعلق بتقدّير تاريخ المرض لديك.
- إذا كان رشحك التحسسي متواصل (أعراض تظهر لمدة ٤ أيام أو أكثر في الأسبوع ولمرة أكثر من ٤ أسابيع)، قد يوصي لك طبيبك بعلاج لفترات أطول. فيما يخص الشرى (Urticaria)، مدة العلاج قد تختلف من مريض لأخر ولذلك يجب اتباع تعليمات الطبيب.
- إذا تناولت ديسلورتيدين - تريما شراب أكثر مما كنت بحاجة إليه يجب تناول ديسلورتيدين - تريما شراب فقط كما وصف لأجلك. لا يتوقع حدوث مشاكل جدية إذا تناولت جرعة زائدة عن طريق الخطأ.
- إذا تناولت ديسلورتيدين - تريما شراب أكثر مما قيل لك، أخبر على الفور طبيبك أو الصيدلي بذلك.
- إذا أفرطت في تناول الجرعة، أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.
- إذا نسيت تناول ديسلورتيدين - تريما شراب.
- إذا نسيت تناول جرعتك في الوقت المطلوب، يجب تناولها في أسرع وقت ممكن وعندما الرجوع لجدول مواعيد التناول المعتاد. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.
- عليك إكمال العلاج بكماله كما أوصي من قبل الطبيب.
- حتى إذا طرأ تحسّن على وضعك الصحي، لا يجوز إيقاف العلاج بهذا الدواء دون استشارة الطبيب.
- المادة الفعالة وتركيزها: كل ١ مللي يحتوي على: ديسلوراتادين 0.5 mg، مللي.
- للقائمة المواد غير الفعالة، انظر البند ٦.١ "على ماذا يحتوي ديسلورتيدين - تريما شراب؟"
- انظر أيضاً البند ٦.٢ "معلومات مهمة عن جزء من مركيبات ديسلورتيدين - تريما شراب".
- اقرأ النشرة بامان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.
- إذا كانت لديك أسلطة إضافية، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
- هذا الدواء يوصف لأجلك. لا تعلّم إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى لو بدا أن وضعهم الطبي مماثل.
- ديسلورتيدين - تريما شراب لا يسبب التاعس. الدواء غير مخصوص للأطفال تحت جيل سنة.
١. ما هو ديسلورتيدين - تريما شراب ولائي غرض يستعمل؟
هذا الدواء مخصوص للتخفيف من الأعراض المتعلقة برشح الأنف التحسسي (التهاب قنوات الأنف الناجم عن الحساسية، على سبيل المثال، حمى القش أو حساسية لعنث الغبار) والأعراض المتعلقة بالتشريح المزمن مجهول السبب ظاهرة جلدية تاجة عن الحساسية لدى البالغين، لدى المرأةهفين، ولدى الأطفال من جيل سنة وما فوق.
- الاعتراض المتعلقة برشح الأنف التحسسي تتضمّن العطس، انتفاخ أو حكة في الأنف، حكة في الحنك، حكة في الميدين، احمرار أو دمع في الميدين.
- الاعتراض المتعلقة بالتشريح المزمن مجهول السبب تشمل حكة وشتير.
- يستمر التخفيف بهذه الأعراض ليوم كامل ويساعدك على العودة لنشاطاتك اليومية الاعتيادية وتلائمك المعتاد.
- الفصيلة العلاجية: مثاهضات مستقبلة H، - مضادات الهستامين.**
٢. قبل استعمال ديسلورتيدين - تريما شراب
٢.١. لا تستعمل ديسلورتيدين - تريما شراب إذا:
- ٢.٢. تؤخذ لديك حساسية (حساسية مفرطة) لديسلورتيدين أو لأي واحد من المركيبات الأخرى في ديسلورتيدين - تريما شراب أو الورديتين (لقائمة المواد غير الفعالة، انظر البند ٦.١).
- ٢.٣. تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال ديسلورتيدين - تريما شراب
قبيل بدء العلاج بديسلورتيدين - تريما شراب، أخير طبيب إذا:
كنت تعاني من حمل في وظائف الكلى.
كان لديك تاريخ طبي أو عائلي لاختلالات.
- ٢.٤. رود فعل بين الأدوية بين ديسلورتيدين - تريما شراب وبين أي دوائية أخرى غير معروفة.
رود الفعل بين الأدوية، فأخير طبيب أو الصيدلي بذلك: تريما شراب وبين أي دوائية بدون وصفة طبية
- ٢.٥. تناول ديسلورتيدين - تريما شراب مع طعام، شراب ومحول
يمكن تناول ديسلورتيدين - تريما شراب مع أو بدون وجبة.
يجب الحذر عند تناول ديسلورتيدين - تريما شراب مع المحول.
- ٢.٦. الحمل، الإرضاع والخصوبة
إذا كنت ماماً أو مرضعة، تعتقدين أنك قد تكوني حامل أو تخططين للدخول في الحمل، استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.
- تناول ديسلورتيدين - تريما شراب غير موصى به إذا كنت حاماً أو مرضعة.
الخصوبة لا توجد معلومات بخصوص خصوبة الرجل/ المرأة.
- ٢.٧. السيقة واستعمال الآلات
في الجرعة الموصى بها، من غير المتوقع لديسلورتيدين - تريما شراب أن يؤثر على قدرتك على السيقة أو استعمال الآلات. بالرغم من أن معظم الأشخاص لا يشعرون بالعارض، يوصي بعدم ممارسة النشاطات التي تتطلب اليقظة، كسيقة السيارات أو تشغيل الآلات.

