

כיצד נראית התורופה ומהו תוכן האריזה:

כל כמוסה של קודיביס בינוי מגוף ורוד אוטום וראש חום בליסטרים של 10 כמוסות. כל אריזה מכילה 8 או 10 כמוסות. יתכן ולא כל גדי הארץ ישוקן.

הירץ/ בעל הרישום וכותבות:

כט תעשיית כימיות בע"מ, קריית מלאכי.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 06.2015

מספר רישום התורופה בפנקס התורופות הממלכתי: 132-46-23488-00

שם הפשטו והקלות הקרייה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התורופה מיועדת לבני שני המינים.

نشرة טبية למסתהוק במوجب אונטומת הסידילדה (מסחרות) ١٩٨٦

הذادواء מلزم בوصفة טبيب

קודיביס קבוסولات

כל קבוסולה تحتוי על:

קודיאין 30 mg

fenitrotoleukosmin 10 mg

למרקרים הגורר פגלה רاجע البنד 6.

اقرأ הנשלה תנתנוו حت נהייה כל אستخدام הדוא.

הזה נשלה תנתנוו עז מعلومات מוגזה עז הדוא. اذا كانت لديك אסנלה אضافי, תتوجيه עז הטبيب או הסידילי.

הזהدواء قد כוחך לך. לא תעתה עז אחרים. قد يكون מضرם להם حتى אם ידא לך וצעהם הסחי משבה.

הזהدواء גורר מخصوص للأطفال دون عمر 12 سنة.

ודויה מזען העתונה מזען המمكن את תודוי עז התעכטخصوصה באסטعمال למדי המגיד ויאפשר לךוונן ذات אמתיה המלעכערת עזיהם (מן המمكن אסאה אסטטודאה) וاجرעה המפרקת. גראעה המפרקת قد תודוי עז מוסףיות בנטונן או حت המות.قبل אסטعمال הדואוتأكد מזען אשם הדוא, גראעה המנסאס. ווירטה תנותול הדוא, פורה התנאות, האתגר גאנטי ומלחתן המתקנה.ילאמקן יוזגד מعلومات אחרי גורר מזרען התעכט ואסמן על הרابט:
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HDTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_ar.pdf

1. لم אען עז הדוא? הדוא מخصوص לתخفיף הסعال.

الفصيلة العلاجية:

קודיאין הוא מן מגוועה האופייניות עז תستخدم לkeys הסعال.

fenitrotoleukosmin הוא מן מגוועה مضادات האיסטאמינים.

2. قبل אستخدام הדוא:

☒ לא יجوز אסטعمال הדוא إذا:

לדייך תחסס (حساسיה) לאחד הדוא פגלה (קודיאין, fenitrotoleukosmin),

مواد אחריו מוגוועה האופייניות עז כל ו احد ממרקרים

הإضافי עז בוחוי עלייה הדוא (راجع البنד 6).

• אנט הحامل או מرضעה



symptoms include: Causing pain in the right side of the abdomen, particularly after eating a meal, which may spread towards your right shoulder. Palpitations, Increased intracranial pressure, Abnormally high levels of glucose in the blood (hyperglycemia), Inflammation of the pancreas (pancreatitis), Feeling unwell, Tiredness, Decrease in body temperature (hypothermia), High fever, Enlarged spleen or swollen/enlarged lymph nodes, Anorexia, Weight gain, Uncontrolled muscle movements, Restlessness, Muscle rigidity, Faster or slower pulse, Skin rash, Itching, (erythema). Reduced sexual drive or impotence, following long term use of the medicine, Blood cell diseases, Decreased blood pressure, Euphoria and Irritability, Difficulties breathing.

If any side effect worsens, or if you suffer from a side effect not mentioned in the leaflet, you should consult your physician.

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?

• **Avoid poisoning:** This medicine and any other medicine should be kept in a safe place out of the reach of children and/or infants in order to avoid poisoning. Do not induce vomiting without an explicit instruction from your physician.

• Do not use the medicine after the expiration date (exp. date) that appears on the package. The expiry date refers to the last day of that month.

• Store at a temperature below 25°C.

• Store in the original package.

6. FURTHER INFORMATION:

In addition to the active ingredients, the medicine also contains: Polyethylene Glycol 10,000, Lactose, Gelatin, Titanium Dioxide, Red Iron Oxide, Black Iron Oxide, Yellow Iron Oxide, Erythrosin. What does the medicine look like and what are the contents of the package:

Each capsule is composed of an opaque pink body and opaque brown head, and contains brown powder. Each pack contains blisters of 10 capsules. Quantity of capsules per pack: 8 or 10 capsules. Not all pack sizes may be marketed.

Manufacturer/ Registration Holder and address:

CTS Chemical Industries Ltd., Kiryat Malachi

This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health on: 06/2015
Registration number of the medicine in the National Drug Registry of the Ministry of Health: 132-46-23488-00

يجب استعمال الدواء حسب تعليمات طبيبك.

لا تتناول الدواء في العتمة، اغتصب الملصق والجرعة في كل مرة تتناول

بنك، ادوية توثر على الجهاز العصبي المركزي (مثل: ادوية التهيئة للنوم)، اذن تناول الدواء في تمام فجر، الباكتوسين، لوبيرجول، (لوبي)، امدادات الالكتران، نورز، سيسكلاتين، معققات مواعين، اوسيدار، (الملاع) الاكثفات او قليل

مور، سيسون، ادوية تناول الدواء اثناء النوم، ادوية لعلاج الغثيان والقيء، متفاوت، متوكيل، ادوية لعلاج المرض، ادوية بروبرون.

سيمندين لعلاج تهيجات المعدة واصواته، سماعات الهضم، ريتونيك ادوية لعلاج

الايدن، ادوية تجحير، خاصة للتخفيف العام، صوصيون وكبسولات لعلاج

القلب الابولاية التي تعيق اداء الطبيب (جراحات) وبعد التهوية الطبية

متلزموين.

انوبي، ادوية لعلاج الامهات مثل: لوبيرجول، ادوية لعلاج الغثيان

والقيء، متفاوت، متوكيل، ادوية لعلاج المرض، ادوية بروبرون.

سيمندين لعلاج تهيجات المعدة واصواته، سماعات الهضم، ريتونيك ادوية لعلاج

الايدن، ادوية تجحير، خاصة للتخفيف العام، صوصيون وكبسولات لعلاج

القلب الابولاية التي تعيق اداء الطبيب (جراحات) وبعد التهوية الطبية

متلزموين.

استخدام الدواء والطعام يجب تناول الدواء مع الطعام.

استخدام الدواء واستهلاكه الكحولي لا يجوز شرب النبيذ او

المشروبات الكحولية، اذن تناول الدواء بهذه الاماكن قد تزيد من

الاعراض الجانبية في الجهاز العصبي المركزي مثل: تسلق.

الحمل والرضاعة يجب استخدام الدواء اذا احال او مر ضعف.

القيادة واستخدام الالات ان استعمل هذا الدواء قد يضعف من بقائه

ويؤدي الى اعساد، بللبة، رؤية مشوشة او مزدوجة، اذ يجب اخذ

اثنان ادوية المركبات، تشغل مكباتن خطيرة ومارسة رياضات

اخري تناول الاطفال، خصوصا اطفال، يجب تجنبه من ركوب

الدراجات، اللعب بمقدار من حرارة المرور واماكنه.

التخفين اذا كنت مدمناً - يجب ابلاغ الطبيب بذلك قبل قيل بدء العلاج

بهذا الامر.

معلومات مهمة حول جزء من مكونات الدواء:

كل كبسولة تحتوى على حوالي 16 مل من الكليوز. لا يجب استخدامه

اذا اتيحت حساسية على الكليوز.

3. كيفية استخدام الدواء؟

يجب اذن استخدام الدواء بحسب تعليمات طبيبك.

عليك ان تتحقق من طبيبك او الصيدلي اذا كنت غير متأكد.

الجرعة وطريقة العلاج يتم تحديدهما من قبل طبيبك فقط، الجرعة

المقدورة على الدواء هي:

بالبالغين والادلاف عمر 12 سنة: كبسولة واحدة في الصباح والمساء

يُ suction بشرب المياه بعد تناول الدواء.

هذا الدواء غير مخصوص للرضاعة والاطفال دون عمر 12 سنة.

اذا لم يختزن وضنك خلال 3 أيام يجب ايقاف الاستخدام والوجه الى

الطبب.

يجب تناول الدواء مع الماء.

يجعل الاقراص كلما من الماء.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

لا يجوز فتح وتر حشو الكبسولات.

في حال تناول جرعة زائدة او اذا اقام ولد ببلع الدواء عن طريق الخطأ،

تجه على الفور الى الطبيب او الى عرقه الطوارئ في المستشفى

وحضار معلم الدواء في الوقت المعني، لا يجوز تناول جرعة مزدوجة.

تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي وفقاً لبيانات طبيبك.

كيف يبدو الدواء وما هو محتواه العلية:

كل كبسولة من كرتين تتألف من جسم ذهبي ومحكم ورأسي ينبع من محكم، وكتوني على بوردي باللون البنفسجي، كل عليه تخطي على بليسترات من 10 كبسولات، كمية الكبسولات في العلبة: 8 او 10 كبسولات.

قد لا تكون جميع احجام العلب متساوية، المنتج صاحب المسؤولية عن هذه الكبسولات.

تكتس المنتجات الصناعية الكيميائية، كريات ملحوظة، فوضخت هذه الشفارة وخرست من قبل وزارة الصحة بتاريخ: 06/2015.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 132-46-23488-00

تمت صياغة هذه الشفارة بلغة المذكر بحسب التبسيط وتسيير القراءة، لكن الدواء مخصص للجنسيين على دواء.

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنب اي تسمم، يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن تناول ابني الاطفال او الرضع وذلة تلقائي اصلاحاته بالقصم، لاستباب التقويم من دون تعليمات واضحة من الطبيب.

لا يجوز استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date).

الموزن على الجهة الخلفية من العبوة، تاريخ انتهاء الصلاحية يشير الى اليوم الاخير من الشهر ذاته.

يُحفظ درجة حرارة أقل من 25°C.

يجب تخزينه في الالية الصالحة.

6. معلومات اضافية:

بالإضافة الى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Polyethylene Glycol 10,000, Lactose, Gelatin, Titanium Dioxide, Red Iron Oxide, Black Iron Oxide, Yellow Iron Oxide, Erythrosin.