

זובירקס ג'ניטל. קרם

מכיל: אציקלוביר 5% w/w. Aciclovir

רשימת הרכיבים הנוספים מפורטת בסעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

זובירקס ג'ניטל מכיל תרופה הנקראת אציקלוביר. הוא משמש לטיפול בזיהומים באברי המין הנגרמים על ידי נגיף הרפס סימפלקס. הוא פועל על ידי עצירת הגדילה או קטילה של נגיפים הגורמים להרפס באברי המין.

קבוצה תרפויטית

אנטי-וירלי.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאציקלוביר, ואלאציקלוביר, פרופילן גליקול או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).
- אם אינך בטוח, פנה לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש בזובירקס ג'ניטל.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

ספר לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש בזובירקס ג'ניטל אם:

- יש לך מצב שבו מערכת החיסון שלך עובדת פחות טוב והגוף שלך מסוגל פחות להלחם בזיהומים (לדוגמה אם אתה נשא לנגיף ה-HIV או חולה באיידס או אם עברת השתלת מח עצם).
- אם אינך בטוח, פנה לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש בזובירקס ג'ניטל.
- זובירקס ג'ניטל אינו מיועד לשימוש בתוך הפה, העיניים או הנרתיק. זובירקס ג'ניטל עלול לגרום לגירוי בעור.
- אם אינך בטוח, פנה לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש בזובירקס ג'ניטל.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם, תרופות צמחיות ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה

אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

מריחת הקרם

- זובירקס ג'ניטל אינו מיועד לשימוש בתוך הפה, העיניים או הנרתיק שלך.
- אל תערבב את זובירקס ג'ניטל עם שום דבר אחר לפני שאתה משתמש בו, אפילו לא מים.
- תמיד רחץ את ידיך לפני ואחרי שאתה משתמש בקרם.
- זובירקס ג'ניטל נרשם לטיפול בהרפס באברי המין, יש להימנע מקיום יחסי מין בזמן הטיפול כל עוד לא נרפאו הפצעים לחלוטין, מכיוון שהרפס באברי המין מועבר בעת מגע מיני.
- המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל הוא:

מבוגרים וילדים

- מרח שכבה דקה של קרם על האזור הנגוע חמש פעמים ביום.
- עליך לעשות מרווח של ארבע שעות בין כל מריחה של זובירקס ג'ניטל. השעות המוצעות הן: 07:00, 11:00, 15:00, 19:00 ו-23:00.
- אם הפצע שלך לא נרפא אחרי 5 ימים, אתה יכול להשתמש בקרם למשך 5 ימים נוספים.
- אם האזור הנגוע עדיין לא נרפא לאחר זאת, הפסק להשתמש בקרם ופנה לרופא שלך.

אין לעבור על המנה המומלצת

אם השתמשת בטעות במינון גבוה יותר

ספר לרופא או לרוקח שלך אם אתה משתמש ביותר מדי זובירקס ג'ניטל. זובירקס ג'ניטל מיועד לשימוש על העור, אם בלעת ממנו פנה לרופא או לרוקח שלך.

אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

אם שכחת להשתמש בתרופה

- אם שכחת להשתמש בזובירקס ג'ניטל, השתמש בו ברגע שנזכרת. אולם, אם הזמן סמוך למועד המנה הבאה שלך, דלג על המנה שהוחמזה.
- אין להשתמש במנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.
- יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בזובירקס ג'ניטל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תגובות אלרגיות (מופיעות בפחות מ-1 מתוך 10,000 אנשים)

אם יש לך תגובה אלרגית, **הפסק להשתמש בזובירקס ג'ניטל ופנה מיד לרופא**. הסימנים יכולים לכלול:

- פריחה, גרד או חרלת (גבשושיות מגרדות) על העור שלך
- נפיחות של פנים, שפתיים, לשון או חלקים אחרים בגוף שלך
- קוצר נשימה, צפצופים או קושי לנשום
- חום בלתי מוסבר ותחושת עילפון, במיוחד בעת מעבר לעמידה.

תופעות לוואי נוספות

לא שכיחות (מופיעות בפחות מ-1 מתוך 100 אנשים)

- תחושת צריבה או עקצוץ לאחר מריחת הקרם שנעלמת
- התיבשות קלה או קילוף של העור שלך
- גרד.

נדירות (מופיעות בפחות מ-1 מתוך 1,000 אנשים)

- אדמומיות העור שלך
- פריחה בעור.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. יש לאחסן מתחת ל-25°C.
- לאחר הפתיחה הראשונה, ניתן להשתמש בתכשיר עד 10 ימים, ולא יאוחר מתאריך התפוגה.
- אין לאחסן במקרר.

6. מידע נוסף

• **נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם -**

Propylene glycol, white soft paraffin, cetostearyl alcohol, liquid paraffin, glycerol monostearate and polyoxyethylene stearate, poloxamer 407, dimeticone 20, sodium laurilsulfate, purified water.

• **כיצד נראית התרופה ותוכן האריזה -**

כל קרטון מכיל שפופרת 10 ג' של זובירקס ג'ניטל. השפופרת בעלת פקק מתברג ומכילה קרם לבן חלק.

• **בעל הרישום:** גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בול 25, פתח תקוה.

• **יצרן:** גלקסו אופריישנס (אנגליה) בע"מ, ברנרד קאסל, אנגליה.

• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בדצמבר 2014.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 046-50-23031

• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK.

©2018 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.