

جارديانس® ٢٥ ملغ
أقراص مغلفة

كل قرص من جارديانس ٢٥ ملغ
يحتوي على ٢٥ ملغ إيمپاجليفلوزين
(Empagliflozin 25 mg).
كل قرص من جارديانس ٢٥ ملغ
يحتوي أيضًا على ١١٣ ملغ لاكتوز.

جارديانس® ١٠ ملغ
أقراص مغلفة

كل قرص من جارديانس ١٠ ملغ
يحتوي على ١٠ ملغ إيمپاجليفلوزين
(Empagliflozin 10 mg).
كل قرص من جارديانس ١٠ ملغ
يحتوي أيضًا على ١٦٢,٥ ملغ لاكتوز.

مواد غير فعّالة ومُسببة للحساسية في المستحضر – راجع البند ٢ "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند ٦.
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استخدام الدواء. هذه النشرة تحتوي على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجّه الى الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. قد يكون مضرًا لهم حتى إن بدا لك مرضهم مشابه لمرضك.

١. لم أعد هذا الدواء؟

جارديانس مخصص:

- لتحسين التحكم بمستوى السكر في الدم لدى البالغين ذوي السكري من النوع ٢ بالإضافة إلى الحمية والنشاط الجسدي.
- لتقليل خطر الموت من مرض قلب وأوعية دموية لدى المرضى البالغين الذين يعانون من السكري من النوع ٢ ومن مرض قلب وأوعية دموية موجود.

جارديانس غير مخصص لعلاج السكري من النوع ١ أو الحمض الكيتوني السكري (diabetic ketoacidosis).
الفصيلة العلاجية: معيقات (SGLT2 (sodium-glucose co-transporter 2).

٢. قبل استخدام الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسية أو إذا اختبرت في الماضي حساسية خطيرة للمادة الفعّالة إيمپاجليفلوزين أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (لقائمة المواد غير الفعّالة أنظر البند ٦ – معلومات إضافية).
- كنت تعاني من قصور كلويّ خطير، مرض كلّي مميت أو كنت تخضع لعلاجات غسيل كلّي.

تحذيرات خاصة مرتبطة باستخدام الدواء

قبل العلاج بجارديانس، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من مشكلة في الكلى.
- كنت تعاني من مشاكل في الكبد.
- عانيت في الماضي من عداوى في المسالك البولية أو من مشاكل خلال التبول.

كذلك، قبل العلاج بجارديانس أو خلال العلاج بجارديانس، أخبر الطبيب إذا:

- كنت على وشك الخضوع لعملية جراحية.
- كنت تنكح، لوبلا يراجم في في وودع، ماكزلا لثم داحضرم ن م ي ناعته تنقياً، تعاني من إسهال أو إذا كان لديك سخونة أو إذا لم تكن قادرًا على تناول الطعام أو الشرب نتيجة مرض، عملية جراحية أو تغيير في حميتك الغذائية. هذه الحالات ممكن أن تؤدي إلى جفاف. من المحتمل أن يطلب منك طبيبك التوقف عن تناول جارديانس حتى شفائك من أجل منع حدوث جفاف. ممكن أن يُسبب الجفاف إلى ضرر في الكلى.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في البنكرياس، بما في ذلك التهاب البنكرياس أو عملية جراحية في البنكرياس.

- كنت معتادًا على شرب الكحول في أحيان متقاربة، أو شرب الكثير من الكحول خلال فترة زمنية قصيرة.
- أهولانتت ي تلاء نيلوسذلا إاة عر جرد داد ص يلقته ثدحو نيلوسذلا إاب هتاذ تقولاب ج لاعتت تنك.

قد تُشكّل هذه الحالات عوامل خطر لتطوّر حُماض كيتونيّ سكريّ (diabetic Ketoacidosis)، أنظر بند الأعراض الجانبية.

الأطفال والمراهقين

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين تحت جيل ١٨.

فحص الجلوكوز في البول

طريقة عمل الدواء تؤدي الى نتيجة إيجابية في فحص الجلوكوز في البول.

جفاف

جارديانس قد يؤدي الى جفاف (فقدان سوائل وأملاح الجسم) لدى بعض المتعالجين. الجفاف قد يسبب لك دوخة، إغماء أو ضعف، خاصة لدى تغيير الوضعية من الجلوس / النوم إلى الوقوف.

الجفاف قد يزيد من خطر انخفاض ضغط الدم. يجب الالتزام باستهلاك كمية كافية من السوائل خلال اليوم.

إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم، يجب إبلاغ الطبيب.

احتمال الجفاف أكبر إذا كنت:

- تعاني من ضغط دم منخفض.
- تتناول أدوية لتخفيض ضغط الدم لديك، يشمل أدوية مدرّة للبول.
- تلتزم بنظام غذائي قليل الصوديوم أو الملح.
- تعاني من مشاكل في الكلية.
- عمرك ٦٥ وما فوق.

مُتعالجون ذوي اضطراب في وظائف الكلى

خلال فترة العلاج بجارديانس، من المحبذ الخضوع لفحوصات دورية وفي فترات متقاربة لوظائف الكلى. إذا كان لديك اختلال في وظائف الكلى، قد يطلب منك الطبيب وقف استخدام جارديانس.

يوصى بإجراء تقييم لوظائف الكلى قبل بدء العلاج بجارديانس وبصورة دورية خلال فترة العلاج بجارديانس، خاصة لدى المرضى كبار السن أو المرضى الذين يعانون من خلل في أداء وظائف الكلى.

عدوى فطرية في المهبل

النساء اللواتي يحصلن على علاج بجارديانس من المحتمل أن يعانين من عدوى فطرية في المهبل. الأعراض لذلك هي:

- رائحة من المهبل.
- إفراز أبيض أو أصفر.
- حكة في المهبل.

عدوى فطرية في العضو الذكري

الرجال الذين يحصلون على علاج بجارديانس من المحتمل أن يعانون من فطريات على الجلد المحيط بالعضو الذكري. الأعراض لذلك هي:

- احمرار، حكة أو انتفاخ في العضو الذكري.
- طفح على العضو الذكري.
- إفرازات ذات رائحة كريهة من العضو الذكري.
- ألم في الجلد المحيط بالعضو الذكري.

فحوص ومتابعة

- الحماية والنشاط الجسدي يمكنهما مساعدة جسمك على استخدام سكر الدم بشكل أفضل. من المهم المحافظة على حمية وبرنامج نشاط جسدي الموصى بها من قبل الطبيب خلال العلاج بجارديانس.
 - كما هو الحال في العلاجات الإضافية لمرض السكري، يُنصح بمتابعة الاستجابة للعلاج بشكل دوري. قد ينصح الطبيب بعلاج بأدوية إضافية من أجل تحقيق الأهداف من علاج مرضك.
 - يوصى بإجراء تقييم لوظائف الكلى قبل بدء العلاج بجارديانس وبصورة دورية خلال فترة العلاج بجارديانس، خاصة لدى المتعالمين كبار السن أو المتعالمين الذين يعانون من اضطراب في أداء وظائف الكلى (أنظر البند ٢ - "متعالمون ذوي اضطراب في وظائف الكلى").
 - الساق السكري: من المهم المواظبة على إجراء فحص دوريّ لقدميك بصورة دائمة بحسب توصيات مُعالجك الطبيّ.
- إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، يشمل ذلك أدوية بدون وصفة والمكملات الغذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:
- دواء يستخدم لإفراز السوائل من الجسم (مدرّ للبول). الاستخدام المدمج مع جارديانس قد يؤدي الى ارتفاع حجم البول ووتيرة الإفراغ، مما يزيد من خطر الجفاف.
 - الأعراض المحتملة لفقدان الكثير من سوائل الجسم تظهر في البند ٤ - الأعراض الجانبية.
 - أدوية أخرى لتخفيض كمية السكر في الدم (مثل الإنسولين أو سولفونيلورييا). الاستخدام المدمج مع جارديانس قد يزيد من خطر مستويات السكر المنخفضة في الدم (هيبوجليكميا).
- لذلك، لدى الاستخدام المدمج مع جارديانس، قد تكون هنالك حاجة الى جرعة أقل من الأدوية لتخفيف كمية السكر في الدم (مثل الإنسولين أو سولفونيلورييا) من أجل تقليص خطر مستوى السكر المنخفض في الدم.

الحمل والإرضاع

- إذا كنت حاملاً، تعتقدن أنك حامل، تخططين الحمل أو مرضعة، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء. لا يجوز استخدام جارديانس إذا كنت حاملاً. قد يُسبب جارديانس ضرراً جنينياً. إذا حملت أثناء فترة العلاج بجارديانس، أخبري طبيبك بذلك بأسرع وقت ممكن. استشيري طبيبك بالنسبة للطريقة الأفضل لموازنة مستويات السكر في الدم خلال الحمل. لا يجوز استخدام جارديانس إذا كنت مرضعة. من الممكن أن ينتقل جارديانس إلى حليب الأم عندك وأن يُسبب ضرراً لطفلك. استشيري طبيبك بالنسبة للطريقة الأفضل لإطعام طفلك خلال العلاج بجارديانس.

السياقة واستخدام الماكينات

- جارديانس له تأثير خفيف على قدرتك على السياقة وتشغيل ماكينات.
- تناول هذا الدواء بالدمج مع أدوية تُدعى سولفونيلورييا أو الإنسولين قد يؤدي الى مستويات سكر منخفضة في الدم (هيبوجليكميا)، مما يؤدي الى أعراض مثل الارتجاف، التمرق وتغييرات في النظر، وقد يؤثر على قدرتك على السياقة وتشغيل ماكينات.
- تُمنع السياقة أو استخدام أي أداة أو ماكينة، إذا كنت تعاني من دوخة خلال العلاج بجارديانس.

معلومات مهمة حول قسم من مكونات الدواء

- جارديانس يحتوي على لاكتوز (سكر الحليب). إذا أخبرك الطبيب أنك حساس لأنواع معينة من السكر، توجّه الى الطبيب قبل استخدام الدواء.

٣. كيف تستخدم الدواء؟

- يجب دائماً استخدام الدواء بحسب تعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.
- الجرعة وطريقة العلاج يتم تحديدهما من قبل الطبيب فقط. يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.
- الجرعة البدئية المقبولة هي قرص جارديانس ١٠ ملغ مرة في اليوم. الطبيب سيقرّر إذا كان يجب رفع الجرعة الى جارديانس ٢٥ ملغ.
 - سيقوم الطبيب بملاءمة جرعتك. يُمنع تغيير الجرعة من دون أمر من الطبيب.

طريقة الاستخدام

- يجب بلع القرص بأكمله مع الماء. لا توجد معلومات حول سحق/شطر/مضغ الأقراص.
- يمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام.
- يمكن تناول الدواء مرة في اليوم في ساعات الصباح، حاول تناول الدواء في نفس الساعة من اليوم. هذا الأمر سيساعدك على تذكر تناول الدواء.

عندما يتواجد جسمك تحت الضغط، مثل الحرارة، الصدمة (مثلاً، حادث سير)، عدوى أو جراحة، قد يتغير العلاج الدوائي. قم باستشارة الطبيب على الفور إذا انطبق عليك إحدى هذه الحالات واتبع تعليمات الطبيب.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أكبر

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه على الفور الى الطبيب أو الى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

تناول الجرعة فور تذكرك والجرعة ما بعدها في الوقت الاعتيادي. إذا حان وقت تناول الجرعة التالية، تجاوز الجرعة المنسية وتناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي. لا تتناول جرعة مزدوجة من أجل تعويض الجرعة المنسية. يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب. حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب. إذا توقفت عن تناول الدواء، قد ترتفع مستويات السكر في دمك.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! افحص المصق على العبوة والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استخدام الدواء، راجع الطبيب أو الصيدلي.

٤. أعراض جانبية

كما هو الحال في كل دواء، استخدام جارديانس قد يؤدي الى أعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي منها.

معلومات مهمة حول جارديانس:

يجب التوجه الى الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تعاني من إحدى الأعراض الجانبية الخطيرة التالية:

• حمض كيتوني (Ketoacidosis) – مستويات مرتفعة من الكيتونات في الدم أو في البول):

ظهر الحمض الكيتوني لدى الأشخاص الذين يعانون من السكري من نوع ١ أو السكري من نوع ٢ خلال العلاج بجارديانس. الحمض الكيتوني ممكن أن يكون حالة تشكل خطراً على الحياة وتحتاج إلى علاج في المستشفى. الحمض الكيتوني ممكن أن يظهر خلال العلاج بجارديانس حتى إذا كانت مستويات السكر في الدم أقل من - ٢٥٠ ملغ/ديسيلتر. توقف عن استخدام جارديانس وتوجه فوراً إلى طبيبك إذا شعرت بأحد الأعراض التالية: غثيان، تقيؤات، أوجاع بطن، إرهاق وصعوبة في التنفس.

إذا شعرت بأحد الأعراض المذكورة أعلاه خلال العلاج بجارديانس، افحص مستوى الكيتونات في البول في حال كان ذلك ممكناً، حتى إذا كانت مستويات السكر في الدم لديك أقل من ٢٥٠ ملغ/ديسيلتر.

• عدوى خطيرة في مجاري البول:

عدوى خطيرة في مجاري البول التي ممكن أن تؤدي إلى دخول المستشفى، حدثت لأشخاص استخدموا جارديانس. بلغ طبيبك إذا كانت لديك علامات أو أعراض عدوى في المجاري البولية مثل حرقة عند التبول، تردد وحاجة ملحّة في التبول، ألم في حوض الفخذين، أو دم في البول. أحياناً ممكن أن يعاني الأشخاص أيضاً من سخونة، ألم ظهر، حالات غثيان أو تقيؤات.

• **مشاكل في الكلى.** فشل كلوي فجائي حصل للمتعالجين الذين استخدموا جارديانس. توجه للطبيب فوراً إذا كنت تقلل في الطعام أو الشرب نتيجة مرض أو إذا كنت غير قادر على تناول الأكل أو إذا بدأت تفقد السوائل نتيجة لتقيؤات، حالات إسهال أو مكوث طويل في الشمس.

• **هيبوجليكميا (مستوى سكر منخفض في الدم).** إذا كنت تتناول جارديانس سوياً مع دواء آخر الذي ممكن أن يتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم، مثل الإنسولين أو سولفونيلوريا، احتمال الخطر لديك بأن تعاني من مستويات سكر منخفضة في الدم هو

أعلى. راجع البند ٢ - "ردود فعل بين الأدوية" لمعلومات إضافية.

علامات ممكنة لمستوى سكر منخفض في الدم: عصبية، نعاس، دوار، ارتجاف، تعرق، ارتباك، وتيرة قلب سريعة، جوع متزايد، ألم رأس، ضعف.

الطبيب سيرشك حول كيفية علاج مستويات السكر المنخفضة في الدم وما العمل إذا ظهر أي من هذه الأعراض أعلاه. إذا ظهرت أعراض مستوى سكر منخفض في الدم، يجب تناول أقراص جلوكوز، وجبة خفيفة غنية بالسكر أو تناول عصير فاكهة. قم بقياس مستوى السكر في دمك إذا أمكن واسترح.

● **عدوى خطيرة في المنطقة التناسلية.** عدوى بكتيرية نادرة ولكنها خطيرة تسبب ضررًا في الأنسجة الموجودة تحت الجلد (التهاب اللقافة الناخر - necrotizing fasciitis) في المنطقة الواقعة بين فتحة الشرج وبين الأعضاء التناسلية وحولها (perineum). تم التبليغ عن التهاب اللقافة الناخر لدى النساء ولدى الرجال الذين تناولوا جارديانس. قد يؤدي الالتهاب إلى مكوث في المستشفى، العديد من العمليات الجراحية، وحتى إلى الموت. توجه فورًا للحصول على علاج طبي إذا كان ينطوّر لديك سخونة أو إذا كنت تشعر بضعف شديد، تعب أو التملل، وبالإضافة لذلك تشعر بوحد أو أكثر من الأعراض التالية في المنطقة التي ما بين فتحة الشرج والأعضاء الجنسية وما حولها: ألم أو حساسية، انتفاخ، احمرار الجلد.

● **ردود فعل تحسسية (فرط الحساسية).** حدثت ردود فعل تحسسية خطيرة لدى المتعالجين الذين يتناولون جارديانس. من الممكن أن تشمل أعراض رد الفعل التحسسي:

- انتفاخ الوجه، الشفتين، الحلق أو مناطق أخرى في جلدك.
- صعوبات في البلع أو في التنفس.
- آفات جلدية بارزة وحمراء (شرى).

إذا كنت تشعر بأي عرض من القائمة أعلاه، توقف عن تناول جارديانس وتوجه فورًا إلى الطبيب المعالج أو إلى غرفة الطوارئ الأقرب إلى بيتك.

● **ارتفاع الدهون في الدم.**

أيضًا، قد تظهر أعراض جانبية أخرى، مثل:

- **عدوى فطرية في المهبل.** أعراض العدوى الفطرية في المهبل تشمل:
 - رائحة من المهبل.
 - إفراز أبيض أو أصفر من المهبل (قد يكون الإفراز على شكل كتلة أو شبيه بجبنة الكوتاج).
 - حكة في المهبل.

● **التهاب فطري في العضو الذكري، خاصة لدى المتعالجين غير المطهرين ولدى المتعالجين ذوي الالتهابات المتكررة والمزمنة.** لدى المتعالجين غير المطهرين، قد يحدث انتفاخ في العضو الذكري مما يجعل من الصعب تمديد الجلد نحو الوراء حول طرف العضو الذكري. أعراض العدوى الفطرية في العضو الذكري تشمل:

- احمرار، حكة أو انتفاخ العضو الذكري.
- طفح جلدي على العضو الذكري.
- إفرازات ذات رائحة كريهة من العضو الذكري.
- ألم في الجلد المحيط بالعضو الذكري.

تحدث مع الطبيب حول ما يجب عليك القيام به إذا كنت تعاني من علامات الالتهاب الفطري في المهبل أو العضو الذكري. قد ينصحك الطبيب باستخدام أدوية مضادة للفطريات. إذا لم يكن استخدام هذه الأدوية مفيدًا، توجه إلى الطبيب مجددًا.

أعراض جانبية شائعة إضافية:

- **عدوى في مسالك التنفس العليا.**
- **تغييرات في بروفيل الدهون في الدم.**
- **آلام مفاصل.**
- **غثيان.**
- **عطش.**

أعراض جانبية غير شائعة:

- **انخفاض في حجم الدم.** علامات الانخفاض في حجم الدم هي:
 - انخفاض حاد في ضغط الدم.
 - انخفاض في ضغط الدم.

- جفاف.
- هبوط ضغط الدم عند تغيير الوضعية من الجلوس/النوم الى الوقوف.
- إغماءات.
- ارتفاع في تواتر وفي الحاح التبول.

الأعراض الجانبية التي تمّ التبليغ عنها بعد التسويق ولا يُمكن تعريف تواترها: حُمّاض كيتونويّ (Ketoacidosis) (أنظر أعراض جانبية خطيرة أعلاه)، التهاب الكلية وحوض الكلية (Pyelonephritis) وتعفن الدم نتيجة عدوى في جهاز البول (Urosepsis)، انتفاخ الوجه، الشفتين، الحلق (وذمة وعائية –Angioedema)، ردود فعل جلدية (مثلا طفح جلديّ أو شرى)، التهاب اللقافة الناخر (necrotizing fasciitis).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يتم ذكره في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة علاج بالأدوية" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى إستمارة خاصة معدة للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

٥. كيف يُخزّن الدواء؟

- يجب تخزين المستحضر تحت الـ 30°C.
- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن نظر ومتناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال وبذلك تفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقبؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على الكرتونة والبليستر. تاريخ انتهاء الصلاحية يشير الى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- يُمنع استخدام هذا الدواء إذا كانت العلبة متضررة.
- يُمنع إلقاء الأدوية في سلّة المهملات أو في المغسلة في البيت. اسأل الصيدليّ بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. هذه الوسائل ستساعدك على حماية البيئة.

٦. معلومات إضافية

- بالإضافة الى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضا على:
Lactose monohydrate, cellulose microcrystalline, hydroxypropylcellulose, croscarmellose sodium, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate.

غلاف القرص مكون من:

Hypromellose 2910, titanium dioxide, talc, macrogol 400, iron oxide yellow.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
جارديانس 10 ملغ هي أقراص مغلقة، دائرية، لونها أصفر فاتح، محدبة الوجهين ذات حواف مائلة. على جهة واحدة من القرص مدموغ "S 10" وفي الجهة الثانية يظهر ختم بورينجر إنجلهايم.

جارديانس 25 ملغ هي أقراص مغلقة، بيضاوية، لونها أصفر فاتح، محدبة الوجهين. على جهة واحدة من القرص مدموغ "S 25" وفي الجهة الثانية يظهر ختم بورينجر إنجلهايم.
الأقراص مغلقة ببليستر. كل علبة تحتوي على 7، 30، 60 أو 90 أقراص مغلقة. قد لا تكون جميع أحجام العلب مسوّقة.

- صاحب التسجيل: بورينجر إنجلهايم إسرائيل م.ض.، مدينت هيهوديم ٨٩، ص.ب. ٤١٢٤، هرتسليا بيتواح ٤٦٧٦٦٧٢.
 - اسم المُنْتِج: بورينجر إنجلهايم فارما، إنجلهايم أم راين، ألمانيا.
 - تمّ تحديد صيغة هذه النشرة من قبل وزارة الصحة وقد تمّ فحص مضمونها والتصديق عليه في شباط ٢٠١٧ وتمّ تحديثها بموجب تعليمات وزارة الصحة في تشرين الثاني ٢٠١٨.
 - رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسميّ في وزارة الصحة:
Jardiance 10 mg ١٥٤-٢٢-٣٤٢٠٢-٠٠
Jardiance 25 mg ١٥٤-٢٣-٣٤٢٠٣-٠٠
- لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.